



تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی الگوی واکنش ژنوتیپی در لاین‌های مختلف گندم نان تحت شرایط تنش شوری

امیرحسین عزیزی^۱، سمیه ساردویی نسب^۲، قاسم محمدی نژاد^۳، بابک ناخدا^۴، محسن مردی^۵،
سید محمدتقی طباطبائی^۶، اشکبوس امینی^۷ و اسلام مجیدی هروان^۸

۱- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
۲- دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، (نویسنده مسوول: sarduoie@gmail.com)
۳- دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
۴، ۵ و ۸- استادیار، دانشیار و استاد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج
۶- عضو مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
۷- استادیار، مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
تاریخ دریافت: ۹۳/۱۰/۹ تاریخ پذیرش: ۹۴/۱/۳۱

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط روی عملکرد دانه ۹۷لاین گندم نان (*Triticum aestivum* L.) و سه رقم شاهد تحت شرایط تنش شوری و نرمال با استفاده از تجزیه مدل اثرات اصلی افزایشی و ضرب پذیر (AMMAI) می‌باشد. آزمایش در چهار ایستگاه تحقیقاتی یزد، ماهان کرمان (شرایط نرمال)، اردکان و اختیار آباد کرمان (ایستگاه‌های شوری) اجرا شد. نتایج حاصل از تجزیه امی نشان داد اثر محیط و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و دو مولفه اول اثر متقابل در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار می‌باشند. بای پلات امی قادر به تفکیک ژنوتیپ‌های سازگار خصوصی و عمومی، همچنین محیط‌هایی با قدرت تفکیک بالا بود. بر اساس نتایج امی و پارامترهای پایداری مورد بررسی و تجزیه الگوی واکنش ژنوتیپی نتیجه‌گیری شد که لاین‌های شماره ۴۴، ۵۰، ۵۵، ۸۳ و ۹۵ نسبت به ساهدهای مورد بررسی با مقادیر پایین اثر متقابل ژنوتیپ در محیط و عملکرد بالاتر از میانگین به عنوان ژنوتیپ‌های پایدار معرفی می‌شوند. لاین‌های شماره ۳۶، ۵۳، ۶۷ و ۷۹ بیشترین سازگاری را به محیط یزد در شرایط نرمال داشته و لاین‌های شماره ۱۴، ۲۱، ۳۲، ۳۶، ۴۵، ۵۸ و ۷۴ نیز دارای سازگاری خصوصی به محیط کرمان در شرایط شور بودند.

واژه‌های کلیدی: اثر متقابل ژنوتیپ و محیط، الگوی واکنش ژنوتیپی، تجزیه امی

مقدمه

گندم در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی جهان رشد می‌کند و در حقیقت این گیاه از سازگارترین گونه‌های غلات است (۱۸). یکی از جنبه‌های بسیار مهم در به نژادی گندم، پایداری ارقام تحت شرایط مختلف محیطی است. پایداری یک محصول در واقع توانایی آن جهت بقاء در محیطی خاص می‌باشد. وجود اثر متقابل موجب پیچیده شدن ارزیابی ژنوتیپ‌ها، کاهش وراثت‌پذیری صفات و بازده ناشی از انتخاب می‌شود. از آنجایی که هنوز بین ظهور صفات و سازگاری عمومی در گیاهان ارتباط قوی پیدا نشده است، مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ با محیط به‌عنوان موثرترین روش برای شناسایی ارقام سازگار می‌باشد (۱۳، ۶). اثر متقابل ژنوتیپ × محیط باعث ایجاد پیچیدگی در پیش‌بینی عملکرد می‌شود و چالشی برای برنامه‌های به‌زراعی و به‌نژادی است (۱۷). نظر به این که تهیه ارقام اصلاح شده و سازگار با عملکرد بالا برای هر محیط از نظر اقتصادی متضمن هزینه سنگین و صرف وقت زیاد است، باید سعی در انتخاب ارقامی کرد که برای چند منطقه متفاوت قابل توصیه باشند، یعنی ارقامی که در کلیه مناطق اقلیمی مشابه و یا حداقل در اغلب آن مناطق عملکرد قابل قبولی داشته و بالاترین پایداری عملکرد دانه و سازگاری با محیط‌های مختلف را داشته باشند (۲). برای بررسی پایداری عملکرد ارقام از روش‌های آماری مختلفی استفاده شده است (۲۰، ۱۱، ۵). آکورا و همکاران (۲) به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و ارزیابی ژنوتیپ‌های پایدار، مطالعه‌ای را روی پانزده ژنوتیپ گندم دوروم در هشت محیط در ترکیه انجام دادند و با استفاده از

پارامترهای پایداری ($\lambda_i, \delta 2i, \alpha_i, G 2i, w 2i, b_i, S 2d_i$ R2i) کلیه ژنوتیپ‌ها ارزیابی شدند در نهایت دو رقم در کلیه روش‌ها به عنوان ارقام پایدار معرفی شدند. روش‌های زیادی برای تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ارائه شده است. این روش‌ها را به سه گروه پارامتری، ناپارامتری و چندمتغیره تقسیم‌بندی می‌شوند (۹). تجزیه الگوی واکنش ژنوتیپی برای نشان دادن حداکثر تغییرات ماتریس ژنوتیپ در محیط از روش‌های تجزیه خوشه‌ای و روش‌های برداریابی و مقیاس‌یابی به‌طور هم‌زمان استفاده می‌شود. در صورتی که مولفه‌های اصلی درصد کمی از اثر متقابل را توجیه کنند دقت برآوردها افزایش می‌یابد (۷). مدل تجزیه آثار اصلی جمع‌پذیر و اثر متقابل ضرب‌پذیر (امی) با نقطه‌یابی ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها بر روی بای پلات (Biplot) موقعیت ژنوتیپ‌ها را نسبت به یکدیگر و محیط‌های مورد بررسی شناسایی می‌کند (۲۱، ۱۲). در مدل امی آثار اصلی جمع‌پذیر ژنوتیپ و محیط با استفاده از تجزیه واریانس برآورد می‌شوند، ولی از آنجا که واکنش متفاوت ژنوتیپ‌ها از یک محیط به محیط دیگر باعث اثر متقابل ضرب‌پذیر می‌شود و تجزیه واریانس قادر به تجزیه این آثار نیست، با استفاده از تجزیه به مولفه‌های اصلی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط به مولفه‌های اصلی توجیه‌کننده اثر متقابل و مقدار باقیمانده یا نویز تفکیک می‌گردد (۷). از روش امی در تعیین ژنوتیپ‌های پایدار با سازگاری عمومی و خصوصی برای مکان‌های مختلف استفاده شده است (۱۷، ۱). در بررسی محمدی و همکاران (۱۵) عملکرد و پایداری ۱۵ ژنوتیپ یشرفته گندم دوروم در ۱۲ محیط با استفاده از روش امی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مطالعه‌ای که بر روی گندم

i از میانگین ژنوتیپها)، e_j اثر اصلی محیط z (اختلاف میانگین محیط z از میانگین محیطها)، d_n مقدار منفرد مربوط به n امین مؤلفه اصلی باقی مانده در مدل که برابر با جذر ریشه مشخصه مربوط به همان مؤلفه اصلی است، N تعداد مؤلفه‌های اصلی اثر متقابل (I.P.C.) در مدل امی است که برابر با $(N \leq \min(g-1), (e-1))$ می‌باشد و Z_{in} بردار مشخصه برای i امین ژنوتیپ از n امین مؤلفه اصلی اثر متقابل (IPC)، h_{jn} بردار مشخصه z امین محیط از n امین مؤلفه اصلی اثر متقابل (IPC)، q_{ij} مقدار باقی مانده (نویز) و e_{ijk} عبارت مربوط به خطاست (۲۱)، برای محاسبه دو آماره SIPC و EV از فرمول‌های زیر استفاده شد (۷):

$$EV = \sum_{n=1}^N Z_{in}^2 \quad \text{و} \quad SIPC = \sum_{n=1}^N |I^5 Z_{in}|$$

$$EV_N = \sum_{n=1}^N X_n^2 / n \quad SIPC_N = \sum_{n=1}^N S_n^{0.5} X_{gn}$$

ریشه چهارم مقدار ویژه است. $S_n^{0.5}$

به منظور نمایش گرافیکی ماتریس‌ها از بای پلات استفاده شد (۱۳). تجزیه خوشه‌ی ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها (با روش وارد و بر اساس ماتریس عدم تشابه مربع اقلیدسی) برای مؤلفه‌های اصلی اول و دوم و آماره‌های پایداری مدل انجام شد. تجزیه الگوی واکنش ژنوتیپی بر مبنای مقادیر مؤلفه‌های اصلی اول و دوم و آماره‌های پایداری مدل AMMI2 انجام شد. به منظور انجام محاسبات آماری ذکر شده از نرم‌افزارهای SAS، EXCEL و MATLAB استفاده گردید.

نتایج و بحث تجزیه مرکب

قبل از تجزیه آماری مدل امی با استفاده از آزمون بارتلت واریانس‌های درون محیطی آزمون شد و سپس تجزیه امی بر روی داده‌ها انجام شد و نتایج حاصل تجزیه امی در جدول ۱ درج گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون مذکور واریانس‌های خطا یکنواخت بودند. تجزیه واریانس اثرات افزایشی تفاوت معنی‌داری بین محیط‌ها و اثر متقابل ژنوتیپ×محیط در سطح احتمال ۱ درصد نشان داد. معنی‌دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ×محیط نشان‌دهنده اختلاف عملکرد ژنوتیپ‌ها از محیطی به محیط دیگر است که اثر متقابل ژنوتیپ در محیط حدود ۴۴/۱۲ درصد از مجموع مربعات کل را به خود اختصاص داد. ژنوتیپ‌ها از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی‌دار نشان ندادند و در محیط‌های مختلف عملکرد تقریباً یکسانی داشتند.

دوروم انجام شد، با تجزیه الگوی واکنش ژنوتیپی، چهار مؤلفه اصلی اول اثر متقابل معنی‌داری را نشان دادند که ۶۵ درصد از مجموع مربعات اثر متقابل توسط دو مؤلفه اصلی توجیه شد (۱۴).

هدف از پژوهش حاضر، تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد دانه لاین‌های امید بخش گندم نان (*Triticum aestivum* L.) می‌باشد تا ضمن ارزیابی پایداری ارقام، ژنوتیپ‌های واجد سازگاری خصوصی به محیط‌های مختلف نیز شناسایی گردند.

مواد و روش‌ها

در این بررسی ۹۷ لاین گندم نان (*Triticum aestivum* L.) به همراه سه رقم ارگ، بم و کویر به عنوان شاهد‌های متحمل در سال‌های زراعی (۸۸-۸۹ و ۸۹-۹۰) در ۴ ایستگاه تحقیقاتی اردکان یزد (شور)، شهرستان یزد (نرمال)، اختیارآباد-کرمان (شور) و شهرستان ماهان-کرمان (نرمال) در دو شرایط شور و نرمال مورد بررسی قرار گرفتند. هر آزمایش در هر محیط در قالب طرح آلفا لاتیس ۱۰×۱۰ با دو تکرار انجام شد. در طول دوره رشد آبیاری، کنترل علف‌های هرز، حذف بوته‌های نابه‌جا و سایر نظارت‌های به‌زراعی لازم صورت گرفت. عملکرد دانه در یک مترمربع از هر واحد آزمایش با حذف اثر حاشیه برای هر کرت محاسبه گردید و سپس به حسب تن در هکتار تبدیل شد.

پس از جمع‌آوری اطلاعات کلیه ایستگاه‌ها در مدت دو سال، محاسبات آماری و تجزیه واریانس ساده برای هر ایستگاه در هر سال به طور جداگانه انجام شد، سپس با استفاده از آزمون بارتلت نسبت به آزمون متجانس بودن واریانس خطاهای آزمایش‌ها اقدام گردید. قبل از تجزیه امی یکنواختی واریانس خطاهای آزمایش با استفاده از آزمون بارتلت آزمون گردید، سپس تجزیه امی بر روی عملکرد دانه ژنوتیپ‌ها در محیط‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار SAS انجام شد. جهت تجزیه سازگاری و پایداری عملکرد لاین‌های مورد بررسی از مدل امی (AMMI2) و از مؤلفه‌های اثر متقابل اول و دوم امی (IPCA1، IPCA2) به عنوان پارامترهای پایداری برای ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها استفاده گردید. همچنین از مدل بای پلات AMMI2 جهت بررسی واکنش ژنوتیپ‌ها در محیط‌ها استفاده شد. بای پلات‌ها به دلیل نمایش گرافیکی واکنش ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها در پدیده اثر متقابل ابزارهای مفیدی جهت شناسایی ژنوتیپ‌های سازگار به محیط‌های ویژه می‌باشند به منظور تحلیل بهتر اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط و تعیین سهم ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها در اثر متقابل از آماره‌های پایداری امی (SIPC2) و (EV2) استفاده گردید. در مدل امی تجزیه واریانس و تجزیه مؤلفه‌های اصلی به طور همزمان انجام می‌شود. مدل تجزیه امی به صورت زیر است (۲۱):

$$Y_{ijk} = m + g_i + e_j + \sum_{n=1}^N d_n z_{in} h_{jn} + q_{ij} + e_{ijk}$$

مقادیر Y_{ijk} عملکرد ژنوتیپ i در محیط z و در تکرار k، μ میانگین کل، g_i اثر اصلی ژنوتیپ i (اختلاف میانگین ژنوتیپ

جدول ۱- تجزیه واریانس عملکرد دانه ۱۰۰ ژنوتیپ در ۴ محیط بر مبنای روش امی

Table 1. AMMI analysis of grain yield in 100 genotypes over 4 environments

منابع تغییر (S.O.V)	درجه آزادی (df)	مجموع مربعات (ss)	میانگین مربعات (ms)	F
مدل	۳۹۹	۳۲۵۱/۱۷	۸/۱۵	۵/۹۰ ^{**}
ژنوتیپ	۹۹	۵۷۰/۹۲	۵/۷۷	۱/۰۳ ^{ns}
محیط	۳	۹۹۷/۲۹	۳۳۲/۴۳	۴۱/۸۸ ^{**}
ژنوتیپ در محیط	۲۹۷	۱۶۸۲/۹۶	۵/۶۷	۴/۱۱ ^{**}
IPCA1	۱۰۱	۹۴۴/۰۶	۹/۳۵	۶/۷۷ ^{**}
IPCA2	۹۹	۶۱۷/۰۶	۶/۲۳	۴/۵۱ ^{**}
نویز	۹۷	۱۲۱/۸۴	۱/۲۶	۰/۹۱
بلوک	۴	۱۴/۶۲	۳/۶۵	۲/۶۴ [*]
خطا	۳۹۶	۵۴۸/۳۶	۱/۳۸	-
کل	۷۹۹	۳۸۱۴/۱۵	-	-

**، * و ns: معنی دار در سطوح ۱ و ۵ درصد و غیرمعنی دار

تجزیه اثرات اصلی افزایشی و ضرب پذیر برای عملکرد دانه با استفاده از مدل امی

با توجه به معنی دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، در این پژوهش برای معرفی ژنوتیپی از نوتیپ‌های پایدار از تجزیه الگوی ژنوتیپی بر مبنای مدل امی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه ۱۰۰ ژنوتیپ گندم نان بر مبنای روش امی نشان داد که منابع تغییر محیط، اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و دو مولفه اول اثر متقابل (IPC) در سطح احتمال ۱٪ معنی دار بودند (جدول ۱). اولین مؤلفه اصلی اثر متقابل (IPC1) بیشترین سهم (۵۶/۱) را در بیان اثر متقابل ژنوتیپ و محیط داشت و دو مولفه اول در مجموع ۹۲/۶۹ درصد از مجموع مربعات اثر متقابل ژنوتیپ در محیط را تبیین نمودند. با توجه به معنی دار شدن دو مولفه اصلی اثر متقابل در آزمون F، از مدل AMMI2 استفاده شد. معتمدی و خدارحم پور (۱۸) نیز در ارزیابی اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط با استفاده از روش امی برای ژنوتیپ‌های گندم نان دو مولفه معنی دار بدست آوردند.

تجزیه پایداری ژنوتیپ‌ها

پارامترهای اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در مدل AMMI2 برای ژنوتیپ‌ها در جداول ۲ و ۳ درج شده است. همچنین مقادیر ریشه مشخصه و مقادیر مولفه‌های اصلی ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها (ارزش‌های ژنوتیپی و محیطی) به ترتیب در جداول ۴ و ۵ آورده شده‌اند. از این مقادیر برای ارزیابی پایداری ژنوتیپ‌ها، سنجش تغییرات محیطی و انتساب ژنوتیپ‌ها به محیط‌های مختلف در نمودار بای پلات استفاده شد. ضرایب دو مولفه اول اثر متقابل به عنوان ساده‌ترین پارامترهای پایداری جهت انتخاب ژنوتیپ‌ها قبلاً مورد استفاده قرار گرفته است (۱۹۰۴، ۱۰). گراوگروبر و همکاران (۱۰) جهت گزینش

ژنوتیپ‌های پایدار درگندم نان از ضرایب مؤلفه‌های اصلی اثر متقابل (IPCA) استفاده نمودند. نتایج تجزیه خوشه‌ای لاین‌ها بر اساس مقادیر اولین مولفه اصلی اثر متقابل (IPC1) و میانگین عملکرد (شکل ۱) سه گروه را مشخص نمود. در گروه اول لاین‌های شماره ۱۲، ۲۶، ۷۹، ۵۳، ۶۷، ۸۶، ۶۳، ۸۹، ۷۳، ۲۲، ۶۵، ۵۲، ۵۴، ۶۹، ۹۰، ۵۹، ۹۶، ۷۷، ۱۰۰، ۸۰، ۹۸، ۷۸، ۹۹، ۵۷، ۵۱، ۸۵، ۷۶، ۶۸، ۴۲، ۴۴، ۲۳، ۷۴، ۴۸، ۸۲، ۹۷، ۷۱، ۲۴، ۶۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۱۳، ۵۵، ۶۴، ۶۲، ۴۳، ۲، ۹۲، ۳۳، ۴۵، ۹۵، ۲۱، ۴۶، ۸۸، ۳۴، ۸، ۲۵، ۵۶، ۸۴، ۸۳، ۶۱، ۳۲، ۱۲، ۱۵، ۹۱، ۱۴، ۵۸، ۸۱ و ۱۸ قرار گرفتند که دارای مقادیر IPC1 نزدیک صفر بودند. گروه دوم شامل لاین‌های شماره ۱، ۳، ۷، ۹، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۸، ۳۱، ۳۶، ۴۱، ۴۷، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۷ و ۹۴ گردید که دارای مقادیر IPC1 مثبت و بزرگ بودند و لاین‌های شماره ۴، ۳۰، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۹، ۶۶ و ۷۵ در گروه سوم قرار گرفتند و دارای مقادیر IPC1 مثبت بودند. براساس تجزیه الگوی واکنش ژنوتیپی بر مبنای IPC1 و میانگین عملکرد مشاهده شد که بعضی از ژنوتیپ‌های گروه اول IPC1 نزدیک صفر و کمترین اثر متقابل ژنوتیپ در محیط را داشتند. لاین‌های شماره ۸۱، ۱۵، ۱۲، ۶۱، ۸۳، ۸۸ و ۹۵ دارای عملکرد بالاتر از میانگین بودند که لاین‌های شماره ۸۱، ۶۱، ۸۸، ۹۵ و ۸۳ با کمترین اثر متقابل ژنوتیپ در محیط و عملکرد بالاتر از میانگین به عنوان ژنوتیپ‌های پایدار و پرمحصول شناسایی شدند. نتایج نشان داد که محیط‌های مورد آزمایش تقریباً سهم بالایی در ایجاد اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط داشته‌اند و می‌توان لاین‌های شماره ۶۷، ۷۹، ۲۶ و ۵۳ را دارای سازگاری خصوصی به محیط دوم دانست (شکل ۱).

جدول ۲- پارامتر اثر متقابل ژنوتیپ در محیط در مدل AMMI2 برای ژنوتیپ‌ها

Table 2. Genotype-environment interaction parameter for genotypes in AMMI2 model

ژنوتیپ	بردار ویژه ژنوتیپی برای اولین مؤلفه اصلی	بردار ویژه ژنوتیپی برای دومین مؤلفه اصلی	ژنوتیپ	بردار ویژه ژنوتیپی برای اولین مؤلفه اصلی	بردار ویژه ژنوتیپی برای دومین مؤلفه اصلی
۱	-۰/۰۰۷	-۰/۰۱۸	۳۷	-۰/۰۰۶	-۰/۰۲۶
۲	-۰/۰۰۴	-۰/۰۰۹	۳۸	۰/۰۰۲	-۰/۰۲۷
۳	۰/۰۰۸	-۰/۰۰۴	۳۹	-۰/۰۰۶	-۰/۰۰۵
۴	-۰/۰۲۷	-۰/۰۰۹	۳۰	۰/۰۴۱	-۰/۰۰۳
۵	۰/۰۱۸	-۰/۰۰۱	۳۱	۰/۰۰۷	-۰/۰۰۲
۶	-۰/۰۰۶	۰/۰۰۲	۳۲	۰	-۰/۰۰۵
۷	-۰/۰۰۹	-۰/۰۱۳	۳۳	-۰/۰۰۳	-۰/۰۰۱
۸	-۰/۰۰۱	-۰/۰۰۳	۳۴	-۰/۰۰۱	-۰/۰۱۵
۹	-۰/۰۰۲	۰	۳۵	-۰/۰۰۶	-۰/۰۲۷
۱۰	۰/۰۰۷	۰/۰۱۱	۳۶	۰/۰۰۹	-۰/۰۱۳
۱۱	۰/۰۰۸	-۰/۰۰۱	۳۷	۰/۰۰۸	-۰/۰۰۴
۱۲	۰/۰۰۱	-۰/۰۰۳	۳۸	۰/۰۰۴	-۰/۰۱۶
۱۳	-۰/۰۰۵	-۰/۰۱۷	۳۹	۰/۰۲۳	-۰/۰۰۳
۱۴	۰/۰۰۳	-۰/۰۰۱	۴۰	۰/۰۳۶	-۰/۰۰۱
۱۵	-۰/۰۰۲	-۰/۰۰۴	۴۱	۰/۰۱۵	-۰/۰۰۷
۱۶	۰/۰۱۱	-۰/۰۰۴	۴۲	-۰/۰۰۹	-۰/۰۱۲
۱۷	-۰/۰۱۲	-۰/۰۰۳	۴۳	-۰/۰۰۴	-۰/۰۰۴
۱۸	-۰/۰۰۳	-۰/۰۱۹	۴۴	-۰/۰۰۸	۰
۱۹	۰/۰۱۱	-۰/۰۰۷	۴۵	-۰/۰۰۳	-۰/۰۰۵
۲۰	-۰/۰۰۲	-۰/۰۰۸	۴۶	-۰/۰۰۱	-۰/۰۰۸
۲۱	-۰/۰۰۳	-۰/۰۱۲	۴۷	۰/۰۱۸	-۰/۰۰۱
۲۲	-۰/۰۱۷	-۰/۰۲۲	۴۸	-۰/۰۰۸	-۰/۰۲۵
۲۳	-۰/۰۰۸	-۰/۰۰۹	۴۹	۰/۰۳۴	-۰/۰۰۶
۲۴	-۰/۰۰۱	-۰/۰۱۲	۵۰	۰/۰۰۶	-۰/۰۰۷
۲۵	-۰/۰۰۱	-۰/۰۰۲	۵۱	-۰/۰۰۱	-۰/۰۱۹
۲۶	-۰/۰۳۲	-۰/۰۳۳	۵۲	-۰/۰۱۵	-۰/۰۰۹

ادامه جدول ۲- پارامتر اثر متقابل ژنوتیپ در محیط در مدل AMMI2 برای ژنوتیپ‌ها

Table 2. Genotype-environment interaction parameter for genotypes in AMMI2 model

ژنوتیپ	بردار ویژه ژنوتیپی برای اولین مؤلفه اصلی	بردار ویژه ژنوتیپی برای دومین مؤلفه اصلی	ژنوتیپ	بردار ویژه ژنوتیپی برای اولین مؤلفه اصلی	بردار ویژه ژنوتیپی برای دومین مؤلفه اصلی
۵۳	-۰/۰۲۶	-۰/۰۰۴	۷۹	-۰/۰۰۳	-۰/۰۳۷
۵۴	-۰/۰۱۴	-۰/۰۲۲	۸۰	-۰/۰۱۲	-۰/۰۱۴
۵۵	-۰/۰۰۵	۰	۸۱	۰/۰۰۳	-۰/۰۲۴
۵۶	-۰/۰۰۱	-۰/۰۰۹	۸۲	-۰/۰۰۷	-۰/۰۱۵
۵۷	-۰/۰۱۱	-۰/۰۱۶	۸۳	۰	-۰/۰۱۱
۵۸	۰/۰۰۳	-۰/۰۰۴	۸۴	۰	-۰/۰۳۱
۵۹	-۰/۰۱۳	-۰/۰۰۲	۸۵	-۰/۰۰۱	-۰/۰۱۴
۶۰	۰/۰۰۲	-۰/۰۱۱	۸۶	-۰/۰۱۹	-۰/۰۰۷
۶۱	۰	-۰/۰۳۱	۸۷	۰/۰۲۳	-۰/۰۰۸
۶۲	-۰/۰۰۵	-۰/۰۱۹	۸۸	-۰/۰۰۱	-۰/۰۲۶
۶۳	-۰/۰۱۹	-۰/۰۱۴	۸۹	-۰/۰۱۸	-۰/۰۰۳
۶۴	-۰/۰۰۵	-۰/۰۲۲	۹۰	-۰/۰۱۳	-۰/۰۰۷
۶۵	-۰/۰۱۶	-۰/۰۱۷	۹۱	۰/۰۰۲	-۰/۰۰۴
۶۶	۰/۰۰۳	-۰/۰۱۵	۹۲	-۰/۰۰۴	-۰/۰۰۹
۶۷	-۰/۰۲۱	۰/۰۰۹	۹۳	-۰/۰۰۶	-۰/۰۱۱
۶۸	-۰/۰۰۹	۰/۰۲۱	۹۴	۰/۰۱۷	-۰/۰۱۱
۶۹	-۰/۰۱۴	-۰/۰۱۸	۹۵	-۰/۰۰۳	-۰/۰۰۳
۷۰	-۰/۰۱۲	-۰/۰۱۷	۹۶	-۰/۰۱۳	-۰/۰۰۱
۷۱	-۰/۰۰۷	-۰/۰۲۵	۹۷	-۰/۰۰۷	-۰/۰۱۵
۷۲	-۰/۰۱۶	-۰/۰۰۵	۹۸	-۰/۰۱۲	-۰/۰۱۱
۷۳	-۰/۰۱۸	-۰/۰۰۹	۹۹	-۰/۰۱۲	-۰/۰۰۱
۷۴	-۰/۰۰۸	-۰/۰۰۷	۱۰۰	-۰/۰۱۲	-۰/۰۰۵
۷۵	۰/۰۴۱	-۰/۰۰۸			
۷۶	-۰/۰۰۹	-۰/۰۰۸			
۷۷	-۰/۰۱۳	-۰/۰۲۷			
۷۸	-۰/۰۱۲	-۰/۰۲۶			

جدول ۳- پارامتر اثر متقابل ژنوتیپ در محیط در مدل AMMI2 برای محیط‌ها

Table 3. The effect of genotype on environmental parameters in the model AMMI2 for the environment

محیط	بردار ویژه محیطی برای اولین مؤلفه اصلی	بردار ویژه محیطی برای دومین مؤلفه اصلی
محیط ۱	-۰/۰۳۷	-۰/۰۶۴
محیط ۲	-۰/۰۲۹	-۰/۰۸۷
محیط ۳	۰/۱۳۰	۰/۰۰۲
محیط ۴	-۰/۰۶۳	۰/۱۲۷

جدول ۴- مقادیر ریشه مشخصه و مقادیر مؤلفه‌های اصلی آثار متقابل در مدل AMM2 برای ژنوتیپ‌ها

Table 4. Eigen values and principal component values of GE for genotypes in AMMI2 model

مؤلفه‌های اصلی آثار متقابل	IPC1	IPC2	IPC3	مؤلفه‌های اصلی آثار متقابل	IPC1	IPC2	IPC3
مقدار ریشه مشخصه	۹۴۴/۱	۶۱۷/۱	۱۲۱/۸	مقدار ریشه مشخصه	۹۴۴/۱	۶۱۷/۱	۱۲۱/۸
درصد تجمعی واریانس مؤلفه	۵۶/۱	۹۲/۷۶	۱۰۰	درصد تجمعی واریانس مؤلفه‌ها	۵۶/۱	۹۲/۷۶	۱۰۰
ژنوتیپ	ژنوتیپ						
۱	-۰/۲۳	-۰/۴۴۶	-۰/۲۸۷	۲۷	-۰/۱۷	۰/۶۳۵	-۰/۱۵۲
۲	-۰/۱۲۱	-۰/۲۲	-۰/۲۴۵	۲۸	۰/۶۰۹	۱/۶۸۲	-۰/۰۲
۳	۰/۲۳۸	-۰/۰۹۶	-۰/۳۹	۲۹	-۰/۱۶۹	۱/۲۳۵	-۰/۱۰۸
۴	۰/۸۳۸	-۰/۲۱۸	-۰/۰۳	۳۰	۱/۲۵۶	۰/۷۵۱	۰/۲۲۷
۵	۰/۵۴۳	۰/۰۳۳	-۰/۲۸۶	۳۱	۰/۲۱۵	-۰/۰۴۱	-۰/۰۸۳
۶	-۰/۱۹۲	۰/۰۵۵	-۰/۵۷۵	۳۲	۰/۰۱۵	۰/۱۳	-۰/۴۵۸
۷	۰/۲۶۱	۰/۳۲۵	-۰/۳۴۶	۳۳	-۰/۰۰۴	-۰/۰۲۳	۰/۰۵
۸	-۰/۰۳۵	-۰/۰۶۸	-۰/۰۱۱	۳۴	-۰/۰۴۱	-۰/۳۷۹	-۰/۳۰۱
۹	۰/۶۱۴	-۰/۰۰۲	-۰/۱۹۵	۳۵	-۰/۱۸۸	۰/۶۶	-۰/۱۵۱
۱۰	۰/۲۲۳	-۰/۲۶۴	-۰/۱۴۴	۳۶	۰/۲۷۵	۰/۳۱۶	-۰/۱۹۶
۱۱	۰/۲۴۸	-۰/۲۵۲	۰/۶۵	۳۷	۰/۲۴۲	-۰/۰۹۵	-۰/۴۵۹
۱۲	۰/۰۲۵	۰/۷۴۵	-۰/۱۶۱	۳۸	۱/۲۳۴	۰/۳۹۳	-۰/۰۱۸
۱۳	-۰/۱۶۸	۰/۴۱۷	۰/۰۱۵	۳۹	۱/۰۱۱	-۰/۰۷۶	-۰/۰۴۱
۱۴	۰/۱۰۲	۰/۲۲۵۳	۰/۳۳۷	۴۰	۱/۰۹۵	-۰/۰۱۴	-۰/۱۸۶
۱۵	۰/۰۵۲	۱/۰۰۱	۰/۰۶۳	۴۱	۰/۴۵۲	-۰/۱۸	-۰/۳۸۷
۱۶	۰/۳۳۴	۰/۰۸۹	۰/۰۵۵	۴۲	-۰/۲۶۷	۰/۲۸۷	-۰/۳۷۱
۱۷	۰/۳۶۳	-۰/۰۸۵	۰/۱۶	۴۳	-۰/۱۲۴	-۰/۰۹۴	-۰/۲۹۶
۱۸	۰/۱۰۴	۰/۴۶۲	-۰/۳۴۹	۴۴	-۰/۲۴۸	-۰/۰۰۵	-۰/۰۲۵
۱۹	۰/۳۳۳	۰/۱۶۷	-۰/۳۲۴	۴۵	-۰/۱۰۱	۰/۱۳۱	-۰/۱۵۱
۲۰	۰/۶۰۶	۰/۱۸۷	۰/۰۳۷	۴۶	-۰/۰۴۴	-۰/۲۰۷	-۰/۲۵
۲۱	-۰/۰۹۴	۰/۲۹۹	۰/۳۰۲	۴۷	۰/۵۴	۰/۲۴۷	-۰/۲۰۴
۲۲	-۰/۵۳۵	۰/۵۴۶	-۰/۲۶۹	۴۸	-۰/۲۳۶	-۰/۶۲	-۰/۰۲۷
۲۳	-۰/۲۴۷	۰/۲۲۳	-۰/۰۰۶	۴۹	۱/۰۵۸	-۰/۱۶	-۰/۰۵۲
۲۴	-۰/۱۹۷	-۰/۳۰۹	-۰/۰۴۶	۵۰	۰/۱۹۲	-۰/۱۷۷	۰/۱۹
۲۵	-۰/۰۳۲	۰/۰۵۶	۰/۱۰۹	۵۱	-۰/۳۰۴	-۰/۴۷۲	۰/۰۷
۲۶	-۰/۹۹	۰/۸۱۲	۰/۱۷۸	۵۲	-۰/۴۶۵	۰/۲۳۴	-۰/۴۱۷

ادامه جدول ۴- مقادیر ریشه مشخصه و مقادیر مؤلفه‌های اصلی اثرات متقابل در مدل AMM2 برای ژنوتیپ‌ها


Table 4. Eigen values and principal component values of GE for genotypes in AMMI2 model

ژنوتیپ	IPC1	IPC2	IPC3	مؤلفه‌های اصلی اثرات متقابل	IPC1	IPC2	IPC3
مقدار ریشه مشخصه	۹۴۴/۱	۶۱۷/۱	۱۲۱/۸	مقدار ریشه مشخصه	۹۴۴/۱	۶۱۷/۱	۱۲۱/۸
درصد تجمعی واریانس مؤلفه‌ها	۵۶/۱	۹۲/۷۶	۱۰۰	درصد تجمعی واریانس مؤلفه‌ها	۵۶/۱	۹۲/۷۶	۱۰۰
ژنوتیپ				ژنوتیپ			
۵۳	-۰/۸۰۶	۱/۰۰۴	-۰/۶۱۲	۷۹	-۰/۹۰۹	۰/۶۶	-۰/۲۹۵
۵۴	-۰/۴۲۶	-۰/۵۴۷	-۰/۱۸۲	۸۰	-۰/۳۶۷	-۰/۳۳۸	-۰/۱۵۴
۵۵	-۰/۱۶۱	-۰/۰۰۱	-۰/۵۲۵	۸۱	-۰/۱۰۲	-۰/۵۸۴	-۰/۱۷۳
۵۶	-۰/۰۲۲	-۰/۲۱۹	-۰/۴۲۸	۸۲	-۰/۲۱۳	-۰/۳۷۶	-۰/۱۰۸
۵۷	-۰/۳۳۷	-۰/۳۸۹	-۰/۱۴۳	۸۳	-۰/۰۰۲	۰/۲۷۳	-۰/۰۵۶
۵۸	۰/۱۰۲	-۰/۱۰۶	-۰/۲۲۶	۸۴	-۰/۰۰۷	-۰/۷۷۳	-۰/۲۴۳
۵۹	-۰/۳۹۹	-۰/۴۸۵	-۰/۲۹۹	۸۵	-۰/۳۰۲	-۰/۳۵۹	-۰/۲۱۴
۶۰	۰/۶۰۸	-۰/۲۷۹	-۰/۶۱۱	۸۶	-۰/۵۹	-۰/۱۷۷	-۰/۸۹۳
۶۱	-۰/۰۱	-۰/۷۷۳	-۰/۴۱۴	۸۷	-۰/۶۹۲	۰/۱۹	-۰/۳۵۶
۶۲	-۰/۱۵۱	-۰/۴۸۴	-۰/۱۲۹	۸۸	-۰/۰۴۲	۰/۶۴	-۰/۰۵۷
۶۳	-۰/۵۸	-۰/۳۵۱	-۰/۰۱۷	۸۹	-۰/۵۶۱	۰/۷۵۲	-۰/۲۶۲
۶۴	-۰/۱۵۲	-۰/۵۵۳	-۰/۱۳۷	۹۰	-۰/۴۰۳	۰/۱۸	-۰/۱۵۳
۶۵	-۰/۴۹۷	-۰/۴۲۸	-۰/۳۴	۹۱	۰/۰۶۶	-۰/۱۱	-۰/۱۱۶
۶۶	۰/۹۱۶	-۰/۳۷۴	-۰/۲۷۳	۹۲	-۰/۱۱۹	-۰/۲۲۷	-۰/۱۸۱
۶۷	-۰/۶۴۸	-۰/۲۱۷	-۰/۰۴۵	۹۳	-۰/۱۹	-۰/۲۶۱	-۰/۰۴۷
۶۸	-۰/۲۷۳	-۰/۵۰۹	-۰/۰۴۸	۹۴	-۰/۵۳۷	-۰/۲۶۹	-۰/۰۹۹
۶۹	-۰/۴۱۶	-۰/۰۴۵	-۰/۳۹۵	۹۵	-۰/۰۹۷	-۰/۰۸۷	-۰/۰۱۶
۷۰	۰/۳۶۴	-۰/۴۲۱	-۰/۰۷۲	۹۶	-۰/۳۹۴	-۰/۲۵۵	-۰/۰۲۷
۷۱	-۰/۲۰۲	-۰/۶۱۴	-۰/۶۳۲	۹۷	-۰/۲۱۱	-۰/۳۷۹	-۰/۶۹۶
۷۲	-۰/۵۰۱	-۰/۱۳۱	-۰/۱۴	۹۸	-۰/۳۵۸	-۰/۲۶۶	-۰/۱۶۷
۷۳	-۰/۵۴۹	-۰/۲۲۵	-۰/۲۳۶	۹۹	-۰/۳۵۴	۰/۰۱۹	-۰/۰۷۶
۷۴	-۰/۲۴۶	-۰/۱۶۹	-۰/۰۰۵	۱۰۰	-۰/۳۷۵	۰/۱۲۲	-۰/۱۰۳
۷۵	۱/۲۵۲	-۰/۱۸۷	-۰/۰۲۹				
۷۶	-۰/۲۸۲	-۰/۱۹۱	-۰/۰۶۹				
۷۷	-۰/۳۸۴	-۰/۰۶۸	-۰/۳۵۲				
۷۸	-۰/۲۵۶	-۰/۶۴۴	-۰/۱۵۴				

جدول ۵- مقادیر ریشه مشخصه و مقادیر مؤلفه‌های اصلی اثرات متقابل در مدل AMM2 برای محیط‌ها

Table 5. Eigen values and principal component values of GE in AMMI2 model for environments

مؤلفه‌های اصلی اثرات متقابل	IPC1	IPC2	IPC3
مقدار ریشه مشخصه	۹۴۴/۰۵۷	۶۱۷/۰۶۴	۱۲۱/۸۳۶
درصد تجمعی واریانس مؤلفه‌ها	۵۶/۰۹۵	۹۲/۷۶۱	۱۰۰
محیط			
E1	-۱/۱۴۸	-۱/۵۹۵	۰/۰۶۱
E2	-۰/۸۸۴	-۲/۱۶۶	-۱/۸۶۸
E3	۳/۹۷۹	۰/۶۰۳	۰/۰۵۷
E4	-۱/۹۴۷	۳/۱۵۷	-۰/۲۵۱




شکل ۱- بای پلات حاصل از مقادیر میانگین عملکرد و IPC_1 ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها. خطوط پیوسته و خط چین به ترتیب گروه‌بندی‌های حاصل از تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها بر مبنای مقادیر IPC_1 را نشان می‌دهد. خطوط افقی و عمودی ممّت به ترتیب از نقاط میانگین عملکرد و $IPC_1=0$ می‌گذرند.

Fig 1. Biplot of mean yield and IPC_1 for genotypes and environments. Continuous lines and dotted lines indicating genotypes and environments cluster, respectively. Horizontal and vertical lines pass through mean yield and $IPC_1=0$, respectively

شماره ۵، ۴۰، ۴۴، ۵۵، ۹۵ و ۹۹ با دارا بودن IPC_2 نزدیک به صفر و عملکرد بالاتر از میانگین به عنوان ژنوتیپ‌های با پایداری بالا تشخیص داده شدند. براساس IPC_2 لاین‌های شماره ۱۴، ۲۱، ۳۲، ۳۶، ۴۵، ۵۸ و ۷۴ دارای سازگاری خصوصی به محیط سوم بودند (شکل ۲). مدل آمی ابزار مفیدی در تشخیص اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط معرفی شده که علاوه بر تعیین ژنوتیپ‌های با بیشترین میزان پایداری، بیان‌گر سازگاری خصوصی ارقام نیز می‌باشد (۳). در بررسی دمیتریجویک و همکاران (۸) (سازگاری عملکرد در گندم) اثر رقم، سال و اثر متقابل رقم با سال معنی‌دار گزارش شد و ژنوتیپ‌های پایدار را با استفاده از روش آمی معرفی کرده و عنوان کردند بر اساس تنوع فنوتیپی، ژنوتیپ‌ها می‌توانند به‌عنوان والدین در برنامه‌های اصلاحی گندم مورد استفاده قرار گیرند.

نتایج تجزیه خوشه‌ای بر اساس مقادیر دومین مولفه اصلی اثر متقابل (IPC_2) و میانگین عملکرد، ژنوتیپ‌ها را در سه گروه تفکیک کرد (شکل ۲). گروه اول شامل لاین‌های شماره ۶۱، ۶۷، ۷۸، ۷۹، ۸۱، ۸۴، ۸۵، ۸۹، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳




شکل ۲- بای پلات حاصل از مقادیر میانگین عملکرد و IPC_2 ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها. خطوط پیوسته و خط چین به ترتیب گروه‌بندی‌های حاصل از تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها بر مبنای مقادیر IPC_2 را نشان می‌دهد. خطوط افقی و عمودی ممتد به ترتیب از نقاط میانگین عملکرد و $IPC_2=0$ می‌گذرند.

Figure 2. Biplot of mean yield and IPC_2 for genotypes and environments. Continuous lines and dotted lines indicating genotypes and environments cluster, respectively. Horizontal and vertical lines pass through mean yield and $IPC_2=0$, respectively

به‌منظور دسته‌بندی ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها بر اساس اطلاعات بیان شده توسط مؤلفه‌های اصلی اول و دوم اثر متقابل، تجزیه خوشه‌ای بر روی مقادیر مؤلفه‌های اصلی اول و دوم اثر متقابل ژنوتیپ‌ها و نیز مؤلفه‌های اصلی اول و دوم اثر متقابل محیط‌ها به طور همزمان انجام شد. شکل ۳ بای‌پلات مقادیر مؤلفه‌های اصلی اول و دوم برای ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها را به‌طور توأم نشان می‌دهد. این بای پلات جمعا ۹۲/۷۶ درصد اطلاعات مربوط به اثر متقابل ژنوتیپ در محیط را توجیه می‌کند. گروه ۱ که در آن ژنوتیپ‌هایی با IPC_1 مثبت و بزرگ و IPC_2 مثبت و منفی بزرگ قرار گرفتند، شامل لاین‌های شماره ۴، ۵، ۹، ۲۰، ۲۸، ۳۰، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۷، ۴۹، ۶۰، ۶۶، ۷۵ و ۸۷ بود و ناپایدار تلقی می‌شوند. گروه ۲ شامل ژنوتیپ‌هایی با IPC_1 منفی و مثبت و IPC_2 بزرگ و مثبت بود که شامل لاین‌های شماره ۱۲، ۱۳، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۵، ۶۸، ۷۹، ۸۸ و ۸۹ با واکنش ناپایدار بود. در گروه ۳ ژنوتیپ‌هایی با IPC_1 مثبت و IPC_2 با علامت مثبت و منفی با واکنش پایدار و پایداری متوسط بودند (شامل لاین‌های شماره ۱، ۳، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۵، ۳۱، ۳۲، ۳۶، ۳۷، ۴۱، ۴۵، ۵۰، ۵۶، ۵۸، ۶۰، ۷۰، ۸۳، ۹۱ و ۹۴). گروه ۴ در برگیرنده ژنوتیپ‌هایی دارای IPC_1 و IPC_2 با علامت مثبت و منفی و با واکنش پایدار و پایداری متوسط بودند (شکل ۳).

به‌منظور دسته‌بندی ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها بر اساس اطلاعات بیان شده توسط مؤلفه‌های اصلی اول و دوم اثر متقابل، تجزیه خوشه‌ای بر روی مقادیر مؤلفه‌های اصلی اول و دوم اثر متقابل ژنوتیپ‌ها و نیز مؤلفه‌های اصلی اول و دوم اثر متقابل محیط‌ها به طور همزمان انجام شد. شکل ۳ بای‌پلات مقادیر مؤلفه‌های اصلی اول و دوم برای ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها را به‌طور توأم نشان می‌دهد. این بای پلات جمعا ۹۲/۷۶ درصد اطلاعات مربوط به اثر متقابل ژنوتیپ در محیط را توجیه می‌کند. گروه ۱ که در آن ژنوتیپ‌هایی با IPC_1 مثبت و بزرگ و IPC_2 مثبت و منفی بزرگ قرار گرفتند، شامل لاین‌های شماره ۴، ۵، ۹، ۲۰، ۲۸، ۳۰، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۷، ۴۹، ۶۰، ۶۶، ۷۵ و ۸۷ بود و ناپایدار تلقی می‌شوند. گروه ۲ شامل ژنوتیپ‌هایی با IPC_1 منفی و مثبت و IPC_2 بزرگ و مثبت بود که شامل لاین‌های شماره ۱۲، ۱۳، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۵، ۶۸، ۷۹، ۸۸ و ۸۹ با واکنش ناپایدار بود. در گروه ۳ ژنوتیپ‌هایی با IPC_1 مثبت و IPC_2 با علامت مثبت و منفی با واکنش پایدار و پایداری متوسط بودند (شامل لاین‌های شماره ۱، ۳، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۵، ۳۱، ۳۲، ۳۶، ۳۷، ۴۱، ۴۵، ۵۰، ۵۶، ۵۸، ۶۰، ۷۰، ۸۳، ۹۱ و ۹۴). گروه ۴ در برگیرنده ژنوتیپ‌هایی دارای IPC_1 و IPC_2 با علامت مثبت و منفی و با واکنش پایدار و پایداری متوسط بودند (شکل ۳).




شکل ۳- بای پلات حاصل از مقادیر IPC1 و IPC2 ژنوتیپها و محیطها. خطوط پیوسته و خط چین به ترتیب گروه‌بندی‌های حاصل از تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپها و محیطها بر مبنای دو مؤلفه اصلی اول را نشان می‌دهد. خطوط افقی و عمودی ممتد به ترتیب از نقاط IPC1 و IPC2 برابر با صفر می‌گذرد.

Figure 3. Biplot of IPC1 and IPC2 for genotypes and environments. Continuous lines and dotted lines indicating genotypes and environments cluster based on two first component. Horizontal and vertical lines pass through mean yield and IPC1=0 and IPC2=0, respectively

در نظر گرفته شدند. لاین‌های شماره ۴۴، ۵۰، ۵۵، ۸۳، ۹۵ و ۹۹ با SIPC2 کم و عملکرد بالاتر از میانگین به عنوان پایدارترین ژنوتیپها شناسایی شدند و لاین‌های شماره ۲۵، ۳۷، ۷۶ و ۱۰۰ واجد سازگاری عمومی بودند (شکل ۴ و جدول ۶).

تجزیه الگوی واکنش ژنوتیپی بر مبنای آماره پایداری SIPC2 و میانگین عملکرد ژنوتیپها، ژنوتیپها را به ۳ گروه تقسیم کرد. گروه اول با دارا بودن کمترین مقدار SIPC2 پایدارترین ژنوتیپها بودند. ژنوتیپ‌های گروه دوم SIPC2 حدواسط داشتند و واجد سازگاری متوسط بودند. ژنوتیپ‌های گروه سوم با بالاترین مقادیر SIPC2 ناپایدارترین ژنوتیپها



شکل ۴- پراکنش ژنوتیپها براساس میانگین عملکرد و پارامتر پایداری SIPC2 خطوط به هم پیوسته گروه‌بندی حاصل از تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپها بر مبنای SIPC2 را نشان می‌دهد.

Figure 4. Genotypes scatter based on mean yield and SIPC2. Interconnected lines indicating cluster analysis of genotypes based on SIPC2


جدول ۶ - پارامترهای پایداری برای ژنوتیپ‌ها در مدل AMMI2

Table 6. Stable parameters for genotypes in AMMI2 model

ژنوتیپ	SIPC ₂	EV ₂	ژنوتیپ	SIPC ₂	EV ₂	ژنوتیپ	SIPC ₂	EV ₂	ژنوتیپ	SIPC ₂	EV ₂
۱	-۰/۶۷۵	-۰/۰۰۰۱۹	۳۷	-۰/۸۰۶	-۰/۰۰۰۳۴	۵۳	۱/۸۱۰	-۰/۰۰۱۱۶	۷۹	۱/۵۶۹	-۰/۰۰۰۷۹
۲	-۰/۳۴۰	-۰/۰۰۰۰۵	۳۸	۱/۲۹۲	-۰/۰۰۰۵۷	۵۴	-۰/۹۷۳	-۰/۰۰۰۳۴	۸۰	-۰/۷۰۵	-۰/۰۰۰۱۶
۳	-۰/۳۳۵	-۰/۰۰۰۰۴	۳۹	۱/۴۰۴	-۰/۰۰۱۲۵	۵۵	-۰/۱۶۲	-۰/۰۰۰۰۱	۸۱	-۰/۶۸۶	-۰/۰۰۰۲۸
۴	۱/۰۵۶	-۰/۰۰۰۴۱	۳۰	۲/۰۰۷	-۰/۰۰۱۲۹	۵۶	-۰/۲۴۱	-۰/۰۰۰۰۴	۸۲	-۰/۵۸۹	-۰/۰۰۰۱۴
۵	-۰/۵۷۶	-۰/۰۰۰۱۶	۳۱	-۰/۲۵۵	-۰/۰۰۰۰۳	۵۷	-۰/۷۲۶	-۰/۰۰۰۱۸	۸۳	-۰/۲۷۵	-۰/۰۰۰۰۶
۶	-۰/۲۴۷	-۰/۰۰۰۰۲	۳۲	-۰/۱۴۵	-۰/۰۰۰۰۱	۵۸	-۰/۲۰۸	-۰/۰۰۰۰۱	۸۴	-۰/۷۸۰	-۰/۰۰۰۴۸
۷	-۰/۵۸۷	-۰/۰۰۰۱۲	۳۳	-۰/۱۲۷	-۰/۰۰۰۰۱	۵۹	-۰/۸۸۳	-۰/۰۰۰۲۷	۸۵	-۰/۶۶۱	-۰/۰۰۰۱۵
۸	-۰/۱۰۳	.	۳۴	-۰/۴۲۰	-۰/۰۰۰۱۲	۶۰	-۰/۸۸۸	-۰/۰۰۰۲۶	۸۶	-۰/۷۶۷	-۰/۰۰۰۳۱
۹	-۰/۶۱۷	-۰/۰۰۰۲۰	۳۵	-۰/۸۴۸	-۰/۰۰۰۳۷	۶۱	-۰/۷۸۳	-۰/۰۰۰۴۸	۸۷	-۰/۸۸۹	-۰/۰۰۰۲۹
۱۰	-۰/۴۸۷	-۰/۰۰۰۰۸	۳۶	-۰/۵۹۱	-۰/۰۰۰۱۲	۶۲	-۰/۶۳۵	-۰/۰۰۰۲۰	۸۸	-۰/۶۸۲	-۰/۰۰۰۳۳
۱۱	-۰/۴۹۹	-۰/۰۰۰۰۸	۳۷	-۰/۳۳۷	-۰/۰۰۰۰۴	۶۳	-۰/۹۳۱	-۰/۰۰۰۲۸	۸۹	۱/۳۱۳	-۰/۰۰۰۶۳
۱۲	-۰/۷۷۰	-۰/۰۰۰۰۵	۳۸	۱/۶۲۷	-۰/۰۰۰۹۳	۶۴	-۰/۷۰۵	-۰/۰۰۰۲۶	۹۰	-۰/۵۸۳	-۰/۰۰۰۱۱
۱۳	-۰/۵۸۶	-۰/۰۰۰۱۶	۳۹	۱/۰۸۶	-۰/۰۰۰۵۵	۶۵	-۰/۹۲۵	-۰/۰۰۰۲۸	۹۱	-۰/۱۷۵	-۰/۰۰۰۰۱
۱۴	-۰/۳۵۵	-۰/۰۰۰۰۶	۴۰	۱/۱۰۹	-۰/۰۰۰۶۳	۶۶	۱/۲۹۰	-۰/۰۰۰۵۶	۹۲	-۰/۳۴۶	-۰/۰۰۰۰۵
۱۵	۱/۰۵۳	-۰/۰۰۰۸۱	۴۱	-۰/۶۳۲	-۰/۰۰۰۱۳	۶۷	-۰/۸۶۵	-۰/۰۰۰۲۶	۹۳	-۰/۴۵۱	-۰/۰۰۰۰۷
۱۶	-۰/۴۲۴	-۰/۰۰۰۰۷	۴۲	-۰/۵۵۴	-۰/۰۰۰۱۰	۶۸	-۰/۷۸۲	-۰/۰۰۰۲۵	۹۴	-۰/۷۹۶	-۰/۰۰۰۲۱
۱۷	-۰/۴۴۹	-۰/۰۰۰۰۸	۴۳	-۰/۲۱۷	-۰/۰۰۰۰۲	۶۹	-۰/۸۶۶	-۰/۰۰۰۲۶	۹۵	-۰/۱۸۴	-۰/۰۰۰۰۱
۱۸	-۰/۵۶۶	-۰/۰۰۰۱۸	۴۴	-۰/۲۵۲	-۰/۰۰۰۰۴	۷۰	-۰/۷۸۵	-۰/۰۰۰۲۱	۹۶	-۰/۶۴۹	-۰/۰۰۰۱۳
۱۹	-۰/۵۰۰	-۰/۰۰۰۰۸	۴۵	-۰/۲۳۲	-۰/۰۰۰۰۲	۷۱	-۰/۸۱۶	-۰/۰۰۰۲۳	۹۷	-۰/۵۹۰	-۰/۰۰۰۱۴
۲۰	-۰/۷۹۳	-۰/۰۰۰۲۲	۴۶	-۰/۲۵۱	-۰/۰۰۰۰۴	۷۲	-۰/۶۳۲	-۰/۰۰۰۱۵	۹۸	-۰/۶۲۴	-۰/۰۰۰۱۳
۲۱	-۰/۳۹۳	-۰/۰۰۰۰۸	۴۷	-۰/۷۸۷	-۰/۰۰۰۲۰	۷۳	-۰/۷۷۳	-۰/۰۰۰۲۰	۹۹	-۰/۳۷۳	-۰/۰۰۰۰۷
۲۲	-۰/۰۸۱	-۰/۰۰۰۳۹	۴۸	-۰/۸۵۶	-۰/۰۰۰۳۴	۷۴	-۰/۴۱۶	-۰/۰۰۰۰۶	۱۰۰	-۰/۵۰۷	-۰/۰۰۰۰۹
۲۳	-۰/۴۷۰	-۰/۰۰۰۰۷	۴۹	۱/۲۱۸	-۰/۰۰۰۶۱	۷۵	۱/۴۳۹	-۰/۰۰۰۸۶			
۲۴	-۰/۵۰۷	-۰/۰۰۰۱۰	۵۰	-۰/۳۶۸	-۰/۰۰۰۰۴	۷۶	-۰/۴۷۳	-۰/۰۰۰۰۷			
۲۵	-۰/۰۸۸	.	۵۱	-۰/۷۷۶	-۰/۰۰۰۲۳	۷۷	۱/۰۶۵	-۰/۰۰۰۴۵			
۲۶	۱/۸۰۳	-۰/۰۰۱۰۵	۵۲	-۰/۶۹۹	-۰/۰۰۰۱۶	۷۸	۱	-۰/۰۰۰۴۰			

شدند (شکل ۵). تنها تفاوت در گروه‌بندی حاصل از تجزیه خوشه‌ای بر اساس EV₂ نسبت به SIPC₂ در این بود که ژنوتیپ ۴۲ در طیف ژنوتیپ‌های پایدار قرار گرفت، در حالی که بر مبنای SIPC₂ این ژنوتیپ در دسته ژنوتیپ‌های با پایداری متوسط جای داشت و ژنوتیپ ۳۴ بر اساس EV₂ در طیف ژنوتیپ‌های با پایداری متوسط قرار گرفت در حالی که براساس SIPC₂ جزء ژنوتیپ‌های پایدار بود. لاین‌های شماره ۴، ۲۲ و ۷۷ براساس EV₂ در طیف ژنوتیپ‌های با پایداری متوسط قرار گرفتند، در حالی که بر مبنای SIPC₂ جزء ژنوتیپ‌های ناپایدار جای گرفتند.

تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌ها براساس آماره پایداری EV₂ ژنوتیپ‌ها را به ۳ دسته متفاوت از لحاظ پایداری تقسیم‌بندی کرد. گروه اول با کمترین مقدار EV₂ پایدارترین ژنوتیپ‌ها در نظر گرفته شدند. گروه دوم با مقدار EV₂ حدواسط، دارای پایداری متوسط بودند و گروه سوم با بالاترین میزان EV₂ ناپایدارترین گروه در نظر گرفته شد (جدول ۶). تجزیه واکنش ژنوتیپی بر اساس EV₂ با ارائه گروه‌بندی تقریباً مشابهی با SIPC₂ به نوعی بیانگر همبستگی بالای این دو پارامتر می‌باشد. بر اساس این دیاگرام نیز لاین‌های شماره ۴۴، ۵۰، ۵۵، ۸۳، ۹۵ و ۹۹ ژنوتیپ‌های با پایداری بیشتر شناسایی



شکل ۵- پراکنش ژنوتیپ‌ها بر مبنای میانگین عملکرد و پارامتر پایداری EV_2 . خطوط به هم پیوسته نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌ها براساس پارامتر EV_2 را نشان می‌دهد.

Figure 5. Genotypes scatter based on mean yield and EV_2 . Continuous indicating genotypes cluster based EV_2

تجزیه پایداری محیط‌ها

به منظور تجزیه بهتر اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط از پارامترهای پایداری برای محیط‌ها استفاده گردید (۱۶). مقادیر این پارامترها در جدول ۵ آمده است. تجزیه خوشه‌ای بر روی مقادیر اولین مؤلفه اصلی محیط‌ها ۲ گروه عمده را مشخص نمود. در گروه اول محیط ۳ قرار گرفت. در گروه دوم محیط‌های اول، دوم و چهارم قرار گرفتند که IPC_1 منفی داشتند (شکل ۱ و جدول ۵). همچنین تجزیه خوشه‌ای براساس دومین مؤلفه اصلی، محیط‌ها را به ۳ گروه متمایز کرد. در گروه اول محیط‌های اول و دوم قرار گرفتند که مقدار

مؤلفه اصلی دوم منفی و بالایی داشتند. در گروه دوم محیط سوم قرار گرفت که IPC_2 مثبت و پایینی داشت و در گروه سوم محیط چهارم قرار گرفت که IPC_2 مثبت و بالایی داشت (شکل ۲ و جدول ۵). تجزیه خوشه‌ای بر مبنای اولین و دومین مؤلفه‌های اصلی ۳ گروه محیطی را تفکیک کرد. بر این اساس محیط ۳ با IPC مثبت و بزرگ در یک گروه و محیط ۴ دارای IPC با علامت مختلف و بزرگ در گروه دوم و محیط‌های ۱ و ۲ با IPC منفی در گروه سوم قرار گرفتند (شکل ۳ و جدول ۵).

منابع

1. Aghaee-Sarbarzeh, M., M. Dastfal, H. farzadi, B. Andarzian, A.Sh. Pourshahbazi, M. Bahari and H. Rostami. 2012. Evaluation of durum wheat genotypes for yield and yield stability in warm and dry areas of Iran. Seed and Plant Improvement Journal, 28-1: 315-325 (In Persian).
2. Akcura, M., Y. Kaya, S. Taner and R. Ayranci, 2006. Parametric stability analyses for grain yield of durum wheat. Plant Soil Environment, 52: 254-261.
3. Albert, M.J.A. 2004. A comparison of statistical methods to describe genotype $\times$ environment interaction and yield stability in multi-location maize trials. M.Sc. dissertation, University of Orange Free State, Bloemfontein, South Africa.
4. Annicchiarico, P. 1997. Joint regression vs AMMI analysis of genotype-environment interactions for cereals in Italy. Euphytica, 94: 53-62.
5. Ansari, Maleki, Y., R. Rajabi, S.M. Azimzadeh, A. Hesami, K. Solaimani and G. Abedi Asl. 2007. Study on adaptability and stability of grain yield of barley genotypes under rainfed conditions. Seed and Plant, 23: 387-402 (In Persian).
6. Basford, K.E. and M. Cooper. 1998. Genotype $\times$ environment interactions and some considerations of their implications for wheat breeding in Australia. Australian Journal of Agricultural Research, 49: 153-174.
7. Crossa, J., H.G.J. Gauch and R.W. Zobel. 1990. Additive main effects and multiplicative interaction analysis of two international maize cultivar trials. CropScience, 30: 493-500.
8. Dimitrijevic, M., D. Knezevic, S. Petrovic, V. Zecevic, J. Boskovic, M. Belic, B. Pejic and B. Banjac. 2011. Stability of yield components in wheat (*Triticum aestivum* L.). Genetica, 43: 29-39.
9. Gauch, H.G. 1992. Statistical Analysis of Regional Trials. AMMI Analysis of Factorial Designs. Elsevier Pub. Amsterdam, Netherlands.
10. Grausgruber, H., M. Oberforster, M. Werteker, P. Ruckebauer and J. Vollmann. 2000. Stability of quality traits in Austriangrown winter wheats. Field Crop Research, 66: 257-267.
11. Kanouni, H., A. Taleei and M. Khalili. 2007. Stability analysis of seed yield of and one hundred-seeds weight in desi type chickpea genotypes under dryland conditions. Seed and Plant, 23: 297-310 (In Persian).
12. Karimzadeh, R., H. Dehgani and Z. Dehghanpour. 2008. Use of AMMI method for estimating genotype-environment interaction in early maturing corn hybrids. Seed and Plant Improvement Journal, 23: 537-546 (In Persian).
13. Kempston, R.A. 1984. The use of biplots in interpreting variety by environment interactions. Journal of Agricultural Science, 103: 123-135.
14. Mohammadi, R., M. Armion and M.M. Ahmadi. 2011. Genotype $\times$ environment interactions for grain yield of durum wheat genotypes using AMMI model. Seed and Plant Improvement Journal, 27: 183-198 (In Persian).
15. Mohammadi, R.A. Mohammad, A. Shabani and A. Daryaei. 2007. Identification of stability and adaptability in advanced durum genotypes using AMMI analysis. Asian Journal of Plant science, 6: 1261-1268.
16. Mohammadi, R., S.S. Pourdad and A. Amri. 2008. Grain yield stability of spring safflower (*Carthamus tinctorius* L.). Australian Journal of Agricultural Research, 59: 546-553.
17. Mokhtarifar, K.H., R. Abdolshahi and S.H. Pour Seyyedy. 2016. Yield Stability Analysis of Eight Bread Wheat (*Triticum aestivum* L.) Cultivars in Kerman Province Condition. Journal of Crop Breeding, 8: 96-103.
18. Motamedi, A. and Z. Khodarahmpour. 2011. Study of Environmental Effects on Grain Yield Genotypes of Bread Wheat by Pattern of Genotype Reaction. Journal of Crop Breeding, 3: 79-91.
19. Nikkhah, H.R., A. Yousefi, S.M. Mortazavian and M. Arazmjoo. 2007. Analysis of yield stability of barley (*Hordeum vulgare* L.) genotypes- using additive main effects and multiplicative interaction (AMMI) model. Iranian Journal of Crop Sciences, 9: 1-13 (In Persian).
20. Noormohammadi, G., A. Siadat and A. Kashani. 2008. Cereal Crops, Vol 1. Shahid Chamran University of Ahvaz Press, 446 (In Persian).
21. Purchase, J.L., H. Hatting and C.S. Van Deventer. 2000. Genotype $\times$ environment interaction of winter wheat in South Africa: II. Stability analysis of yield performance. South Africa Journal of Plant and Soil, 17: 101-107.
22. Sadeghzadeh Ahari, D., H. Pashapour, S. Bahrami, R. Haghparast, M. Aghaee, M. Azimzadeh and G. Abedi. 2005. Adaptability and stability of grain yield of durum wheat line in cold dryland areas. Seed and Plant, 21: 1-22 (In Persian).
23. Zobel, R.W., M.J. Wright and H.G. Gauch. 1988. Statistical analysis of a yield trial. Agronomy Journal, 80: 388-393.

Estimation of Genotype by Environment Interaction and Pattern Analysis of Genotype in Varied Bread wheat Lines Under Salinity Stress Condition

Amir Hossein Azizi¹, Somayeh Sardouie-Nasab², Ghasem Mohammadi-Nejad³,
Babak Nakhoda⁴, Mohsen Mardi⁵, Seyed Mohammad Taqi Tabatabaie⁶, Ashkboos Amini⁷
and Eslam Majidi-Heravan⁸

1- Graduateed M.Sc. of Agronomy, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran

2- Ph.D. Student, Shahid Bahonar University of Kerman (Corresponding author: sardouie@gmail.com)

3- Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman

4, 5 and 8- Assistant Professor, Associate Professor and Professor, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran

6- Yazd Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

7- Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute

Received: December 30, 2014

Accepted: April 20, 2015

Abstract

The objectives of present study was analyzing genotype by environment (GE) interaction on the grain yields of 97 promising bread wheat lines (*Triticum aestivum* L.) along with three control varieties under salt stress and normal conditions using additive main effects and multiplicative interaction (AMMI) model. The trials were conducted at four research locations including Yazd and Mahan of Kerman (normal conditions) and Ardakan and Ekhtiarabad of Kerman (salt stress conditions). Based on results of AMMI analysis, main effect due to E and GE interaction as well as two first interaction principal components were found to be significant ($P < 0.99$). AMMI biplots were able to distinguish specific and widely-adapted genotypes, as well as environments with high resolution. Lines 44, 50, 55, 83, 95 in compare with under studied check varieties with the lowest contribution to GE interaction and highest mean yield were introduced as the most stable genotypes, lines 26, 53, 67 and 79 were highly adapted to normal conditions of Mahan and the lines including 14, 21, 32, 36, 45, 58 and 74 were highly adapted to salt stress conditions of Kerman.

Keywords: AMMI analysis, Genotype $\times$ environment interaction, Pattern analysis