



بررسی روابط صفات کمی در لاین‌های پیشرفته کنجد

سید حمید رضا رضائی^۱ و سعداله منصوری^۲

۱- استادیار، دانشگاه بیرجند (نویسنده مسوول: hrramazani@Birjand.ac.ir)

۲- مربی پژوهش بخش تحقیقات دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

تاریخ دریافت: ۹۴/۸/۵ تاریخ پذیرش: ۹۵/۳/۱۱

چکیده

چهارده لاین برتر کنجد حاصل از بررسی‌های مقدماتی پیشین، به همراه رقم اولتان و توده محلی بیرجند در آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار به مدت ۲ سال ارزیابی شدند. صفات اندازه‌گیری شده در این تحقیق شامل درصد سبزی کردن، تعداد گل در محور، تعداد شاخه فرعی، طول کیسول، تعداد کیسول در بوته، ارتفاع اولین کیسول، ارتفاع بوته، ارتفاع شاخه بندی، ارتفاع زاینده، ارتفاع زاینده کیسول، طول دوره رویشی، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و درصد روغن بود. نتایج همبستگی ساده فنوتیپی (پیرسون) نشان داد وزن هزار دانه بیشترین همبستگی را با صفات ارتفاع بوته (۰/۶۹۷) دارد. تجزیه خوشه‌ای بر اساس صفات ذکر شده و با روش وارد منجر به تفکیک ۳ گروه متمایز شد. گروه ۲ که شامل توده محلی بیرجند، رقم اولتان، لاین ۱۱ و لاین ۱۲ بود از نظر میانگین تمام صفات وضعیت بهتری داشت و به‌عنوان گروه برتر شناخته شد. این گروه بیشترین فاصله را با گروه ۱ و ۳ داشت. تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA) مشخص کرد که ۴ مؤلفه اصلی اول مقادیر ویژه بالاتر از ۱ را دارند و این چهار مؤلفه ۷۶/۴۲٪ تغییرات کل لاین‌ها و ارقام را توجیه می‌کنند. در مؤلفه اصلی اول صفات تعداد شاخه فرعی و وزن هزار دانه و در مؤلفه اصلی دوم وزن صفات درصد سبزی کردن و عملکرد کل بیشتر بود، لذا در برنامه انتخاب لاین‌ها باید به این صفات توجه نماییم. کلاس‌بندی بر اساس صفات ذکر شده نشان داد که برای کشت کنجد در منطقه، استفاده از توده محلی بیرجند به لحاظ برتری از نظر صفات مورد بررسی، توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: تجزیه خوشه‌ای، تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، کنجد، گروه برتر

مقدمه

کنجد (*Sesamum indicum* L.) یکی از قدیمی‌ترین گیاهان روغنی می‌باشد (۳). تاریخ کشت کنجد در ایران به ۴۰۰۰ سال قبل برمی‌گردد ولی تحقیقات بر روی این گیاه نسبت به سایر گیاهان خیلی کم می‌باشد (۱۳). کنجد اساساً گیاهی خاص مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر است که برای تولید حداکثر به شرایط نسبتاً گرم و خشک نیاز دارد (۲). بذور کنجد منبع مهمی از روغن (۴۴ تا ۵۸ درصد)، پروتئین (۱۵ تا ۲۵ درصد) و کربوهیدرات (۱۳/۵ درصد) می‌باشد (۵). روغن کنجد دارای بالاترین مقدار آنتی‌اکسیدانت می‌باشد و علاوه بر این روغن کنجد به خاطر طعم متمایزش در صنایع غذایی اهمیت دارد (۸).

علیرغم اهمیت تغذیه‌ای و دارویی، کشت این گیاه در کشور ایران با محدودیت‌هایی روبرو بوده‌است که این محدودیت‌ها باعث عدم رغبت کشاورزان نسبت به کشت این گیاه شده‌است. عدم بهره‌گیری از روش‌های نوین کشت و نیز مواد ژنتیکی اصلاح‌شده منجر به کاهش عملکرد و ناکارآمدی زراعت این گیاه در مقایسه با نباتات دیگر می‌شود (۱۵).

این وضعیت می‌تواند با انتخاب ارقام با کیفیت خوب و پتانسیل سازگاری بالا به شرایط آب و هوایی مختلف بهبود یابد. توده‌های محلی بعلاوه گونه‌ها وحشی خویشاوند منبع مهمی از تنوع ژنتیکی برای به‌نژادگران بوده و چارچوب تولید کشاورزی را شکل می‌دهند (۲۴). در این راستا منصوری و احمدی (۱۲) با به‌کار بردن ارقام داخلی، خارجی و توده‌های بومی مبادرت به ایجاد خزانه دورگ‌گیری کنجد

نمود. از انتخاب ژنوتیپ‌های حاصله از نسل F2 این ارقام در مناطق مختلف، لاین‌هایی با برتری بیشتر استخراج گردیدند.

ور و همکاران (۲۳) با استفاده از صفات آگرومورفولوژی تنوع ژنتیکی ۵۲ ژنوتیپ محلی کنجد را در ترکیه ارزیابی کردند. آن‌ها این ژنوتیپ‌ها را با توجه به میزان شباهت‌شان در چهار گروه اصلی دسته‌بندی کردند.

طباطبایی و همکاران (۲۲) تنوع ژنتیکی ۲۷ ژنوتیپ کنجد را در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با استفاده از ۲۱ صفت اندازه‌گیری کردند. با استفاده از تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه در چهار گروه قرار گرفتند که بعضی از ژنوتیپ‌های کنجد ایرانی در گروه ژنوتیپ‌های خارجی قرار گرفتند. این موضوع احتمال خویشاوندی آن‌ها با ژنوتیپ‌های خارجی را نشان می‌دهد. بر اساس تجزیه به عامل‌ها شش عامل ۷۴/۰۹ درصد از تنوع را توجیه کردند. صالحی و سعیدی (۱۷) با مطالعه تنوع ژنتیکی ۲۰ ژنوتیپ کنجد، آن‌ها را به دو گروه ۱۶ و ۶ تایی تقسیم‌بندی کردند. عسکری و همکاران (۴) با مطالعه ۱۲ ژنوتیپ کنجد در دو شرایط تنش خشکی و عدم تنش مشاهده کردند که در شرایط تنش آبیاری رابطه بین صفت عملکرد دانه با صفات تعداد کیسول و عملکرد بیولوژیک معنی‌دار شد در حالی که در شرایط نرمال صفات تعداد برگ در بوته، وزن هزار دانه و وزن کیسول بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشتند. تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌ها را در دو و سه دسته در شرایط نرمال و تنش تقسیم‌بندی نمود.

از دو ردیف وسط کرت‌ها و حذف حاشیه ابتدایی و انتهایی هر خط به مساحت ۱ مترمربع برداشت گردیدند و جهت خشک شدن به انبار منتقل شدند. صفات مورد مطالعه شامل درصد سبز کردن، تعداد گل در محور، تعداد شاخه فرعی، طول کپسول، تعداد کپسول در بوته، ارتفاع اولین کپسول، ارتفاع بوته، ارتفاع شاخه‌بندی، ارتفاع زاینده، ارتفاع زاینده کپسول، طول دوره رویشی، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و درصد روغن. آزمایش در سال بعد نیز تکرار شد. از میانگین صفات دو سال برای تجزیه مرکب استفاده شد.

برای استخراج روغن و تعیین درصد روغن از دستگاه سوکسوله استفاده شد. پنج گرم از نمونه‌ای پودر شده، پس از قرار گرفتن در آون ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت، وزن و داخل کارتوش سلولزی ریخته و درب آن‌ها با پنبه عاری از چربی پوشانده شد. حلال مورد استفاده متانول و کلروفرم به میزان ۱۸۰ میلی‌لیتر و به نسبت ۱:۲ (دو قسمت متانول و یک قسمت کلروفرم) بود. مدت زمان روغن‌گیری ۴/۵ ساعت بود. از دستگاه تبخیر در خلأ^۱ برای تبخیر حلال استفاده شد.

برای تجزیه خوشه‌ای با استفاده از صفات مورد بررسی از معیار مربع فاصله اقلیدسی و از روش وارد^۲ استفاده شد. دندروگرام تجزیه خوشه‌ای و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS-16.0 (۲۱) انجام گرفت. برای تجزیه به مؤلفه‌های اصلی^۳ و رسم بای‌پلات از نرم‌افزار SAS-9.0 (۱۸) استفاده گردید.

نتایج و بحث

تجزیه واریانس مرکب نتایج دوساله آزمایش، اختلافات معنی‌داری را بین تیمارهای آزمایش به جز صفت ارتفاع شاخه‌بندی و درصد روغن نشان داد. همچنین اثر سال در مورد کلیه صفات به جز درصد روغن بسیار معنی‌دار بود (جدول ۲). اثرات متقابل رقم در سال به جز در مورد صفات وزن هزار دانه، ارتفاع شاخه‌بندی، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین کپسول، تعداد کپسول در بوته، درصد روغن و طول کپسول، در مابقی صفات اثرات بسیار معنی‌داری را داشت. نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین عملکرد دانه به کمک آزمون دانکن در سطح یک درصد نشان داد که توده بومی بیرجند با میزان عملکرد دانه ۱۸۱۲/۷ کیلوگرم در هکتار رتبه اول را داشت. لاین شماره ۴ با ۱۳۸۴/۲ کیلوگرم در هکتار در رتبه بعدی قرار گرفت. رقم اولتان دارای کمترین میزان عملکرد ۹۰۷/۲ کیلوگرم در هکتار بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین میزان روغن ارقام اختلاف معنی‌داری وجود ندارد، یعنی ژنوتیپ‌ها از نظر میزان روغن دانه با یکدیگر یکسان‌اند. همچنین میانگین کل روغن ژنوتیپ‌ها ۵۲/۲۶ درصد می‌باشد که این میزان با گزارش‌ها سایرین مشابهت دارد (۶). مقایسه میانگین روغن نشان می‌دهد که دامنه تغییرات از توده بومی بیرجند (۵۵/۳۶ درصد) تا لاین‌های شماره ۲ و ۱۲ (۴۸/۳۶ درصد) متغیر بود (جدول ۳). نتایج همبستگی ساده فنوتیپی (پیرسون) بین صفات در جدول ۴ ارائه شده است. همبستگی

هدف از انجام این پژوهش گروه‌بندی لاین‌های حاضر به همراه ارقام اولتان و توده محلی بیرجند بر اساس صفات عملکردی و مورفولوژیکی می‌باشد. این گروه‌بندی و تعیین تنوع موجود بین لاین‌ها و این ارقام می‌تواند منجر به معرفی گروه‌های برتر از لحاظ صفات مورد بررسی شده و در برنامه‌های اصلاحی بعدی، امکان انتخاب ژنوتیپ‌های برتر را در گروه‌های برتر ایجاد خواهد کرد.

مواد و روش‌ها

این طرح با استفاده از ۱۴ لاین کنجد به دست آمده از آزمایش‌های پیشین بخش دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به همراه رقم اولتان و یک توده کنجد بومی بیرجند (شجره این ژنوتیپ‌ها در جدول ۱ آمده است) در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه (با ۵۹ درجه و ۱۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۲ درجه و ۵۳ دقیقه عرض جغرافیایی و ارتفاع ۱۴۷۰ متری از سطح دریا) واقع در ۲۰ کیلومتر جاده کرمان که دارای بافت خاک رسی لومی بود، در تابستان ۱۳۹۱ کشت شد. قالب طرح به صورت بلوک‌های کامل تصادفی و با ۴ تکرار بود. هر لاین و رقم در ۴ خط به فاصله ۶۰ سانتی‌متر و فاصله روی خط ۱۰ سانتی‌متر و به طول ۵ متر کاشت شده که مساحت هر کرت ۲۰ مترمربع بود. فاصله بین تکرارها ۳ متر در نظر گرفته شد. میزان بذر مصرفی حدود ۱۰ کیلوگرم در هکتار بود. کاشت در اول مردادماه انجام شد. جهت پیشگیری از بیماری‌های خاکزی بذرها قبل از کاشت با بنومیل ۱٪ به نسبت دو در هزار ضدعفونی شدند. در مرحله هشت برگی عملیات تنک کردن جهت رسیدن به تراکم گیاهی موردنظر (تعداد ۱۰ بوته در هر متر طول) انجام گرفت.

کودهای شیمیایی موردنیاز بر اساس آزمون خاک مصرف شد. کودهای نیتروژنه به میزان ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار (در دو تقسیط ۱- قبل از دیسک و ۲- بعد از وجین و ارتفاع حدود ۲۰ سانتی‌متری گیاه) از دو منبع نیترات آمونیوم و اوره استفاده گردید. همچنین از کودهای سوپر فسفات تریپل (۲۰۰ کیلوگرم در هکتار)، سولفات پتاسیم (۱۵۰ کیلوگرم در هکتار)، سولفات روی (۲۰ کیلوگرم در هکتار)، سولفات منگنز (۲۰ کیلوگرم در هکتار) و گوگرد آلی گرانوله (۸۰ کیلوگرم در هکتار) قبل از کاشت توسط دستگاه کودپاش گریز از مرکز پاشیده شد.

آبیاری مطابق عرف منطقه انجام شد. جهت مبارزه با علف‌های هرز، در دو مرحله (یعنی همراه با تنک و مرحله‌ای که ارتفاع گیاه به ۲۰ سانتی‌متر رسید) عمل وجین توسط نیروی کارگری انجام گردید. مبارزه با آفات و بیماری‌ها نیز به موقع انجام گرفت. در طول فصل رشد آفاتی از جمله کرم برگ‌خوار، پروانه برگ‌خوار و آگروتیس و بیماری‌هایی نظیر پژمردگی یا بوته میری و گل سبز مشاهده شد که جهت مبارزه با آفات از آفت‌کش‌های سیستمیک نظیر دیازینون و اکاتین استفاده گردید.

برداشت نهایی بوته‌ها زمانی صورت گرفت که دانه‌های درون کپسول در حال تغییر رنگ به زرد روشن بودند. بوته‌ها

بیولوژیک همبستگی مثبت و معنی‌داری دارد. در این تحقیق نیز مشخص شد که عملکرد کل با طول دوره رویش همبستگی مثبت و معنی‌داری دارد، یعنی هرچه طول دوره رویشی بیشتر می‌شود عملکرد بیولوژیک نیز بالا رفته و در نتیجه عملکرد کل دانه بالا می‌رود. همچنین در این تحقیق همبستگی بین عملکرد کل و تعداد کپسول منفی و غیر معنی‌دار بود که با نتایج سعیدی (۱۶) کاملاً مطابقت دارد. همبستگی مثبت و معنی‌دار عملکرد کل با طول دوره رویشی و ارتفاع شاخه‌بندی نشان می‌دهد که در برنامه‌های اصلاحی از این دو صفت می‌توان به‌عنوان معیارهایی برای افزایش عملکرد استفاده کرد. گزارش دیگری نشان می‌دهد که ارتفاع گیاه می‌تواند منجر به افزایش عملکرد شود (۲۰).

تجزیه خوشه‌ای بر اساس تمامی صفات مورد بررسی انجام گرفت و منجر به تفکیک سه گروه متمایز از همدیگر شد (شکل ۱). گروه اول شامل ۹ لاین، گروه دوم شامل ۴ لاین (لاین‌های ۱۲ و ۱۳ و رقم اولتان و توده محلی بیرجند) و گروه سوم شامل ۳ لاین (لاین‌های ۲، ۸ و ۱۴) بود. با توجه به مربع فاصله اقلیدسی، در بین لاین‌های بررسی شده دورترین ژنوتیپ‌ها نسبت به همدیگر توده محلی بیرجند (از گروه ۲) و لاین شماره ۱۴ (از گروه ۳)، با فاصله ۸۱/۳۳ بودند. نزدیک‌ترین لاین‌ها، شماره ۱۳ و ۷ (از گروه یک) با فاصله ۴/۷۴ بودند. نتایج گروه‌بندی با نتایج فام و همکاران (۱۴) مطابقت دارد که آن‌ها ۱۴ جمعیت کنجد را در ۳ گروه متمایز گروه‌بندی کردند.

وزن هزار دانه با صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و ارتفاع شاخه‌بندی به ترتیب برابر 0.697^* ، 0.558^* و 0.545^* بود. افزایش همبستگی مثبت بین وزن هزار دانه و تعداد شاخه فرعی می‌تواند به این علت باشد که در ارقام با تعداد شاخه فرعی بیشتر، بیوماس گیاه به نسبت تعداد کپسول‌های تشکیل‌شده بیشتر بوده و در نتیجه وزن هزار دانه بیشتر می‌باشد. عملکرد کل بیشترین همبستگی را با طول دوره رویشی ($r=0.639^{**}$) و بعد از آن با ارتفاع شاخه‌بندی ($r=0.542^*$) داشت. ارتفاع زاینده کپسول در بوته با تعداد شاخه فرعی و ارتفاع بوته همبستگی مثبت و معنی‌داری را داشت (به ترتیب $r=0.505^*$ و $r=0.06^*$). ارتفاع زاینده (ارتفاع اولین گل از سطح زمین) همبستگی مثبت و معنی‌داری را با صفات طول کپسول، تعداد شاخه فرعی (به ترتیب $r=0.64^*$ و $r=0.635^*$)، تعداد گل در محور و ارتفاع بوته (به ترتیب $r=0.54^*$ و $r=0.578^*$) داشت. طول کپسول همبستگی مثبت و معنی‌داری را با صفات ارتفاع بوته ($r=0.567^*$) و تعداد شاخه فرعی ($r=0.634^{**}$) داشت. تعداد شاخه فرعی ارتباط منفی و معنی‌داری را با صفات درصد سبز کردن ($r=-0.535^*$) و تعداد گل در محور ($r=-0.688^{**}$) داشت. درصد روغن دانه فقط با وزن هزار دانه ($r=0.472^*$) و طول دوره رویش ($r=0.72^{**}$) همبستگی مثبت و معنی‌دار داشت و با سایر صفات همبستگی وجود نداشت. نتایج همبستگی صفات در این تحقیق با نتایج احمدی و بحرانی (۱) هم‌خوانی داشت که آن‌ها نشان داده بودند عملکرد کل با عملکرد

جدول ۱- مشخصات شجره‌ای لاین‌های کنجد مورداستفاده در آزمایش

Table 1. Characteristics of the sesame lines used in the experiment

شماره	پدبگیری
۱	(2822 x ch)x(bn * pal)
۲	(k1 * 2822)*(pal * nbn)
۳	(nbn * bn)*(nbn * ch)
۴	(D14 * nbn)(pal * mdz)*(bn * ch)(k1 * pal)* Ind * olt
۵	(ch * pal)(D14 * bn)*(mdz * k1)(nbn * pal)* Ind * olt
۶	اولتان × یکتا
۷	مغان ۱۷ × یکتا
۸	کرج ۱ × یکتا
۹	اولتان × یکتا
۱۰	اولتان × یکتا
۱۱	مغان ۱۷ × یکتا
۱۲	pal × اولتان
۱۳	(2822 * ch) (ch * ch)
۱۴	(ch * k1)*(k1 * 2822)
۱۵	اولتان
۱۶	توده محلی بیرجند

(بین لاین‌های گروه ۳) تا ۷۰/۵۱ (بین لاین‌های گروه ۲) متغیر بود. میانگین گروه‌ها از نظر صفات مختلف در جدول ۵ نشان داده شده است. گروه‌ها به‌صورت زیر تشریح می‌شوند: گروه اول: این گروه شامل لاین‌هایی با طول دوره رویشی، تعداد کپسول در بوته و تعداد گل در محور بالا می‌باشد. لاین‌های این گروه از لحاظ سایر صفات مورد بررسی به جز

پاراسایبان و همکاران (۱۳) نیز با استفاده از صفات مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های داخلی و خارجی را در ۵ گروه مجزا گروه‌بندی کردند. میانگین ضریب فاصله اقلیدسی بین و درون گروهی نشان داد که دو گروه ۱ و ۳ با ضریب فاصله ۱۴۳/۲۶ نزدیک‌ترین و جفت گروه‌های ۱، ۲ و ۳ با ضریب فاصله ۱۹۵ دورترین گروه‌ها نسبت به هم می‌باشند. فاصله درون گروهی از ۲۳/۷۸

نتایج گولپهان ارکان و همکاران (۱۰) و طباطبایی و همکاران (۲۲) مطابقت دارد. گولپهان ارکان و همکاران (۱۰) با استفاده از صفات مشابه نشان دادند که ۶ مؤلفه اصلی اول ۷۹ درصد از تغییرات کلی ۵۲ ژنوتیپ محلی کنجد را در ترکیه توجیه می‌کند. از بای پلات پراکنده‌گی افراد برای نشان دادن تنوع بین لاین‌ها و گروه‌بندی آن‌ها استفاده می‌شود. الگوی گروه‌بندی مشاهده شده در بای پلات بسیار شبیه الگوی گروه‌بندی با استفاده از تکنیک تجزیه خوشه‌ای به روش وارد می‌باشد. تفاوت اندک بین این دو نوع الگو بندی به این خاطر است که بای پلات بر اساس مؤلفه اصلی اول و دوم تنها از ۵۶/۳٪ تغییرات برای گروه‌بندی افراد استفاده می‌کند و به خاطر فقدان تنوع باقی‌مانده که در سایر مؤلفه‌ها نهفته است.

هیچ شاخصی برای تعیین معنی‌داری یا اهمیت یک ضریب در بردارهای ویژه وجود ندارد (۷). هرچند ضرایب بالا برای یک صفت معین نشان‌دهنده ارتباط آن صفت با مؤلفه اصلی مربوطه می‌باشد (۱۱، ۱۹). از آنجایی که ۴ مؤلفه اصلی اول ۷۶/۵۲ درصد کلیه تغییرات لاین‌ها را توجیه می‌کند، لذا باید به صفاتی که در این مؤلفه‌ها وزن بیشتری دارند در برنامه‌های اصلاحی و انتخاب توجه نماییم. در مؤلفه اصلی اول وزن صفات تعداد شاخه فرعی و وزن هزار دانه و در مؤلفه اصلی دوم وزن صفات درصد سبز کردن و عملکرد کل بیشتر می‌باشند. لذا در برنامه انتخاب لاین‌ها باید به این صفات توجه نماییم. استفاده از این صفات در برنامه‌های انتخاب لاین‌ها موجب صرفه‌جویی قابل‌توجهی در زمان دوره اصلاحی کنجد خواهد شد. تنوع موجود در ۴ مؤلفه اصلی اول نشان‌دهنده وجود تنوع ژنتیکی در بین لاین‌ها از لحاظ صفات بررسی شده می‌باشد. نتایج این تحقیق با نتایج فورات و همکاران (۹) هم‌خوانی دارد. آن‌ها نیز به صفات با ضرایب بالا که در مؤلفه‌های اصلی اول و دوم (که در مجموع ۳۳/۲ درصد از تغییرات کل ۱۰۳ نمونه کنجد را توجیه می‌نمود) قرار داشتند، مانند عملکرد، وزن هزار دانه و تعداد روز تا سبز شدن توجه نمودند و آن‌ها را به عنوان تعیین‌کننده‌های تنوع ژنتیکی مجموعه‌ها معرفی نمودند.

نتایج نشان داد که توده محلی بیرجند و رقم شاهد اولتان با هم در یک گروه قرار داشته و به همراه دو لاین ۱۱ و ۱۲ از لحاظ اکثر صفات وضعیت بهتری دارند و لذا برای کشت کنجد در منطقه از توده محلی بیرجند را به لحاظ سازگاری بیشتر به شرایط محیطی محل و نیز به لحاظ برتری از نظر صفات مورد بررسی توصیه نمود. همچنین دو لاین ۱۱ و ۱۲ لاین‌های امیدبخشی هستند که می‌بایست در برنامه معرفی رقم به آن‌ها توجه ویژه نمود و مورد ارزیابی عملکرد در چند سال و در چند محل قرار گیرند. همچنین سایر لاین‌ها نیز می‌بایست برای ارزیابی‌های بیشتر در مکان‌ها و سال‌های مختلف کشت شوند و لاین‌ها با سازگاری و عملکرد بالا، در فرآیندهای بعدی اصلاح مورد استفاده قرار گیرند. در تمام برنامه‌های انتخابی بر روی لاین‌های حاضر می‌بایست صفات مربوط به عملکرد مانند عملکرد کل و وزن هزار دانه مورد توجه ویژه قرار گیرند.

در مورد درصد سبز شدن بالاتر از لاین‌های گروه ۳ و پایین‌تر از گروه ۲ قرار دارند. گروه دوم: لاین‌های این گروه از لحاظ تمامی صفات مورد بررسی به جز صفات طول دوره رویشی، تعداد کپسول در بوته، تعداد گل در محور و درصد سبز کردن بالاتر از لاین‌های ۲ گروه دیگر قرار دارند. همچنین لاین‌های این گروه از لحاظ صفت درصد سبز کردن پایین‌تر از دو گروه دیگر قرار دارند.

گروه سوم: لاین‌های این گروه از لحاظ تمامی صفات مورد بررسی به جز صفت درصد سبز کردن پایین‌تر از لاین‌های دو گروه دیگر قرار دارند و تنها از لحاظ صفت درصد سبز کردن نسبت به لاین‌های دو گروه وضعیت بهتری دارند.

همچنین تنوع قابل‌توجهی از لحاظ میانگین صفات در بین گروه‌ها مشاهده شد که گروه ۲ از نظر اکثر صفات بالاتر از همه گروه‌ها و گروه ۳ تقریباً از نظر همه صفات (به‌جز درصد سبز کردن) پایین‌تر از دو گروه دیگر قرار داشت. هرچند تنوع ژنتیکی بالا برای برنامه‌های اصلاحی مخصوص مورد نیاز است، هیبریداسیون بر اساس صفات با مقادیر حداقل و حداکثر ممکن است منجر به عملکرد دانه و کارایی بالا، مخصوصاً در برنامه‌های اصلاحی کوتاه‌مدت نشود. بنابراین برای توسعه رقم‌های بهبود یافته انتخاب ژنوتیپ‌هایی با فاصله ژنتیکی قابل‌قبول و ویژگی‌های زراعی مطلوب توصیه شده است (۱۳). با توجه به میانگین گروه‌ها از لحاظ صفات مورد بررسی می‌توان اقدام به انتخاب لاین و توده محلی برتر از گروه ۲ نمود، زیرا این گروه از نظر تمامی صفات در وضعیت مناسبی قرار دارد. میانگین گروه‌ها نشان می‌دهد که لاین‌های پیشرفته حاصل از تلاقی‌ها در مقایسه با توده محلی بیرجند و اولتان توفیق چندانی ندارند، لذا به ترتیب در شرایط جغرافیایی و آب و هوایی مشابه بیرجند کشت این دو رقم قبلی توصیه می‌شود. لاین‌های اصلاحی می‌بایست در سایر مناطق نیز برای تعیین سازگاری مورد آزمون قرار گیرند.

تجزیه به مؤلفه‌های اصلی مشخص کرد که ۴ مؤلفه اصلی اول مقادیر ویژه بالاتر از ۱ را دارند که این چهار مؤلفه به ترتیب هر کدام ۳۸/۲۶٪، ۱۸/۰۶٪، ۱۰/۳۱٪ و ۹/۷۹٪ از تغییرات کلیه داده‌ها را توجیه می‌کنند. سهم تجمعی این چهار مؤلفه در توجیه تغییرات کلیه داده‌ها ۷۶/۴۲٪ می‌باشد. با توجه به بردارهای ویژه هر کدام از مؤلفه‌ها در بردار ویژه مؤلفه اصلی اول سهم صفات وزن هزار دانه و تعداد شاخه فرعی و در بردار ویژه مؤلفه اصلی دوم سهم صفات درصد سبز کردن و عملکرد کل بالا می‌باشد. از بای پلات مربوط به پراکنده‌گی افراد بر اساس مؤلفه اصلی اول و دوم که با هم ۵۶/۳۲٪ تغییرات کلی داده‌ها را توجیه می‌کنند برای گروه‌بندی لاین‌ها استفاده شد (شکل ۲). همان‌طوری که مشاهده می‌شود بر اساس این بای پلات ۴ گروه مشخص را می‌توان تعیین نمود. گروه اول شامل ۹ لاین (L1, L10, L5, L9, L7, L6, L4, L3 و L13) می‌باشد. گروه دوم شامل ۳ لاین بود که شامل لاین‌های ۱۲، ۱۱ و رقم اولتان بود. گروه سوم شامل ۳ لاین شامل لاین‌های ۲، ۸ و ۱۴ بود. گروه چهارم تنها شامل توده محلی بیرجند بود. نتایج تجزیه به مؤلفه اصلی تقریباً با

جدول ۲- تجزیه واریانس مرکب صفات مختلف در بررسی روابط صفات کمی در لاین‌های پیشرفته کنجد

Table 2. Combined variance analysis of different traits in the study of relationships of quantitative traits in advanced lines of sesame

منابع تغییرات	درجه آزادی	وزن هزار دانه (گرم)	عملکرد دانه (گرم در مترمربع)	ارتفاع زاینده کپسول در بوته (Cm)	ارتفاع زاینده (Cm)	ارتفاع شاخه‌بندی (Cm)	ارتفاع بوته (Cm)	ارتفاع اولین کپسول (Cm)	تعداد کپسول در بوته	طول کپسول (Cm)	تعداد گل در محور	درصد روغن جوانه‌زنی
سال	۱	۰/۸۶۷ ^{ns}	۱۳۸۹۴۴/۲ ^{ns}	۱۰۶۴۳/۴ ^{ns}	۱۶۸۸۹/۰ ^{ns}	۹۱۷/۵۲ ^{ns}	۲۹۰۸۸/۷ ^{ns}	۳۸۹/۹۰ ^{ns}	۱۹۷۱۴۴/۹ ^{ns}	۱/۹۶ ^{ns}	۴۷/۲۶ ^{ns}	۳۲/۹۸۲ ^{ns}
بلوک (سال)	۴	۰/۰۳۴۴ ^{ns}	۱۱/۹۲ ^{ns}	۹۱۰/۷۰ ^{ns}	۹۱۵/۶۹ ^{ns}	۴۶/۱۴ ^{ns}	۱۳۷۴/۴۹ ^{ns}	۱۰۲/۳۱۳ ^{ns}	۶۶۹۲/۵ ^{ns}	۰/۷۶۵ ^{ns}	۱/۲۴ ^{ns}	۵۸/۱ ^{ns}
رقم	۱۵	۰/۳۴۳ ^{ns}	۵/۸۵ ^{ns}	۳/۰۱ ^{ns}	۲۸/۰۳ ^{ns}	۳/۰۹ ^{ns}	۲۱۰/۸۱ ^{ns}	۹۵/۴۸ ^{ns}	۳۴۸۴/۵۸ ^{ns}	۹/۵۵ ^{ns}	۸/۲۵ ^{ns}	۶۵/۳ ^{ns}
رقم در سال	۱۵	۰/۰۳۷ ^{ns}	۳۵۵۱/۶ ^{ns}	۱۳۱/۴۵ ^{ns}	۱۳۲/۸۱ ^{ns}	۱۱/۶۷ ^{ns}	۱۳۷/۲۰ ^{ns}	۴۷/۴۷ ^{ns}	۱۰۸۰/۳۶ ^{ns}	۰/۰۵۴ ^{ns}	۱/۰۵۹ ^{ns}	۳۴/۶۵۲ ^{ns}
خطا	۱۲۷	۰/۰۴۱	۷۱۲/۱۹	۴۶/۴۵	۲/۵۸	۴۶/۴۳	۱۲۴/۴۹	۳۰/۶۱	۹۹۰/۹۵	۰/۵۲۳۵	۰/۳۸۶۹	۶۸/۳۸۱
ضریب تغییرات		۸/۰۹	۲۲/۸۶	۱۹/۸۴	۱۸/۵۵	۳۳/۶۳	۱۳/۱۴	۲۱/۹	۳۴/۸۲	۸/۲۸	۲۳/۴۳	۲/۵۳

* و **: به ترتیب معنی‌دار در سطح احتمال ۵ و یک درصد و ns عدم معنی‌داری می‌باشد.

جدول ۳- مقایسات میانگین برخی صفات در طرح بررسی روابط صفات کمی در لاین‌های پیشرفته کنجد

Table 3. Mean comparison of some of traits in study of relationships of quantitative traits in advanced lines of sesame

شماره لاین	درصد روغن دانه	وزن هزار دانه (گرم)	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)	طول دوره رویش (روز)	ارتفاع بوته (cm)	تعداد کپسول در بوته
۱	۵۵/۱۶ ^a	۲/۶۵ ^{abcd}	۱۱۹۱/۶ ^{bc}	۱۰۷/۰ ^b	۸۴/۰۹ ^{ab}	۸۹/۹۱ ^{abc}
۲	۴۸/۳۶ ^a	۲/۳۳ ^{ef}	۱۰۲۸/۱ ^{bc}	۹۹/۵ ^e	۷۵/۷۱ ^b	۸۹/۸۰ ^{bc}
۳	۵۲/۸۷ ^a	۲/۵۱ ^{cde}	۱۰۲۵/۶ ^{bc}	۱۰۲/۰ ^d	۸۴/۱۳ ^{ab}	۷۱/۵۴ ^{bc}
۴	۵۲/۳۶ ^a	۲/۶۷ ^{abcd}	۱۳۸۴/۲ ^b	۱۰۲/۰ ^d	۸۴/۸۷ ^{ab}	۹۷/۴۸ ^{abc}
۵	۵۲/۸۷ ^a	۲/۴۹ ^{cde}	۱۲۵۱/۰ ^{bc}	۱۰۲/۰ ^d	۸۸/۱۰ ^{ab}	۱۱۷/۴۰ ^{ab}
۶	۵۳/۳۶ ^a	۲/۴۶ ^{cde}	۱۲۲۸/۸ ^{bc}	۱۰۲/۰ ^d	۸۲/۷۷ ^{ab}	۸۵/۱۵ ^{bc}
۷	۵۲/۸۷ ^a	۲/۵۷ ^{bcd}	۹۵۲/۳ ^c	۱۰۴/۰ ^c	۸۷/۳۱ ^{ab}	۸۲/۰ ^{bc}
۸	۵۳/۰۰ ^a	۲/۱۱ ^f	۹۳۰/۵ ^c	۹۹/۵ ^e	۷۷/۰۵ ^{ab}	۹۳/۵۳ ^{abc}
۹	۵۳/۳۶ ^a	۲/۵۹ ^{bcd}	۱۱۵۸/۰ ^{bc}	۱۰۲/۰ ^d	۹۰/۳۵ ^{ab}	۸۲/۰۲ ^{bc}
۱۰	۵۳/۳۶ ^a	۲/۴۱ ^{de}	۱۳۸۸/۳ ^b	۱۰۴/۰ ^c	۸۵/۹۷ ^{ab}	۹۵/۸۷ ^{abc}
۱۱	۵۲/۸۶ ^a	۲/۳۹ ^{de}	۱۲۳۳/۴ ^{bc}	۹۹/۵ ^b	۸۱/۱۴ ^{ab}	۹۵/۶۸ ^{abc}
۱۲	۵۰/۳۶ ^a	۲/۸۲ ^{ab}	۹۹۹/۰ ^{bc}	۹۹/۵ ^b	۹۳/۴۰ ^a	۶۷/۹۱ ^c
۱۳	۴۹/۸۷ ^a	۲/۲۸ ^{ef}	۱۱۵۳/۶ ^{bc}	۱۰۴/۰ ^c	۸۷/۷۵ ^{ab}	۹۴/۹۹ ^{abc}
۱۴	۴۸/۳۶ ^a	۲/۳۷ ^{def}	۱۰۳۸/۹ ^{bc}	۱۰۲/۰ ^d	۷۷/۳۰ ^{ab}	۶۵/۶۹ ^c
اولتان	۵۱/۸۷ ^a	۲/۷۵ ^{abc}	۹۰۷/۳ ^c	۱۰۲/۰ ^d	۸۷/۲۱ ^{ab}	۸۸/۰۶ ^{bc}
توده محلی بیرجند	۵۵/۳۶ ^a	۲/۸۹ ^a	۱۸۱۲/۷ ^a	۱۱۱/۵ ^a	۹۱/۱۴ ^{ab}	۱۳۶/۲۶ ^a


میانگین‌هایی در هر ستون که دارای حداقل یک حرف مشابه می‌باشند بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ تفاوت معنی‌دار ندارند.

جدول ۴- ضرایب همبستگی پیرسون بین صفات مختلف

Table 4. Pearson correlation coefficients between different traits

صفات	وزن هزار دانه	عملکرد دانه	طول دوره رویش	ارتفاع زاینده در کیسول بوته	ارتفاع زاینده	ارتفاع شاخه‌بندی بوته	ارتفاع بوته	ارتفاع اولین کیسول	تعداد کیسول در بوته	طول کیسول	تعداد شاخه فرعی	تعداد گل در محور	درصد سبز کردن دانه	درصد روغن دانه
درصد روغن دانه	۰/۴۷۲*	۰/۳۳ ^{NS}	۰/۷۲۰**	۰/۱۱۵ ^{NS}	۰/۱۲۸ ^{NS}	۰/۲۹۱ ^{NS}	۰/۱۸۳ ^{NS}	۰/۰۷۱ ^{NS}	۰/۰۲۸ ^{NS}	۰/۲۷۰ ^{NS}	۰/۳۴۳ ^{NS}	۰/۱۴۹ ^{NS}	۰/۱۴۹ ^{NS}	۱
درصد سبز کردن	۰/۳۰۳ ^{NS}	۰/۳۷۵ ^{NS}	۰/۲۹۷ ^{NS}	۰/۱۴۳ ^{NS}	۰/۴۲۶ ^{NS}	۰/۰۰۸ ^{NS}	۰/۱۴ ^{NS}	۰/۲۲۴ ^{NS}	۰/۰۵۳ ^{NS}	۰/۴۲۷ ^{NS}	۰/۵۳۵*	۰/۳۸۱ ^{NS}	۱	۰/۱۴۹ ^{NS}
تعداد گل در محور	۰/۴۱۱ ^{NS}	۰/۰۱۹ ^{NS}	۰/۰۷ ^{NS}	۰/۱۷۶ ^{NS}	۰/۵۴*	۰/۱۳۴ ^{NS}	۰/۲۲۴ ^{NS}	۰/۱۱۳ ^{NS}	۰/۲۲۴ ^{NS}	۰/۴۵۳ ^{NS}	۰/۶۸۸**	۱	۰/۳۸۱ ^{NS}	۰/۱۴۹ ^{NS}
تعداد شاخه فرعی	۰/۵۵۸*	۰/۳۴۲ ^{NS}	۰/۳۶۹ ^{NS}	۰/۵۰۵*	۰/۶۳۵**	۰/۴۳۵ ^{NS}	۰/۴۵۵ ^{NS}	۰/۲۹۴ ^{NS}	۰/۰۷۶ ^{NS}	۰/۶۳۴**	۱	۱	۰/۳۴۳ ^{NS}	۰/۴۵۳ ^{NS}
طول کیسول	۰/۴۷۷ ^{NS}	۰/۲۳۸ ^{NS}	۰/۲۵۱ ^{NS}	۰/۴۷۷ ^{NS}	۰/۶۴۰**	۰/۱۲۱ ^{NS}	۰/۵۶۷*	۰/۰۰۹ ^{NS}	۰/۰۶۲ ^{NS}	۱	۱	۱	۰/۶۳۴**	۰/۴۵۳ ^{NS}
تعداد کیسول در بوته	۰/۰۰۳ ^{NS}	۰/۱۱۲ ^{NS}	۰/۰۰۴ ^{NS}	۰/۱۱۹ ^{NS}	۰/۲۰۹ ^{NS}	۰/۲۹۸ ^{NS}	۰/۰۱۳ ^{NS}	۰/۲۵۷ ^{NS}	۱	۱	۱	۱	۰/۰۶۲ ^{NS}	۰/۰۰۹ ^{NS}
ارتفاع اولین کیسول	۰/۳۷۷ ^{NS}	۰/۱۸۵ ^{NS}	۰/۱۹۶ ^{NS}	۰/۲۹۵ ^{NS}	۰/۰۹۴ ^{NS}	۰/۳۵۵ ^{NS}	۰/۱۲۸ ^{NS}	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۰۰۹ ^{NS}	۰/۰۱۳ ^{NS}
ارتفاع بوته	۰/۶۹۷**	۰/۳۷۱ ^{NS}	۰/۴۱۲ ^{NS}	۰/۶۰*	۰/۵۷۸*	۰/۴۴۷ ^{NS}	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۰۱۳ ^{NS}	۰/۰۹۴ ^{NS}
ارتفاع شاخه بندی	۰/۵۴۵*	۰/۵۴۲*	۰/۴۴۸ ^{NS}	۰/۳۸۹ ^{NS}	۰/۱۱۳ ^{NS}	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۱۱۳ ^{NS}	۰/۱۱۳ ^{NS}
ارتفاع زاینده	۰/۴۹۷ ^{NS}	۰/۳۱۹ ^{NS}	۰/۰۱۸ ^{NS}	۰/۴۲۳ ^{NS}	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۱۱۳ ^{NS}	۰/۱۱۳ ^{NS}
ارتفاع زاینده کیسول در بوته	۰/۴۵۶ ^{NS}	۰/۴۵ ^{NS}	۰/۳۳۱ ^{NS}	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۳۳۱ ^{NS}	۰/۳۳۱ ^{NS}
طول دوره رویش	۰/۴۷۱ ^{NS}	۰/۶۴۹**	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۶۴۹**	۰/۶۴۹**
عملکرد	۰/۴۲۹ ^{NS}	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۴۲۹ ^{NS}	۰/۴۲۹ ^{NS}
وزن هزار دانه	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱

* و **: به ترتیب معنی‌دار در سطح احتمال ۵ و یک درصد و NS عدم معنی‌داری می‌باشد.




شکل ۱- دندروگرام بر اساس روش وارد و مربع فاصله اقلیدسی
 Figure 1. Dendrogram according to Ward's method and Square of Euclidean distance

جدول ۵- میانگین صفات در گروه‌های مختلف

Table 5. Mean of traits in different groups

گروه	وزن هزار دانه	عملکرد	طول دوره رویش	ارتفاع زاینده کپسول در بوته	ارتفاع زاینده شاخه‌بندی	ارتفاع بوته	ارتفاع اولین کپسول	تعداد کپسول در بوته	طول کپسول	تعداد شاخه فرعی	تعداد گل	سبز کردن
۱	۲/۵۱	۱۱۹/۲۵	۱۰۳/۲۲	۳۴/۶۵	۱۳/۸۸	۸۶/۱۵	۲۵	۱۸۱/۶۵	۲/۷۳	۱/۷۸	۳/۰۹	۸۷/۳۷
۲	۲/۷۱	۱۲۳/۱۵	۱۰۳/۱۲۵	۳۷/۸	۱۴/۹۱	۸۸/۲۲	۲۶/۱۴	۹۶/۹۷	۳/۰۲	۴/۱۵	۱/۷۸	۷۷/۶۲
۳	۲/۲۷	۹۹/۹۱	۱۰۰/۳۳	۲۸/۸۵	۵۶/۳۴	۷۶/۶۸	۲۳/۷۲	۸۰/۰۶	۲/۵	۱/۳	۲/۴۸	۸۸/۳۷



شکل ۲- گروه‌بندی بر اساس مؤلفه اصلی اول و دوم
 Figure 2. Grouping according to the first and second main components

منابع

- Ahmadi, M. and M.J. Bahrani. 2009. Effect of nitrogen fertilizer on yield and yield components of three sesame cultivars in Bushehr province. *Science and Technology of Agriculture and Natural Resources*, 48(2): 131-123 (In Persian).
- Ashri, A. 1998. Sesame breeding. In: Janick J (Eds.) *Plant breeding review*. John Wiley & Sons, Inc. pp: 179-228.
- Ashri, A. 2010. Sesame breeding. In: J Janick, (Eds.) *Plant breeding reviews*, Volume 16. John Wiley & Sons Inc. Oxford, 454 pp.
- Askari, A., M. Zabet, M.G. Ghaderi, A.R. Samadzadeh and A. Shorvazdi. 2016. Choose the most important traits affecting on yield of some sesame genotypes (*Sesamum indicum* L.) in normal and stress conditions. *Journal of Crop Breeding*, 18: 78-87 (In Persian).
- Bedigian, D., D.S. Seigler and J.R. Harlan. 1986. Sesamin, Sesamolin and the origin of sesame. *Biochemical Systematics and Ecology*, 13: 133-139.
- Dini Torkamani, M.R. and J. Carapetian. 2007. An Investigation of physical and chemical characteristics of seed in ten sesame (*Sesamum indicum* L.) varieties. *Iranian Journal of Biology*, 20(4): 327-333 (In Persian).
- Düzyaman, E. 2005. Phenotypic diversity within a collection of distinct okra (*Abelmoschus esculentus*) cultivars derived from Turkish landraces. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 52: 1019-1030.
- Elleuch, M., D. Bedigian, S. Besbes, C. Blecker and H. Attia. 2011. Dietary fiber characteristics and antioxidant activity of sesame seed coats (testae). *International Journal of Food Properties* 15: 25-37.
- Furat, S. and B. Uzun. 2010 the use of agro-morphological characters for the assessment of genetic diversity in sesame (*Sesamum indicum* L.). *Plant Omics Journal*, 3(3): 85-91.
- Gulhan ercan, A., K. Melih ta kin, K. Turgut, M. Bilgen and M. Ziya Firat. 2002. Characterization of Turkish sesame (*Sesamum indicum* L.) landraces using agronomic and morphologic descriptors. *Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 15(2): 45-52.
- Khan, A.S., M.R. Rabbani, M.A. Siddique and M.I. Hossain. 2008. Study on genetic diversity of pointed gourd using morphological characters, *Bangladesh Journal of Agricultural Research*, 33: 607–616.
- Mansouri, S. and M.R. Ahmadi. 1998. The combination ability and gene action in sesame (*Sesamum indicum* L.) lines using diallel cross, *Iranian Journal of Agricultural Sciences*, 29: 27-55 (In Persian).
- Parsaeian M, A. Mirlohi and G. Saeedi. 2011. Study of genetic variation in sesame (*Sesamum indicum* L.) using agro-morphological traits and ISSR markers. *Russian Journal of Genetics*, 47(3): 314-321.
- Pham, T., M. Geleta, T.M. Bui, T.C. Bui, A. Merker and A.S. Carlsson. 2011. Comparative analysis of genetic diversity of sesame (*Sesamum indicum* L.) from Vietnam and Cambodia using agro-morphological and molecular markers. *Hereditas*, 148: 28-35.
- Ramazani, S.H.R. 2013. Investigation on the yield and yield components of Iranian promising Sesame (*Sesamum indicum* L.) lines. *International Journal of Agriculture and Crop Sciences*, 6(1): 23-26.
- Saeedi, G.A. 2008. Impact of macro and micronutrients on grain yield and other agronomic traits of sesame in Esfahan. *Science and Technology of Agriculture and Natural Resources*, 48(3): 390-379 (In Persian).
- Salehi M. and G. Saeidi. 2012. Genetic variation of some agronomic traits and yield component in breeding lines of sesame. *Journal of Crop Breeding*, 9:77-92 (In Persian).
- SAS Institute. 2002. *The SAS System for Windows*. Release 9.0 SAS Inst., Cary, NC. USA.
- Sneath, P.H.A. and R.R. Sokal. 1975. Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification. *Systematic Zoology*, 24(2): 263-268.
- Solanki, Z.S. and D. Gupta. 2001. Combining Ability and Heterosis Studies for Seed Yield and Its Components in Sesame, *Sesame and Safflower Newsletter*, (16): 9-12.
- SPSS Inc. 2007. *SPSS for windows*. Release 16, Standard.
- Tabatabaei, A., M.R. Bihamta, S. Mansouri and M. Jalali-Javaran. 2009. Evaluation of the genetic diversity of sesame genotypes (*Sesamum indicum* L.) using morphological traits and RAPD markers. *Modern Genetics*, 4 (2): 57-68 (In Persian).
- Were, B.A., O.A. Onkware, S. Gudu, M. Welander, A.S. Carlsson. 2006. Seed oil content and fatty acid composition in East African sesame (*Sesamum indicum* L.) accessions evaluated over 3 years. *Field Crops Research*, 97: 254-260.
- Yol, E. and B. Uzun. 2012. Geographical patterns of sesame accessions grown under Mediterranean environmental conditions, and establishment of a core collection. *Crop Science*, 52: 2206-2214.

Relationships of Quantitative Traits in Advanced Lines of Sesame

Seyed Hamid Reza Ramazani¹ and Sadollah Mansouri²

1- Assistant Professor, University of Birjand, (Corresponding Author: hrramazani@Birjand.ac.ir)

2- Research Teacher, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj

Received: October 27, 2015

Accepted: May 31, 2016

Abstract

Fourteen sesame lines that have preferred in primary evaluation, with local mass of Birjand (as test) and Ooltan cultivar (as overall test) were compared for two years in completely block design with 4 replication. Traits measured in this study were germination percent, number of flower per axis, number of sub branch, capsule length, plant height, number of capsules per plant, height of first capsule, height of branching, flowering branch height, flowering capsule height/plant, growth period, 1000 grain weight, total grain yield. 1000 grain weight was positively and significantly correlated with plant height ($r=0.697$, $P<0.01$). Cluster analysis based agro-morphological traits and by using ward method resulted in 3 distinct groups. Group 2 which consists of local mass of Birjand, Ooltan cultivar, line 11 and line 12 was superior group in view of majority of trait means. This group had most distance from 2 other groups. Principle component analysis suggest that 4 first component have Eigen values more than 1 and these components explain 76.42% total variation of lines and cultivars. In first principle component coefficients of number of sub branch and 1000 grain weight and in second principle component coefficients of germination percent and total grain yield were higher. Thus these traits should be notice in next breeding programs. Classification based on mentioned traits suggest that for sesame cultivation in south Khorasan, local mass of Birjand is better than other lines due to superiority in terms of mentioned characters.

Keywords: Cluster Analysis, Principle Component Analysis, Sesame, Superior Group