



"مقاله نوشته شد."

شناسایی ژنوتیپ‌های کلزای متحمل به خشکی با استفاده از تحلیل چندمتغیره

بهروز امینزاده<sup>۱</sup>, بهزاد ثانی<sup>۱</sup>, بهرام علیزاده<sup>۲\*</sup> و حمید مظفری<sup>۱</sup>

- ۱- گروه رعایت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران  
۲- موسسه تحقیقات اصلاح و تهییه و نهال بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران، نویسنده مسؤول: alizadeh.oilseed@gmail.com  
تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۷/۲۵ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸  
صفحه: ۷۸ تا ۸۴

چکیده مبسوط

**مقدمه و هدف:** تنش خشکي به عنوان يك از مهمترین تنش های غيربزيستي عامل محدود کننده اصلی کشت کلزا در مناطق خشک و نيمه خشک به شمار می رود. بنابراین، شناسایي ژنتوپیپ های متتحمل به خشکی، يكی از برنامه های ضروری در این مناطق به شمار می رود. يکی از روش های مناسب به مظاوم شناسایي ژنتوپیپ های متتحمل به خشکی استفاده از شخص های تحمل به تنش می باشد. در این راستا، مطالعه پیش روی شناسایي ژنتوپیپ های متتحمل به خشک، ازین، ۳۸ ژنتوپیپ کلزا: مسitanه با استفاده از شخص های تحمل، به خشک، طراحی شد.

**مواد و روشنها:** این آزمایش براساس طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۴۰۵ انجام شد. در آزمایش نرمال، آبیاری در پنجم مرحله انجام شد، درحالی که در شرایط تنش خشکی، آبیاری قبل از شروع گلدهی، متوقف شد. عملکرد ژنتیکی ها تحت شرایط نرمال و خشکی با استفاده از شاخص تحمل خشکی شامل TOL، MP، HM، GMP، YSI، STI، SSI، YR، KISTI و RDI برای شناختی ژنتیکی های حساس و متتحمل به خشکی مورد بررسی قرار گرفت.

**یافته ها:** تجزیه واریانس اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ های ارزیابی شده برای تمام شاخص های تحت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، بیشترین ضریب تغییر پذیری ژنوتیپ برای ساخته های TOL و SSI، YR و K2ST1 مشاهده گردید. تحلیل همبستگی، ارتباط مثبت و معنی داری بین Yp و YR و SSI، همچنین ارتباط منفی و معنی داری با Ys را نشان داد. بر اساس تجزیه به مؤلفه های اصلی دو مؤلفه اول درصد کل تغییرات مشاهده شده را به خود اختصاص دادند. ۳۶/۶۵ و ۲۸/۳۴ درصد تغییرات به ترتیب توسط مؤلفه های اول و دوم پوشش داده شدند. مؤلفه اول، ژنوتیپ های متحمل را تشخیص داد، در حالی که مؤلفه دوم ژنوتیپ های حساس به خشکی را شناسایی نمود. تجزیه خوشایی، ضمن تأیید نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه های اصلی، ژنوتیپ ها را در سه دسته طبقه بندی نمود. همچنین با استفاده از تجزیه خوشایی نتایج تجزیه به مؤلفه های اصلی را تأیید کرد و ژنوتیپ های متحمل به خشکی را از ژنوتیپ های حساس تفکیک نمود.

**نتیجه گیری:** درنهایت، این تحقیق پنج ژنوتیپ برتر را شناسایی نمود، ازجمله G10، G18، G23 و G33 که متحمل ترین ژنوتیپ‌ها در مقابل خشکی بوده و عملکرد آنها تحت شرایط رنمال و تنش خشکی تفاوت معنی داری تنداشت.

**واژه‌های کلیدی:** تجزیه به مؤلفه اصلی، تنش، شاخص‌های تحمل به خشکی، کانولا و Brassica

مقدمة

شب بوبیان<sup>۱</sup> یکی از ۱۰ خانواده محصولات اقتصادی ضروری است (۲۹). از میان این خانواده، کلزا (گونه Brassica) هزاران سال است که برای تولید روغن مورد استفاده قرار می‌گیرد (۳۰). براساس گزارش FAO، کلزا به عنوان دومین دانه روغنی پس از سویا معروفی شده و در مساحتی برابر با ۴۴۱۳۰ هکتار در سرتاسر دنیا برداشت می‌شود (۷).

ایران از نظر سطح زیر کشت کلزا، ۱۲۷ امین کشور دنیا محسوب می‌شود (۷)، اما کشاورزی در ایران با تنش خشکی مواجه می‌باشد. نرخ تعرق در ایران در طول چهار دهه گذشته، کاهش یافته است (۲۸)، در حالی که گونه Brassica با مناطق پربارش سازگار می‌باشد. عملکرد دانه کلزا تا حد زیادی تحت تأثیر تنش خشکی قرار دارد (۲۲ و ۲۱). تغیرات قیم دائمی به افزایش تنش غیرزیستی از جمله تنش گرما و خشکی تولید کلزا را تهدید می‌کند (۱۵). همچنین، گزارش شده است که کلزا و سایر گونه‌های Brassica بیشتر تحت تأثیر خشکی هستند؛ زیرا عمدتاً در مناطق خشک و نیمه‌خشک پرورش می‌یابند. بنابراین، راهبردهای مختلفی برای مقابله با تنش خشکی به کار گرفته شده‌اند، که از مهم‌ترین آنها می‌توان توسعه سیستم‌های آبیاری، بهبود مدیریت محصول و به کارگیری روش‌های اصلاح نباتات را نام برد (۱۶). شناسایی

---

## 1- Brassicaceae

## مواد و روش‌ها

### طراحی آزمایش و تیمار خشکی

در مطالعه حاضر، ۳۸ کلزا زمستانه در مزرعه آزمایشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر<sup>۱</sup> در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو آزمایش محذا (شرایط نرمال و خشکی) در سال زراعی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ کشت شدند. طول و عرض جغرافیایی مزرعه آزمایشی به ترتیب ۵۱ درجه و ۶۰ دقیقه شرقی و ۳۹ درجه و ۴۹ دقیقه شمالی می‌باشد. ارتفاع از سطح دریا، ۱۲۳۱ متر و میزان بارش ۲۴۲ میلی‌متر بود که به عنوان مناطق خشک و نیمه‌خشک در نظر گرفته می‌شود. مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک در مزرعه آزمایشی قبیل و حین آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. کشت آزمایش ۱۰ مهر و به روش هیرم کاری انجام شد. ژنتیپ‌های ارزیابی شده و ارقام شاهد در جدول ۱ مشخص شده‌اند. چهار دیف برای هر قطعه آزمایش با طول ۴ متر، عرض ۱/۲ متر و فاصله گذاری ۳۰ سانتی‌متری در نظر گرفته شدند. فاصله بین کرت‌ها ۱۰۰ سانتی‌متر و بین تکرارها ۲۰۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شد. کاشت شیاری دو دیفه در هر قطعه آزمایشی به کار گرفته شدند. پس از آماده‌سازی زمین، کوددهی (اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتانس به ترتیب به میزان ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و کوده اوره به صورت تقطیعی در سه مرحله) انجام شد. نمونه‌گیری اعماق مختلف خاک شامل ۰-۳۰ سانتی‌متر و ۳۰-۶۰ سانتی‌متر در هر دو آزمایش نرمال و خشکی چهار مرتبه با استفاده از اوگر انجام شد. به منظور تعیین درصد رطوبت خاک، نمونه‌های خاک در یک آون خشک کننده با دمای ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت قرار داده شدند. آبیاری شیاری در مزارع آزمایشی اعمال شد. در آزمایش نرمال، آبیاری طی پنج مرحله انجام شد، که شامل آبیاری مراحل کاشت، روزت، شروع گله‌ی، شروع تشکیل غلاف و توسعه دانه بودند؛ اما تیمار خشکی تهها دوبار قبیل از شروع گله‌ی، آبیاری شد. طی فصل رشد، صفات کمی متعددی نظیر ارتفاع گیاه، تعداد شاخه‌های فرعی، تعداد غلاف در شاخه‌های اصلی، تعداد غلاف‌ها در شاخه‌های فرعی، تعداد کل غلاف‌ها، طول ساقه اصلی، فاصله شاخه اول از زمین، طول غلاف، تعداد دانه‌ها در هر غلاف، وزن هزار دانه، درصد میزان روغن در دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه بررسی شدند.

متتحمل‌ترین رقم شناسایی شد (۱۸). مطالعه دیگری گزارش نمود که رقم الیت متتحمل‌ترین رقم به خشکی است (۲۵). همچنین گزارش شده است که طول ریشه/اندام هوایی در ارقام مختلف، یکسان نبوده و کل گیاه، طول ریشه، نسبت ریشه/اندام هوایی به طور قابل توجهی تحت تأثیر تنش خشکی می‌باشد (۱۳). تجمع پرولین و افزایش فعالیت پروکسیداز اسکوربات و جذب K<sup>+</sup> به عنوان مکانیسم‌های ایجاد تحمل به خشکی در کلزا گزارش شده‌اند (۱۹). بهره‌وری مصرف آب به عنوان یک روش غیرمستقیم انتخاب رقم متتحمل به خشکی برای عملکرد دانه تحت شرایط تنش خشکی در کلزا معرفی می‌شود (۸).

تحقیقات متعددی برای شناسایی ارقام متتحمل و حساس به خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش انجام شدند. تحلیل شاخص‌های تحمل به خشکی به عنوان یکی از روش‌های استاندارد برای ارزیابی تحمل به خشکی گزارش می‌شود (۵). متوسط بهره‌وری (۲۳)، شاخص تحمل (۲۳)، بهره‌وری متوسط هندسی (۱۰)، شاخص مقاومت به تنش (۱۰)، شاخص تنش (۱۱)، شاخص حساسیت به تنش (۱۱)، شاخص پایداری عملکرد (۳) و متوسط بهره‌وری هارمونی (۲۴) برخی شاخص‌های ضروری برای شناسایی ارقام متتحمل و حساس به خشکی محسوب می‌شوند. ارزیابی ارقام تحت شرایط نرمال و تنش به طور همزمان به عنوان روشی مفید برای شناسایی ارقام متتحمل به خشکی معرفی شده‌اند (۲۷). براساس شاخص مقاومت به تنش و بهره‌وری متوسط هندسی، ارقام لیکورد و طلایی مناسب‌ترین ارقام شناخته شدن؛ ارقام زرفا و مودنا به ترتیب به عنوان متتحمل‌ترین و حساس‌ترین ارقام شناخته شدند (۳۱). همچنین، براساس شاخص حساسیت به تنش، رقم ساری گل به عنوان رقم حساس به خشکی طبقه‌بندی می‌شود، در حالی که ارقام هیولا ۳۰۸ و SW5001 ارقام متتحمل به خشکی در بین ارقام بهاره می‌باشد (۱۴). رقم ساری گل نیز کمترین نرخ بهره‌وری مصرف آب را نشان داد (۲۰)، با این حال، در مطالعه دیگری در مورد اثر تنش خشکی بر ارقام کلزا، ساری گل و زرفا نسبت به رقم اوکایی تحت شرایط خشکی عملکرد بیشتری داشتند (۳۵).

در این تحقیق به منظور شناسایی ژنتیپ‌های متتحمل و حساس به خشکی، ۳۸ ژنتیپ کلزا در دو شرایط نرمال و تنش خشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش، ژنتیپ‌های متتحمل و حساس شناسایی شدند.

جدول ۱- ژنوتیپ‌های کلزای مورد بررسی در این مطالعه و منشاء آنها

Table 1. The evaluated oilseed rape genotypes and their origins

شجره	ژنوتیپ	شماره	شجره	ژنوتیپ	شماره
Sunday×Geronimo	WRL-95-20	۲۰	GA096×Zarfam	WRL-95-01	۱
Okapi×GA096	WRL-95-21	۲۱	Modena×GAo96	WRL-95-02	۲
Orient×Modena	WRL-95-22	۲۲	Sunday×Geronimo	WRL-95-03	۳
Okapi×SW0756	WRL-95-23	۲۳	Modena×Okapi	WRL-95-04	۴
Okapi×SW0756	WRL-95-24	۲۴	Sunday×Geronimo	WRL-95-05	۵
Geronimo×Sunday	WRL-95-25	۲۵	Okapi×GA096	WRL-95-06	۶
Sunday×Modena	WRL-95-26	۲۶	Orient×Modena	WRL-95-07	۷
Okapi×Modena	WRL-95-27	۲۷	Okapi×SW0756	WRL-95-08	۸
Geronimo×Sunday	WRL-95-28	۲۸	Okapi×SW0756	WRL-95-09	۹
Geronimo×Sunday	WRL-95-29	۲۹	Geronimo×Sunday	WRL-95-10	۱۰
Okapi×Modena	WRL-95-30	۳۰	Sunday×Modena	WRL-95-11	۱۱
Okapi×Modena	WRL-95-31	۳۱	Okapi×Modena	WRL-95-12	۱۲
Okapi×Modena	WRL-95-32	۳۲	Geronimo×Sunday	WRL-95-13	۱۳
Okapi×Modena	WRL-95-33	۳۳	Geronimo×Sunday	WRL-95-14	۱۴
Okapi×SW0756	WRL-95-34	۳۴	Okapi×Modena	WRL-95-15	۱۵
RGS003*Okapi	WRL-95-35	۳۵	Okapi×Modena	WRL-95-16	۱۶
RGS003*SLM046	WRL-95-36	۳۶	Okapi×Modena	WRL-95-17	۱۷
Okapi*Modena	رقم نیما (شاهد)	۳۷	Okapi×Modena	WRL-95-18	۱۸
Geronimo * SW0756	رقم احمدی (شاهد)	۳۸	Sunday×Modena	WRL-95-19	۱۹

پتانسیل عملکرد بالا می‌شود (۱۰، ۲۳)؛ اما بهره‌وری متوسط هندسی قدرت تفکیک بیشتری دارد (۱۰). در انتخاب برمنای شاخص متوسط هارمونیک، ژنوتیپ‌های مقاوم‌تر محسوب می‌شوند که مقادیر بیشتری از این شاخص را داشته باشند (۲۴). انتخاب برمنای شاخص تحمل تنش منجر به انتخاب ژنوتیپ‌های با مقاومت بیشتر به خشکی و عملکرد بالقوه بیشتر می‌شود (۱۰). شاخص پایداری عملکرد، نشان‌دهنده میزان مقاومت ژنتیکی به تنش خشکی است و درنتیجه ژنوتیپ با مقادیر بیشتر از این شاخص باید عملکرد بالایی در هر دو محیط تنش و نرمال داشته باشد (۳). انتخاب بر منای مقادیر کمتر شاخص تحمل، منجر به تنش نشان‌دهنده تغییرات ناچیز عملکرد یک ژنوتیپ در وضعیت تنش نسبت به وضعیت نرمال و درنتیجه پایداری بیشتر آن ژنوتیپ است (۱۱). مقادیر بیشتر شاخص اصلاح شده تحمل تنش برای شرایط غیرتنش، شاخص اصلاح شده تحمل تنش برای شرایط تنش و شاخص خشکی نسبی نیز نشان‌دهنده مقاومت بیشتر به خشکی می‌باشند (۹).

### تحلیل آماری

در تحقیق حاضر، همه صفات کمی مورد بررسی در دو شرایط نرمال و تنش خشکی مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند. علاوه‌بر این، پس از اندازه‌گیری عملکرد ژنوتیپ‌های مورد بررسی تحت شرایط نرمال<sup>۱</sup> و تنش<sup>۲</sup>، شاخص‌های تحمل به خشکی شامل شاخص تحمل<sup>۳</sup> (۲۳)، شاخص متوسط بهره‌وری<sup>۴</sup> (۲۳)، شاخص بهره‌وری متوسط هندسی<sup>۵</sup> (۱۰)، متوسط شاخص هارمونیک<sup>۶</sup> (۲۴)، شاخص تحمل تنش<sup>۷</sup> (۱۰)، شاخص پایداری عملکرد<sup>۸</sup> (۳)، شاخص حساسیت به تنش<sup>۹</sup> (۱۱)، درصد کاهش عملکرد<sup>۱۰</sup> (۴)، شاخص اصلاح شده تحمل تنش برای شرایط غیرتنش<sup>۱۱</sup> (۹)، شاخص اصلاح شده تحمل تنش برای شرایط تنش<sup>۱۲</sup> (۹) و شاخص خشکی نسبی<sup>۱۳</sup> (۱۱) محاسبه شدند (جدول ۲). انتخاب بر منای مقادیر کمتر شاخص تحمل، منجر به گرینش ژنوتیپ‌هایی می‌شود که عملکرد آنها در محیط تنش نسبت به نرمال کاهش کمتری داشته و ثبات عملکرد دارند (۲۳). انتخاب برمنای مقادیر بیشتر شاخص متوسط بهره‌وری و بهره‌وری متوسط هندسی منجر به انتخاب ژنوتیپ‌هایی با

جدول ۲- شاخص‌های تحمل مورد استفاده در این مطالعه و روش محاسبه آنها

Table 2. The used tolerance indices in this study and their calculation methods

روش محاسبه	علامت اختصاری	شاخص
$Y_p - Y_s$	TOL	شاخص تحمل
$(Y_p + Y_s)/2$	MP	شاخص متوسط بهره‌وری
$Y_s \times Y_p$	GMP	شاخص بهره‌وری متوسط هندسی
$[2(Y_p \times Y_s)]/(Y_p + Y_s)$	HM	شاخص میانگین هارمونیک
$Y_s \times Y_p / (Y_p)^2$	STI	شاخص تحمل تنش
$Y_s/Y_p$	YSI	شاخص پایداری عملکرد
$[1 - (Y_s/Y_p)]/SI$	SSI	شاخص حساسیت به تنش
$((Y_p - Y_s)/Y_p) \times 100$	YR	درصد کاهش عملکرد
$(Y_p^2) / (Y_p)^2 \times STI$	KISTI	شاخص اصلاح شده تحمل تنش برای شرایط غیرتنش
$(Y_s^2) / (Y_p)^2 \times STI$	K2STI	شاخص اصلاح شده تحمل تنش برای شرایط تنش
$(Y_s/Y_p) (Y_s/Y_p)$	RDI	شاخص خشکی نسبی

1-  $Y_p$ : Yield potential2-  $Y_s$ : Yield stability

3- Tol: Tolerance Index

4- MP: Mean productivity

5- GMP: Geometric mean productivity

6- HM: Harmonic mean:

7- STI: Stress tolerance index

8- YSI: Yield Stability Index

9- SSI: Stress Susceptibility Index

10- YR: Yield Reduction (percentage)

11- KISTI: Modified stress tolerance index for non-stressed

12- K2STI: Modified stress tolerance index for stressed

13- RDI: Relative drought index

RDI نشان داد که گزارشات قبلی در مورد ارقام کلزای زمستانه و بهاره را تأیید کرد (۳۱، ۳۲). STI همبستگی مثبت قوی با K1STI و K2STI نشان داد. YSI همبستگی منفی با SSI و YR و همچنین یک همبستگی مثبت با K2STI نشان داد. این نتایج درخصوص گزارشات مربوط به شاخص‌های تحمل به خشکی کلزای زمستانه می‌باشد (۳۱). در این مطالعه، تجزیه به مؤلفه‌های اصلی براساس ۱۱ شاخص تحمل به خشکی و صفات عملکرد تحت شرایط نرمال و تنفس برای هر ۳۸ ژنوتیپ کلزا انجام شد. این تحلیل می‌تواند مشخصات ژنوتیپ‌ها را مشخص نموده و آنها را براساس شاخصهای تحمل به خشکی از یکدیگر مجزا سازد (۳۳). نتایج نشان داد که دو مؤلفه اول، بای‌پلات دوبعدی براساس دو مؤلفه اول بدست آمد (شکل ۲، جدول ۶). ۶۵/۳۶ درصد تغییرات توسط مؤلفه اول پوشش داده شد که دارای همبستگی مثبت قوی با Ys، MP، HM، GMP، TOL، K2STI، YSI، STI و RDI، اما همبستگی منفی با SSI و YR بود. بر این اساس، این مؤلفه به عنوان مؤلفه عملکرد و تحمل به خشکی نامگذاری شد. این مؤلفه می‌تواند ژنوتیپ‌هایی که در مقابل تنفس خشکی متتحمل هستند و عملکرد آنها کاهش معنی‌داری ندارد را از یکدیگر تمایز نماید. مؤلفه دوم، ۳۴/۲۸ درصد تغییرات را به خود اختصاص داد که همبستگی مثبتی با Yp، K2STI، TOL، SSI و YR داشت. بنابراین، مؤلفه دوم، ژنوتیپ‌هایی که عملکرد مناسبی تحت شرایط نرمال دارند را نشان می‌دهد، اما به علت حساسیت آنها به تنفس خشکی، هیچ ژنوتیپ پایداری تحت شرایط تنفس خشکی وجود نداشت. بنابراین، گروه دوم تحت عنوان مؤلفه پتانسیل عملکرد نایاب‌دار نام‌گذاری شد. بای‌پلات این مؤلفه‌ها در شکل ۲ نشان داده شده است. نمودار بای‌پلات ژنوتیپ‌های سازگار و متتحمل به خشکی هستند که در تجزیه کلاستر نیز در گروه ۳ قرار گرفتند. در مقابل، ژنوتیپ‌هایی که سمت راست واقع شده‌اند، ژنوتیپ‌هایی که سمت چپ که از پتانسیل عملکرد بالا (سمت چپ بالا) و پایین (سمت چپ پایین) برخوردار می‌باشند، نسبت به تنفس خشکی حساس هستند که در تجزیه کلاستر نیز در گروه ۱ قرار گرفتند و عملکرد در این گروه تحت شرایط تنفس خشکی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. بدیهی است که ژنوتیپ‌هایی که در این سمت قرار گرفته اند، اما با حضور شاخص‌های پتانسیل عملکرد بیشتری دارند، اما با یکدیگر متفاوتند. YR، SSI، TOL، K1STI، YR، YSI، STI، HM، GMP، MP، TOL و G25، G8 و G13 نشان دهنده یک همبستگی مثبت معنی‌دار بین Yp و یک همبستگی مثبت معنی‌دار با Ys، RDI، K2STI، YSI، STI، HM، GMP، MP، TOL و G18، G6 و G10 پایدارترین و متتحمل‌ترین ژنوتیپ‌ها در مقابله خشکی می‌باشند. مطالعات قبلی بر روی ژنوتیپ‌های کلزا با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی نیز نشان داد که دو مؤلفه اول که بیش از ۹۵ درصد تغییرات را پوشش داده‌اند، قادر به تمایز ژنوتیپ‌های متتحمل به خشکی از ژنوتیپ‌های حساس به خشکی بوده‌اند (۱۷، ۳۴)؛ در این مطالعه نیز بیش از ۹۵ درصد تغییرات توسط دو مؤلفه اول پوشش داده شد و بر این اساس تفکیک ژنوتیپ‌ها با استفاده از بای‌پلات انجام پذیرفت.

آمار توصیفی و آنالیز واریانس برای همه شاخص‌های تحمل به خشکی و همچنین پتانسیل عملکرد دانه در شریط نرمال (Yp) و خشکی (Ys) انجام شدند. علاوه‌بر این، تحلیل خوشبختی با استفاده از روش WARD و همچنین تجزیه به مؤلفه‌های اصلی برای شناسایی ژنوتیپ‌های متتحمل و حساس به خشکی استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزارهای آماری SPSS نسخه ۲۴ و XLSTAT نسخه ۲/۲ استفاده شد.

## نتایج و بحث

تجزیه واریانس برای همه صفات کمی ارزیابی شده تحت دو محیط نرمال و شرایط تنفس خشکی انجام شد (جدول ۳). نتایج اختلافات معنی‌داری را در صفات کمی ژنوتیپ‌های مورد بررسی نشان داد که تأیید‌کننده تنوع مناسب ژنوتیپ‌های مورداستفاده در این مطالعه بودند. همچنین تجزیه واریانس بر اساس شاخص‌های تحملشان داد بین ژنوتیپ‌های ارزیابی‌شده از لحاظ کلیه شاخص‌های تحمل به خشکی اختلاف معنی‌داری می‌باشد. بنابراین، تنوع گستره‌های بین ۳۸ ژنوتیپ مورد ارزیابی در پاسخ به خشکی وجود دارد و شاخص‌های به کارگرفته شده می‌توانند به خوبی ژنوتیپ‌ها را از لحاظ تحمل به خشکی، از یکدیگر مجزا نمایند (جدول ۴). میانگین و انحراف معیار شاخص‌های تحمل بررسی و نتایج آن در جدول ۵ ارائه شده است. بیشترین ضریب تعییری‌ذیری ژنوتیپ برای شاخص‌های TOL و K2STI، YR و SSI مشاهده گردید. نتایج مشابهی نیز برای شاخص‌های TOL و SSI در گندم مشاهده گردید (۱). محاسبه پارامترهای آماری ساده برای شاخص‌های تحمل به خشکی نشان دادند که تنوع مناسبی بین ژنوتیپ‌های ارزیابی شده وجود دارد. بنابراین، این تنوع را می‌توان در برنامه‌های اصلاح بیاتات کلزا در مقابل تنش خشکی مورداستفاده قرار داد. اختلاف میانگین عملکرد همه ژنوتیپ‌ها بین شرایط تنفس خشکی (Ys) و تحت آبیاری (Yp) حدود ۱ تن در هکتار بود که نشان داد ژنوتیپ‌های موردارزیابی تحت شرایط تنفس خشکی، عملکرد مناسبی دارند. تجزیه همبستگی بین شاخص‌های تحمل به خشکی (شکل ۱) نشان دهنده یک همبستگی مثبت معنی‌دار بین Yp و یک همبستگی منفی معنی‌دار بین Ys، RDI و K2STI، YSI، STI، HM، GMP، MP، TOL و K1STI، YR، SSI، STI، HM، GMP، MP، TOL و YR می‌باشد. Ys، RDI، K2STI، YSI، STI، HM، GMP، MP، TOL و YR نشان داد. در مطالعه پیش رو هیچ همبستگی‌ای بین Yp و Ys و مشاهده نشد که این نتایج گزارشات قبلی درخصوص کلزای زمستانه تأیید می‌نماید (۳۱)، در حالی که مطالعه دیگری، یک رابطه معنی‌دار مثبت بین Yp و Ys را گزارش نمود (۳۴). شاخص TOL با Yp و Ys به ترتیب همبستگی مثبت و منفی داشت که با گزارشات منتشر شده درمورد ارقام کلزای زمستانه مطابقت داشته (۱۷، ۳۱) و با گزارش دیگری که قبلاً منتشر گردید، مغایر می‌باشد (۳۴). علاوه‌بر این، هیچ همبستگی بین TOL با Yp و Ys در دانه‌های کلزا بهاره بیهاره نگردید (۳۲). شاخص TOL نیز همبستگی مثبتی با SSI و YR و نشان داد. با این حال، یک همبستگی منفی قوی با YSI و

جدول ۳- تجزیه واریانس برای ۳۸ ژنوتیپ کلزا در دو شرایط نرمال و تنش خشکی

Table 3. Combined ANOVA for 38 oilseed rape genotypes under two conditions of normal and drought stress

میابکن مربجات																			
عملکرد دوفن	عملکرد دوفن	درجه دوفن در داده	وزن هزار داده	تعداد داده ها	در غلاف	طول غلاف	افقی شانه	اول از زین	طول ساقه	اطول اصلی	تعداد غلاف	غلاف های	تعداد غلاف فرمغ	تعداد غلاف در شاهکه های	تعداد غلاف در رسانه ها	تعداد دشنه ها	تعداد دشنه های	تعداد دشنه های	تعداد دشنه های
-/-٥**	-/-٦**	٢/٣٩*	-/٢٠**	١٥/١٣**	١/١٣**	٢٦٣/١٤**	١٦٧/٤٤**	١٤٤٣/٨٦**	١١١٤/٨١**	١٣٧/٥٨	١/٧٩**	١٤٢/٩٤	٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	
-/-٤ns	-/-٣ ns	٢١/٧٤ ns	-/١٢ ns	٩/٢٥ ns	٢/٠٨*	١٤٨/٦٥ ns	٥٠-/٢٢**	١٢٨٥/٠٩ ns	١١٤٢/٦٨ ns	٣٩/٣٢ ns	١/٣ ns	٣٨٨/٧٢**	٢	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	
-/٢	-/٩	١/٥١	-/٦	٧/٨٣	-/٥١	٩٩/٨١	٤٩/٥٩	٥٧١/٥٣	٤٨٦/٥١	٨/١٦٥	-/٠٤	٨٣٣٦	٧٦	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	
٧/٢١	٦/٩٥	٢/٧٦	٥/٢٤	١/١١	١/٩٨	١٦/١١	١٣٤٦	١١/١٠	١٥/٦	١٣٧/٥	٥/٩٢	CV%							
-/-٧**	-/-٦**	٣/٧٩*	-/١٤*	٢٣/٢٣**	١/١٠**	٢٢٤/١٦**	١٦٩/٢٠**	٢١١/١٥٨**	١٧٧/٢٧**	١٤٣/٣٧**	١/٧٧**	٦٣/٣٦**	٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	
-/-٠ ns	-/-٠ ns	-/٤ ns	-/١٧ ns	٧/٧١ ns	٥/٨**	٨٩٩/٩ ns	٤٤/٤٦ ns	٦/١١ ns	٣٧/٣٩ ns	٢٤/٣٧ ns	١/٣٠ ns	٦٣ ns	٢	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	
-/٠١	-/٠٥	١/٠٢	-/١٢	٦/٤٦	-/٤٧	٦٧/٣٥	٤٥/٧	٤٩٢/٨٥	٤٠٧/٥٧	٧٨/٢٠	-/٠٧	٨٣٣٦	٧٦	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	٩٢٠/٣٧	
٧/٤٥	٦/٩٥	٢/٣٨	٨/٨٧	١/٠٨	١١/٤١	١٨/١٧	١٧/١٣	١٤/٤٤	١٨/١١	٢٠/٣٣	١٧/٩٦	١٠/١٩	CV%						

علامت \*\*\*، \*\* و ms: به ترتیب نشان دهنده معنی داری در سطح ۱/۰ - درصد، معنی داری در سطح ۰/۵ - درصد و عدم معنی داری است.


Table 4. Analysis of variance for drought tolerance quantitative indices in oilseed rape genotypes

جدول ۴- آنالیز واریانس برای شاخص‌های کمی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های کلزا

جدول ۵- آمار توصیفی و ضریب تعیین‌نذیری،  $\eta^2$  (GCV%) برای شاخص‌های تحمل، به خشک، در ۳۸ نمونت کلزا

Table 5. Descriptive statistics and genotypic coefficient of variability (GCV%) of drought tolerance indices in 38 oilseed rapes genotypes

پارامتر آماری	عملکرد در شرایط نرمال (اقن در هکتار)	عملکرد در شرایط بذرگی زیست	تئش خشکی (اقن در هکتار) در هشتاد و سه گونه ای از گیاهان									
			۱/۸۳	۰/۷۷	۰/۷۴	۰/۷۳	۰/۷۲	۰/۷۱	۰/۷۰	۰/۶۹	۰/۶۸	۰/۶۷
حداقل	۲/۶۳	۲/۶۲	۲/۶۱	۲/۶۰	۲/۵۹	۲/۵۸	۲/۵۷	۲/۵۶	۲/۵۵	۲/۵۴	۲/۵۳	۲/۵۲
حداکثر	۴/۶۲	۴/۶۱	۴/۶۰	۴/۵۹	۴/۵۸	۴/۵۷	۴/۵۶	۴/۵۵	۴/۵۴	۴/۵۳	۴/۵۲	۴/۵۱
متوسط	۳/۲۵	۳/۲۴	۳/۲۳	۳/۲۲	۳/۲۱	۳/۲۰	۳/۱۹	۳/۱۸	۳/۱۷	۳/۱۶	۳/۱۵	۳/۱۴
اتحراف میانگین	۰/۲۹	۰/۲۸	۰/۲۷	۰/۲۶	۰/۲۵	۰/۲۴	۰/۲۳	۰/۲۲	۰/۲۱	۰/۲۰	۰/۱۹	۰/۱۸
ضریب تعییر	۶/۴۵	۱۰/۳۹	۱۰/۳۸	۱۰/۳۷	۱۰/۳۶	۱۰/۳۵	۱۰/۳۴	۱۰/۳۳	۱۰/۳۲	۱۰/۳۱	۱۰/۳۰	۱۰/۲۹
ذبذبی زیست	۶/۴۵	۱۰/۳۹	۱۰/۳۸	۱۰/۳۷	۱۰/۳۶	۱۰/۳۵	۱۰/۳۴	۱۰/۳۳	۱۰/۳۲	۱۰/۳۱	۱۰/۳۰	۱۰/۲۹



شکل ۱- ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص‌های Yp، Ys و تحمل تنش در شرایط تنش خشکی و شرایط آبیاری برای ۳۸ ژنوتیپ کلزا.  
Yp: عملکرد نرمال، Ys: عملکرد خشکی، TOL: شاخص‌های تحمل به خشکی شامل شاخص تحمل، MP: شاخص متوسط بهرهوری، GMP: شاخص بهرهوری متوسط هندسی، HM: شاخص میانگین هارمونیک، STI: شاخص تحمل تنش، YSI: شاخص پایداری عملکرد، SSI: شاخص حساسیت به تنش، YR: درصد کاهش عملکرد، K1STI: شاخص اصلاح شده تحمل تنش برای شرایط غیرتنش، K2STI: شاخص اصلاح شده تحمل تنش برای شرایط تنش، RDI: شاخص خشکی نسبی

Figure 1. Pearson correlation coefficients between Yp, Ys and stress tolerance indices under drought stress and irrigation conditions for 38 oilseed rapes genotypes, Yp: Yield potential; Ys: Yield stability; TOL: Tolerance index; MP: Mean productivity; GMP: Geometric mean productivity; HM: Harmonic mean; STI: Stress Tolerance index; YSI: Yield stability index; SSI: Stress susceptibility index; YR: Yield reduction(percentage); K1STI: Modified stress tolerance index for non-stressed; K2STI: Modified stress tolerance index for stressed; RDI: Relative drought index.

جدول ۶- سهم شاخص‌های مورد ارزیابی در دو مولفه اول حاصل از تجزیه به مولفه‌های اصلی

Table 6. Contribution of the evaluated indices of two first components of the principal component analysis


شاخص	مولفه اول	مولفه دوم
عملکرد نرمال	-0.778	۲۲/۲۲۷
عملکرد خشکی	۱۱/۷۵	۰/۰۱
شاخص تحمل	۶/۲۱	۱۰/۵۶
شاخص متوسط بهرهوری	۷/۷۷	۸/۵۳
شاخص میانگین هارمونیک	۸/۸۷	۵/۴۸
شاخص تحمل تنش	۱۰/۰۵	۳/۱۹
شاخص پایداری عملکرد	۸/۹۸	۵/۰۳
شاخص حساسیت به تنش	۸/۰۵	۷/۰۴
درصد کاهش عملکرد	۸/۰۵	۷/۰۴
شاخص اصلاح شده تحمل تنش برای شرایط غیرتنش	۳/۲۶	۱۵/۹۱
شاخص اصلاح شده تحمل تنش برای شرایط تنش	۱۱/۱۷	۰/۵۸
شاخص خشکی نسبی	۸/۰۵	۷/۰۴

طبقه‌بندی نمود. همه دسته‌های تحلیل خوش‌های با تعییر مقادیر و نرمال‌سازی به عدد Z از لحاظ شاخص‌های ایشان مقایسه شدند و نتایج در شکل ۳ نشان داده شده است. گروه اول از ۱۵ ژنوتیپ تشکیل شده بود که بیشترین و کمترین عملکرد را بهترین ترتیب تحت شرایط نرمال و تنش خشکی داشتند. بنابراین، کاهش شدیدی در این گروه تحت شرایط تنش خشکی


همه ژنوتیپ‌های مورد مطالعه بالاستفاده از روش WARD خوش‌بندی نشدنده که نتایج در شکل ۲ نشان داده شده است. این تحلیل برای شناسایی ژنوتیپ‌ها با بیشترین فاصله ژنتیکی طبق عملکرد آنها تحت شرایط نرمال و تنش خشکی و همچنین شاخص‌های محاسبه شده تحمل به خشکی آنها می‌باشد. تحلیل خوش‌های، ژنوتیپ‌ها را در سه دسته

تحمل به خشکی، ژنوتیپ‌های برتر بودند و عملکرد قابل قبولی برای این ژنوتیپ‌ها تحت شرایط نرمال مشاهده شد، اما عملکرد بسیار بالایی را در مقایسه با سایر ژنوتیپ‌ها تحت شرایط تنفس نشان دادند. بیشترین STI، RDI و K2STI به این گروه متعلق بود که نشان‌دهنده ژنوتیپ‌های با تحمل بالای این گروه نسبت به تنفس خشکی می‌باشد. بیشترین YSI به این گروه تعلق داشت که پایداری آنها را اثبات می‌کند. علاوه بر این، این گروه کمترین شاخص‌های TOL، PCA، SSI و YR را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده کمترین کاهش و حساسیت در شرایط تنفس خشکی می‌باشد. سومین گروه تجزیه خوش‌های، نتایج مؤلفه اول PCA را تایید می‌کند که ژنوتیپ‌های G33، G23، G18، G6 و G10 را به عنوان ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی و پایدار از یکدیگر متمایز می‌سازد.

(الف)




مشاهده شد. کمترین STI، RDI و K2STI به گروه ۱ متعلق بود که حساسیت شدید به خشکی در ژنوتیپ‌های موجود در این گروه را نشان می‌دهد. کمترین YSI در این گروه مشاهده شد که نشان می‌دهد این گروه از ژنوتیپ‌های سازگار تشکیل شده است. علاوه بر این، این گروه شامل بیشترین شاخص‌های TOL، SSI و YR بود که بر حساسیت آن‌ها به تنفس خشکی تأکید داشت. تعیین مشخصات ژنوتیپ‌های این گروه با ژنوتیپ‌هایی که توسط مؤلفه دوم PCA متمایز شده بودند، مطابقت دارد. گروه دوم بزرگ‌ترین گروه و شامل ۱۸ ژنوتیپ بود. ژنوتیپ‌های گروه دوم از نظر مقادیر شاخص‌ها اغلب در حدوساط بین گروه‌های ۱ و ۳ بودند؛ اما الگوی تغییرپذیری شاخص‌های آنها بیشتر به گروه ۳ شباهت داشت. در نهایت، گروه سوم که از ۵ ژنوتیپ شامل G18، G6، G10، G23 و G33 تشکیل می‌شود، بر اساس اکثر شاخص‌های



شکل ۲- (الف) تجزیه خوش‌های ۳۸ ژنوتیپ کلزا مورد بررسی بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی و با استفاده از روش WARD . ب) نمودار بای‌پلات با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی برای ۳۸ ژنوتیپ کلزا و براساس دو مؤلفه اصلی و بردارهای شاخص‌های تحمل به خشکی. Yp: علکرد نرمال، Ys: علکرد خشکی، TOL: Tolerance index; MP: شاخص متوسط شاخص تحمل به خشکی شامل شاخص تحمل، GMP: شاخص میانگین هارمونیک، HM: شاخص تحمل تنفس، STI: شاخص تحمل تنفس، YSI: شاخص اصلاح شده تحمل تنفس برای شرایط پایداری عملکرد، SSI: شاخص حساسیت به تنفس ، YR: درصد کاهش عملکرد، K1STI: شاخص اصلاح شده تحمل تنفس برای شرایط غیرتنفس، K2STI: شاخص اصلاح شده تحمل تنفس برای شرایط تنفس، RDI: شاخص خشکی نسبی

Figure 2. a) cluster analysis of 38 oilseed rape genotypes evaluated based on drought tolerant indices using WARD method. b) Biplot graph using principal component analysis for 38 oilseed rape genotypes based on two principal components and vectors of drought tolerance indices. Yp: Yield potential; Ys: Yield stability; TOL: Tolerance index; MP: Mean productivity; GMP: Geometric mean productivity; HM: Harmonic mean; STI: Stress Tolerance index; YSI: Yield stability index; SSI: Stress susceptibility index; YR: Yield reduction(percentage); K1STI: Modified stress tolerance index for non-stressed; K2STI: Modified stress tolerance index for stressed; RDI: Relative drought index



شکل ۳- مقایسه سه گروه حاصل از تحلیل خوشه‌ای برای شاخص‌های تحمل به خشکی کلزا. Yp: عملکرد نرمال، Ys: عملکرد خشکی، TOL: شاخص متوسط بهره‌وری، MP: شاخص پایداری عملکرد، GMP: شاخص بهره‌وری متوسط هندسی، HM: شاخص میانگین هارمونیک، STI: شاخص تحمل تنش، YSI: شاخص پایداری عملکرد، SSI: شاخص حساسیت به تنش، YR: درصد کاهش عملکرد، K1STI: شاخص اصلاح شده تحمل تنش برای شرایط غیرتنش، K2STI: شاخص اصلاح شده تحمل تنش برای شرایط تنش، RDI: شاخص خشکی نسبی

Figure 3. Comparison of three classes of cluster analysis for oilseed rape drought tolerance indices. Yp: Yield potential; Ys: Yield stability; TOL: Tolerance index; MP: Mean productivity; GMP: Geometric mean productivity; HM: Harmonic mean; STI: Stress Tolerance index; YSI: Yield stability index; SSI: Stress susceptibility index; YR: Yield reduction (percentage); K1STI: Modified stress tolerance index for non-stressed; K2STI: Modified stress tolerance index for stressed; RDI: Relative drought index

خشکی، گروه‌های مناسبی بودند که بهترین با مؤلفه دوم و اول PCA مطابقت داشتند. در نهایت، گروه ۳ شامل ژنتیک‌های G6، G10، G18، G23 و G33 به عنوان گروه برتر در این مطالعه انتخاب شد که متحمل ترین ژنتیک‌ها در مقابل خشکی بوده و عملکرد آنها تحت شرایط نرمال و تنش خشکی، مطلوب بود.

**نتیجه‌گیری کلی**  
نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرپذیری قابل توجهی در شاخص‌های تحمل به خشکی در ۳۸ ژنتیک کلزا موردمطالعه وجود دارد. نتایج تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه خوشای یکدیگر را تأیید نمودند. سه گروه اصلی از ژنتیک‌های ارزیابی شده در مطالعه پیش رو شناسایی شدند. گروه‌های اول و سوم، از لحاظ پایداری عملکرد و تحمل به

## منابع

- Anwar, J., G.M. Subhani, M. Hussain, J. Ahmad, M. Hussain and M. Munir. 2011. Drought tolerance indices and their correlation with yield in exotic wheat genotypes. *Pakistan Journal of Botany*, 43(3): 1527-1530.
- Bagheri, H. and S. Jamaati-e-Somarin. 2011. Study of drought stress on agronomic traits of winter canola (*Brassica napus L.*). *Scientific Research and Essays*, 6(25): 5285-5289.
- Bouslama, M. and W. Schapaugh Jr. 1984. Stress tolerance in soybeans. I. Evaluation of three screening techniques for heat and drought tolerance 1. *Crop Science*, 24(5): 933-937.
- Choukan, R., T. Taherkhani, M. Ghanadha and M. Khodarahmi. 2006. Evaluation of drought tolerance in grain maize inbred lines using drought tolerance indices. *Iranian Journal of Crop Sciences*, 8: 79-89 (In Persian).
- Clarke, J.M., R.M. DePauw and T.F. Townley-Smith. 1992. Evaluation of methods for quantification of drought tolerance in wheat. *Crop Science*, 32(3): 723-728.
- Din, J., S. Khan, I. Ali and A. Gurmani. 2011. Physiological and agronomic response of canola varieties to drought stress. *Journal of Animal and Plant Science*, 21(1): 78-82.
- FAO. 2018. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Food and Agricultural Commodities Production. Available online: <http://www.fao.org/statistics/en>
- Faraji, A., N. Latifi, A. Soltani and A.H.S. Rad. 2009. Seed yield and water use efficiency of canola (*Brassica napus L.*) as affected by high temperature stress and supplemental irrigation. *Agricultural Water Management*, 96(1): 132-140.
- Farshadfar, E. and J. Sutka. 2002. Screening drought tolerance criteria in maize. *Acta Agronomica Hungarica*, 50(4): 411-416.
- Fernandez, G.C. 1993. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In Proceeding of the International Symposium on Adaptation of Vegetables and other Food Crops in Temperature and Water Stress, Shanhua, Taiwan, pp: 257-270.
- Fischer, R. and R. Maurer. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. *Australian Journal of Agricultural Research*, 29(5): 897-912.

12. Haq, T., A. Ali, S. Nadeem, M.M. Maqbool and M. Ibrahim. 2014. Performance of canola cultivars under drought stress induced by withholding irrigation at different growth stages. *Soil and Environment*, 33(1): 43-50.
13. Khalaj, H., S.S. Noori, A.S. Rad, G.A. Akbari, E.A. Dadi and M. Labbafi. 2007. The assessment of applying drought stress on different canola (*Brassica napus* L.) cultivars. in The 12th International Rapeseed Congress.
14. Khalili, M., A.P. Aboughadareh, M.R. Naghavi and S. Talebzadeh. 2012. Response of spring canola (*Brassica napus* L.) genotypes to water deficit stress. *International Journal of Agricultural Crop Science*, 4: 1579-1586.
15. Lobell, D.B. and S.M. Gourdji. 2012. The influence of climate change on global crop productivity. *Plant Physiology*, 160(4): 1686-1697.
16. Majidi, M., F. Rashidi and Y. Sharifi. 2015. Physiological traits related to drought tolerance in *Brassica*. *International Journal of Plant Production*, 9(4).
17. Malekshahi, F., H. Dehghani, and B. Alizadeh. 2009. Study of drought tolerance indices in some spring rapeseed cultivars (*Brassica napus* L.). *Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources*, 48: 77-89.
18. Mirzaei, A., R. Naseiri, A. Moghadam and M. Esmailpour-Jahromi. 2013. The effects of drought stress on seed yield and some agronomic traits of canola cultivars at different growth stages. *Bulletin Environmental Pharmacology Life Science*, 2: 115-121.
19. Moradshahi, A., E.A.B. Salehi and B.B. Khodd. 2004. Some physiological responses of canola (*Brassica napus* L.) To water deficit stress under laboratory conditions. *Iranian Journal Of Science And Technology Transaction A- Science*, 28: p. 43-50.
20. Nazemi, G. and A. Alhani. 2014. The effects of water deficit stress on seed yield and quantitative traits of Canola cultivars. *International Journal of Farming and Allied Sciences*, 3: 819-822.
21. Resketo, P. and L. Szabo. 1992. The effect of drought on development and yield components of soybean. *International Journal of Tropical Agriculture*, 8: 347-354.
22. Richards, R. 1978. Genetic analysis of drought stress response in rapeseed (*Brassica campestris* and *B. napus*). I. Assessment of environments for maximum selection response in grain yield. *Euphytica*, 27(2): 609-615.
23. Rosielle, A. and J. Hamblin. 1981. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non-stress environment 1. *Crop Science*, 21(6): 943-946.
24. Schneider, K.A., R. Rosales-Serna, F. Ibarra-Perez, B. Cazares-Enriquez, J.A. Acosta-Gallegos, P. Ramirez-Vallejo, N. Wassimi and J.D. Kelly. 1997. Improving common bean performance under drought stress. *Crop Science*, 37(1): 43-50.
25. Sepehri, A. and A.R. Golparvar. 2011. The effect of drought stress on water relations, chlorophyll content and leaf area in canola cultivars (*Brassica napus* L.). *Electronic Journal of Biology*, 7(3): 49-53.
26. Shahverdikandi, M.A., A. Tobeh, S.J. Godehkahriz and Z. Rastegar. 2011. The study of germination index of canola cultivars for drought resistance. *International Journal of Agronomy and Plant Production*, 2: 89-95.
27. Simane, B., P. Struik, M. Nachit and J. Peacock. 1993. Ontogenetic analysis of yield components and yield stability of durum wheat in water-limited environments. *Euphytica*, 71(3): 211-219.
28. Tabari, H., H. Abghari and P. Hosseinzadeh Talaee. 2012. Temporal trends and spatial characteristics of drought and rainfall in arid and semiarid regions of Iran. *Hydrological Processes*, 26(22): 3351-3361.
29. Warwick, S., A. Francis and I. Al-Shehbaz. 2006. Brassicaceae: species checklist and database on CD-Rom. *Plant Systematics and Evolution*, 259(2-4): 249-258.
30. Wu, W., B.L. Ma and J.K. Whalen. 2018. Enhancing rapeseed tolerance to heat and drought stresses in a changing climate: perspectives for stress adaptation from root system architecture, in *Advances in Agronomy*. Elsevier, 87-157.
31. Yarnia, M., N. Arabifard, F.R. Khoei and P. Zandi. 2011. Evaluation of drought tolerance indices among some winter rapeseed cultivars. *African Journal of Biotechnology*, 10(53): 10914-10922.
32. Yousefi, A. 2017. Evaluation of drought tolerance indices in three canola species (*Brassica* spp.) Under irrigation restriction conditions. *Environmental Stresses in Crop Sciences*, 10(2): 257-267.
33. Zahravi, M. 2009. Evaluation of genotypes of wild barley (*Hordeum spontaneum*) based on drought tolerance indices. *Seed and Plant Improvement Journal*, 4: 533-Pe549
34. Zali, H., T. Hasanloo, O. Sofalian, A. Asgharii and M. Enayati Shariatpanahi. 2019. Identifying drought Tolerant Canola Genotypes using Selection Index of Ideal Genotype. *Journal of Crop Breeding*, 11(29): 117-126.
35. Zarei, G., H. Shamsi, and S.M. dehghani. 2010. The effect of drought stress on yield, yield components and seed oil content of three autumnal rapeseed cultivars (*Brassica napus* L.). *Journal Of Research In Agricultural Science*, 6(1): 29-36.

## Identification of Drought Tolerant Oilseed Rape Genotypes using Multivariate Analysis

Behrooz Aminzadeh<sup>1</sup>, Behzad Sani<sup>1</sup>, Bahram Alizadeh<sup>1,2</sup> and Hamid Mozaffari<sup>1</sup>

1- Department of Agronomy, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2- Associate Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research,

Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran, (Corresponding author: alizadeh.oilseed@gmail.com)

Received: 17 October, 2021 Accepted: 18 January, 2022

### Extended Abstract

**Introduction and Objective:** Drought stress as one of the most important abiotic stress is the main limiting factor of oilseed rape cultivation in arid and semi-arid climates. Therefore, the identification of drought tolerant genotypes is the essential programs in these regions. One of the appropriate methods to identify drought tolerant genotypes is the use of stress tolerance indices. To this end, the present study was designed to detect drought tolerant among 38 winter genotypes using drought tolerance indices.

**Material and Methods:** The experiment was based on randomized complete block design (RCBD) with three replications under both normal and drought conditions during 2016 to 2017 cropping season. In the well-watered experiment, irrigation was performed in five stages, while in drought treatment, irrigation was stopped before flower initiation. The yield of genotypes under normal and drought conditions using drought tolerant indices, including; TOL, MP, GMP, HM, STI, YSI, SSI, YR, K1STI, K2STI and RDI were investigated to identify drought tolerant and susceptible genotypes.

**Results:** Analysis of variance showed a significant difference among evaluated genotypes for all drought tolerance indices. The highest coefficient of genotype variability was observed for TOL and SSI, YR and K2STI indices. Correlation analysis showed a significant positive correlation between Yp and TOL, SSI and YR, while a negative correlation was observed for Ys. The principal component analysis showed that the two first components covered 99.64% of all data variations. 65.36 and 34.28% of the variation were covered by the first and second components, respectively. The first component detected tolerant genotypes, but the second component identified drought sensitive genotypes. Cluster analysis, while confirming the results of principal component analysis, classified genotypes into three categories. Cluster analysis confirmed the PCA results, which separated drought tolerant genotypes (Class 3) from sensitive genotypes (Class 1).

**Conclusion:** Finally, this research detected five superior genotypes, including; G6, G10, G18, G23 and G33, which were the most drought tolerant genotypes and their yields were not significantly changed under normal and drought stress conditions.

**Keywords:** *Brassica*, Canola, Drought Tolerant Indices, Principal Component Analysis, Stress