



"مقاله پژوهشی"

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در لاین‌های امیدبخش گندم با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

امیر کبیری^۱, فائزه زعفریان^۲, علی عمرانی^۳ و ارسسطو عباسیان^۴

۱-۴- به ترتیب دانشجویی کارشناسی ارشد و استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

۲- دانشیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران، (نویسنده مسؤول): (fa.zaeefarian@sanru.ac.ir)

۳- استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۳/۲۹ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۵/۲۶

صفحه: ۱۳۵ تا ۱۴۸

چکیده مبسوط

مقدمه و هدف: گندم (*Triticum aestivum* L.) مهم‌ترین گیاه زراعی و غذایی اصلی سه چهارم جمیعت جهان به شمار می‌رود. لذا، بررسی تنوع ژنتیکی این گیاه استراتژیک، بهنگاذگران را در شناسایی پتانسیل و ظرفیت ژنتیکی واقعی صفات مرتبط با اهداف بهنگاذی از جمله عملکرد و اجزای عملکرد، کمک می‌نماید. آگاهی از اختلاف بین ژنتوتیپ‌های مختلف گندم و چگونگی روابط این تفاوت با عملکرد بالقوه آنها در بهبود و پیشرفت عملکرد ارقام جدید بسیار حیاتی است.

مواد و روش‌ها: به منظور دستیابی به ژنتوتیپ‌های گندم مطلوب، بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد، اجزای عملکرد و اثر متقابل ژنتوتیپ در صفت لاین امیدبخش گندم از نظر ۱۴ صفت مهم زراعی در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی (RCBD) به همراه ارقام تجاری مهم منطقه (تیرگان و کلاته) به عنوان شاهد در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان) انجام گرفت. از بین روش‌های موجود برای ارزیابی تنوع، تحلیل چند متغیره یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها می‌باشد.

یافته‌ها: نتایج تجزیه واریانس در سطح احتمال ۰/۰۱ و ۰/۰۵ حاکی از آن بود که لاین‌های گندم مورد مطالعه از نظر تمام صفات به جز صفت تعداد دانه در سینبله دارای اختلاف معنی داری با هم بودند. مقایسه میانگین انجام شده به روش دانکن نیز نشان داد که لاین‌های G17 و G15 از نظر تمامی صفات اندازه‌گیری شده به عنوان لاین‌های مطلوب انتخاب شدند؛ درحالیکه لاین‌های G3 و G19 در این تجزیه از کمترین رتبه برخوردار بودند. نتایج تجزیه همبستگی نیز حاکی از آن بود که صفت عملکرد دانه با تمام صفات مورد ارزیابی به جز صفات تعداد پنجه، طول پدانکل و تعداد دانه در سینبله همبستگی مثبت و معنی داری داشت. براساس تجزیه به مولفه‌های اصلی صورت گرفته روی داده‌های آزمایش نیز ۵ مولفه اول بیش از ۷۵ درصد از واریانس داده‌ها را توجیه نمودند. براساس نمودار گروه‌بندی لاین‌ها به چهار گروه، گروه‌بندی شدند. براساس تجزیه گرافیکی انجام گرفته نمودار رتبه‌بندی لاین‌ها، لاین‌های امیدبخش گندم G15 و G17 نسبت به سایر لاین‌های مورد مطالعه از عملکرد مطلوب‌تری در صفات مورد ارزیابی برخوردار بودند و لاین G4 از نظر پایداری در صفات به عنوان لاین پایدار انتخاب شد. نمودار چندوجهی نیز لاین‌های G15، G17، G18، G23، G10 و G6 را به عنوان ژنتوتیپ‌های مطلوب شناسایی نمود و از نظر نمودار رتبه‌بندی لاین‌ها براساس لاین نیز لاین‌های G15 و G17 به عنوان لاین‌های با رتبه برتر شناسایی شدند.

نتیجه گیری: از لاین‌های دارای پتانسیل بالای عملکرد و سایر صفات زراعی مطلوب شناسایی شده در این تحقیق می‌توان در ایجاد جمعیت‌های برتر و سازگار با خصوصیات اقلیمی گرم و مطرطب شمال کشور، استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: تجزیه به مولفه‌های اصلی، تجزیه همبستگی، تجزیه گرافیکی، عملکرد دانه

رویدادهای اخیر در روابط بین المللی برخی از کشورها نیز باعث پیچیده‌تر شدن قیمت گذاری گندم در بازارهای جهانی شده و یک وضعیت مبهم و دلهره‌آور را برای کشورهای وارد کننده گندم ایجاد کرده است.

به طور کلی، تولید جهانی گندم از سال ۱۹۶۰ به بعد تقریباً هر ۱۰ سال حدود ۱۰۰ میلیون تن افزایش داشته و برخلاف تغییرات سطح زیرکشت و میزان کل تولید، عملکرد در واحد سطح روند افزایشی داشته است. از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۰ یعنی در حدود ۶ سال میزان تولید این محصول حدود ۷۰ میلیون تن افزایش داشت. تقریباً حدود ۲۲۰ میلیون هکتار از اراضی در دنیا زیرکشت گندم است که در سال‌های اخیر تولید سالیانه گندم در جهان به حدود ۷۲۰ میلیون تن و تولید آن در ایران نیز به طور متوسط حدود ۱۲-۱۳ میلیون تن رسیده است (۳). نیمی از اراضی تولید کننده گندم مربوط به کشورهای در حال توسعه است (۱۵). خودکفایی در تولید گندم از دیرباز به عنوان یک آرمان ملی تلقی شده و افزایش تولید این گیاه زراعی یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولین امر در راستای سیاست قطع وابستگی کشور به مواد غذایی می‌باشد. تاجابی

مقدمه
گندم (*Triticum aestivum* L.) سازگارترین گیاه زراعی دنیا بوده و بیش از سایر گیاهان زراعی دیگر در جهان کشت می‌شود. کشت و کار آسان، سازگار با دامنه وسیعی از شرایط محیطی، ارزش تغذیه‌ای فوق العاده در تأمین انرژی روزانه و همچنین سازگار با سیستم ایستگاه گوارشی انسان سبب شده این گیاه در جهان غذایی بسیاری از جمعیت انسانی کشورهای جهان (۴/۶ میلیارد نفر) جای بگیرد (۴).

در دنیای امروز گندم نه تنها یک ماده غذایی اساسی و مهم محسوب می‌گردد، بلکه از لحاظ سیاسی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که تجارت جهانی گندم با حجمی برابر ۲۳۰ میلیون تن، پس از انرژی، مواد خام صنعتی و موادمعدنی، بیشترین حجم مبادلات جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. طبق گزارشات سازمان خواروبار جهانی (FAO) در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰۰ میلیون تن کمبود عرضه گندم در بازار جهانی وجود داشت (۳). با این وجود براساس معادلات عرضه و تقاضا، به احتمال زیاد قیمت گندم در بازار جهانی در سال‌های آینده چندین برابر افزایش خواهد یافت. از طرفی

بین عملکرد و اجزای عملکرد با استفاده از روش‌های چند متغیره در تعدادی از لاین‌های امیدبخش گندم سازگار با شرایط متنوع آب و هوایی اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور که برنامه‌های بهنژادی متعددی را گذرانده و انتخاب شده بودند، می‌باشد.

مواد و روش‌ها

به منظور دستیابی به ژنوتیپ‌های گندم مطلوب از نظر دارا بودن پتانسیل عملکرد بالا و همچنین مطلوبیت در سایر صفات زراعی مهم، مطالعه روابط عملکرد و اجزای عملکرد ۲۱ لاین امیدبخش گندم به همراه دو رقم تجاری تیرگان و کلاته به عنوان شاهد در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و متابع طبیعی استان اردبیل (مغان) در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی (RCBD) در سه تکرار مورد کشت و بررسی قرار گرفتند. شجره لاین‌های امیدبخش مورد مطالعه در جدول ۱ ارایه شده است.

منطقه مغان جزء اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور به شمار می‌رود و دارای آب و هوایی تا حدودی نیمه‌خشک‌تر نسبت به سایر مناطق این اقلیم با تابستان‌های گرم و زمستان‌های کمی سرد می‌باشد که در عرض جغرافیایی ۳۹ درجه و ۷۸ دقیقه و طول جغرافیایی ۴۷ درجه و ۸۸ دقیقه و در ارتفاع ۷۸۰ متری سطح دریا قرار دارد. براساس آمار هواشناسی ایستگاه هواشناسی کشاورزی مغان، متوسط بیشینه دمای سالیانه منطقه ۳۵ درجه سانتی‌گراد و متوسط کمینه دمای سالیانه ۸ درجه سانتی‌گراد است. بیشینه مطلق دما تاکنون به ۴۲/۵ و کمینه مطلق به ۱۶/۵ درجه سانتی‌گراد زیر صفر رسیده است. کمینه نزولات آسمانی ۷۲/۹ و بیشینه آن ۵۲۳ میلی‌متر در سال می‌باشد. میزان متوسط بارندگی سالیانه ۲۵۱ میلی‌متر و رطوبت نسبی متوسط سالیانه در حدود ۷۱ درصد و اکثر بارندگی‌ها در ماه‌های پاییز، زمستان و اوایل بهار صورت می‌گیرد. خاک منطقه عموماً قهوه‌ای یا خاکستری مایل به قهوه‌ای است. مقدار مواد آلی در منطقه دیم نسبتاً زیاد و در اراضی آبی کم است. جنس خاک نسبتاً سنگین و عموماً رسی لومی می‌باشد.

برای اجرای آزمایش زمینی به مساحت یک سوم هکتار انتخاب و نمونه برداری خاک جهت تجزیه خاک و توصیه کودی انجام شد. عملیات زراعی تهیه زمین شامل شخم کلشی در تابستان، یک نوبت دیسک، دو نوبت ماله بطور متقطع کودپاشی و ایجاد فارو بود. میزان کودهای شیمیایی مصرفی بر اساس آزمون خاک تعیین شد که تمامی کود پتانس از منبع سولفات‌پتاسیم و تمامی کود فسفاته از منبع فسفات آمونیوم به صورت پایه و کود نیتروژن از منبع اوره در دو نوبت پایه و سرک در ابتدای رشد بهاره به زمین داده شد. جهت اجرای آزمایش هر یک از لاین‌های امیدبخش گندم مورد مطالعه (۱)، ER-N-99-2، ER-N-99-3، ER-N-99-4، ER-N-99-5، ER-N-99-6، ER-N-99-7، ER-N-99-8، ER-N-99-9، ER-N-99-10، ER-N-99-11، ER-N-99-12، ER-N-99-13، ER-N-99-14، ER-N-99-15، ER-N-99-16، ER-N-99-17، ER-N-99-18، ER-N-99-19، ER-N-99-20، ER-N-99-21، ER-N-99-22، ER-N-99-23، ER-N-99-24، ER-N-99-25، ER-N-99-26، ER-N-99-27، ER-N-99-28، ER-N-99-29، ER-N-99-30، ER-N-99-31، ER-N-99-32، ER-N-99-33، ER-N-99-34، ER-N-99-35، ER-N-99-36، ER-N-99-37، ER-N-99-38، ER-N-99-39، ER-N-99-40، ER-N-99-41، ER-N-99-42، ER-N-99-43، ER-N-99-44، ER-N-99-45، ER-N-99-46، ER-N-99-47، ER-N-99-48، ER-N-99-49، ER-N-99-50، ER-N-99-51، ER-N-99-52، ER-N-99-53، ER-N-99-54، ER-N-99-55، ER-N-99-56، ER-N-99-57، ER-N-99-58، ER-N-99-59، ER-N-99-60، ER-N-99-61، ER-N-99-62، ER-N-99-63، ER-N-99-64، ER-N-99-65، ER-N-99-66، ER-N-99-67، ER-N-99-68، ER-N-99-69، ER-N-99-70، ER-N-99-71، ER-N-99-72، ER-N-99-73، ER-N-99-74، ER-N-99-75، ER-N-99-76، ER-N-99-77، ER-N-99-78، ER-N-99-79، ER-N-99-80، ER-N-99-81، ER-N-99-82، ER-N-99-83، ER-N-99-84، ER-N-99-85، ER-N-99-86، ER-N-99-87، ER-N-99-88، ER-N-99-89، ER-N-99-90، ER-N-99-91، ER-N-99-92، ER-N-99-93، ER-N-99-94، ER-N-99-95، ER-N-99-96، ER-N-99-97، ER-N-99-98، ER-N-99-99، ER-N-99-100، ER-N-99-101، ER-N-99-102، ER-N-99-103، ER-N-99-104، ER-N-99-105، ER-N-99-106، ER-N-99-107، ER-N-99-108، ER-N-99-109، ER-N-99-110، ER-N-99-111، ER-N-99-112، ER-N-99-113، ER-N-99-114، ER-N-99-115، ER-N-99-116، ER-N-99-117، ER-N-99-118، ER-N-99-119، ER-N-99-120، ER-N-99-121، ER-N-99-122، ER-N-99-123، ER-N-99-124، ER-N-99-125، ER-N-99-126، ER-N-99-127، ER-N-99-128، ER-N-99-129، ER-N-99-130، ER-N-99-131، ER-N-99-132، ER-N-99-133، ER-N-99-134، ER-N-99-135، ER-N-99-136، ER-N-99-137، ER-N-99-138، ER-N-99-139، ER-N-99-140، ER-N-99-141، ER-N-99-142، ER-N-99-143، ER-N-99-144، ER-N-99-145، ER-N-99-146، ER-N-99-147، ER-N-99-148، ER-N-99-149، ER-N-99-150، ER-N-99-151، ER-N-99-152، ER-N-99-153، ER-N-99-154، ER-N-99-155، ER-N-99-156، ER-N-99-157، ER-N-99-158، ER-N-99-159، ER-N-99-160، ER-N-99-161، ER-N-99-162، ER-N-99-163، ER-N-99-164، ER-N-99-165، ER-N-99-166، ER-N-99-167، ER-N-99-168، ER-N-99-169، ER-N-99-170، ER-N-99-171، ER-N-99-172، ER-N-99-173، ER-N-99-174، ER-N-99-175، ER-N-99-176، ER-N-99-177، ER-N-99-178، ER-N-99-179، ER-N-99-180، ER-N-99-181، ER-N-99-182، ER-N-99-183، ER-N-99-184، ER-N-99-185، ER-N-99-186، ER-N-99-187، ER-N-99-188، ER-N-99-189، ER-N-99-190، ER-N-99-191، ER-N-99-192، ER-N-99-193، ER-N-99-194، ER-N-99-195، ER-N-99-196، ER-N-99-197، ER-N-99-198، ER-N-99-199، ER-N-99-200، ER-N-99-201، ER-N-99-202، ER-N-99-203، ER-N-99-204، ER-N-99-205، ER-N-99-206، ER-N-99-207، ER-N-99-208، ER-N-99-209، ER-N-99-210، ER-N-99-211، ER-N-99-212، ER-N-99-213، ER-N-99-214، ER-N-99-215، ER-N-99-216، ER-N-99-217، ER-N-99-218، ER-N-99-219، ER-N-99-220، ER-N-99-221، ER-N-99-222، ER-N-99-223، ER-N-99-224، ER-N-99-225، ER-N-99-226، ER-N-99-227، ER-N-99-228، ER-N-99-229، ER-N-99-230، ER-N-99-231، ER-N-99-232، ER-N-99-233، ER-N-99-234، ER-N-99-235، ER-N-99-236، ER-N-99-237، ER-N-99-238، ER-N-99-239، ER-N-99-240، ER-N-99-241، ER-N-99-242، ER-N-99-243، ER-N-99-244، ER-N-99-245، ER-N-99-246، ER-N-99-247، ER-N-99-248، ER-N-99-249، ER-N-99-250، ER-N-99-251، ER-N-99-252، ER-N-99-253، ER-N-99-254، ER-N-99-255، ER-N-99-256، ER-N-99-257، ER-N-99-258، ER-N-99-259، ER-N-99-260، ER-N-99-261، ER-N-99-262، ER-N-99-263، ER-N-99-264، ER-N-99-265، ER-N-99-266، ER-N-99-267، ER-N-99-268، ER-N-99-269، ER-N-99-270، ER-N-99-271، ER-N-99-272، ER-N-99-273، ER-N-99-274، ER-N-99-275، ER-N-99-276، ER-N-99-277، ER-N-99-278، ER-N-99-279، ER-N-99-280، ER-N-99-281، ER-N-99-282، ER-N-99-283، ER-N-99-284، ER-N-99-285، ER-N-99-286، ER-N-99-287، ER-N-99-288، ER-N-99-289، ER-N-99-290، ER-N-99-291، ER-N-99-292، ER-N-99-293، ER-N-99-294، ER-N-99-295، ER-N-99-296، ER-N-99-297، ER-N-99-298، ER-N-99-299، ER-N-99-300، ER-N-99-301، ER-N-99-302، ER-N-99-303، ER-N-99-304، ER-N-99-305، ER-N-99-306، ER-N-99-307، ER-N-99-308، ER-N-99-309، ER-N-99-310، ER-N-99-311، ER-N-99-312، ER-N-99-313، ER-N-99-314، ER-N-99-315، ER-N-99-316، ER-N-99-317، ER-N-99-318، ER-N-99-319، ER-N-99-320، ER-N-99-321، ER-N-99-322، ER-N-99-323، ER-N-99-324، ER-N-99-325، ER-N-99-326، ER-N-99-327، ER-N-99-328، ER-N-99-329، ER-N-99-330، ER-N-99-331، ER-N-99-332، ER-N-99-333، ER-N-99-334، ER-N-99-335، ER-N-99-336، ER-N-99-337، ER-N-99-338، ER-N-99-339، ER-N-99-340، ER-N-99-341، ER-N-99-342، ER-N-99-343، ER-N-99-344، ER-N-99-345، ER-N-99-346، ER-N-99-347، ER-N-99-348، ER-N-99-349، ER-N-99-350، ER-N-99-351، ER-N-99-352، ER-N-99-353، ER-N-99-354، ER-N-99-355، ER-N-99-356، ER-N-99-357، ER-N-99-358، ER-N-99-359، ER-N-99-360، ER-N-99-361، ER-N-99-362، ER-N-99-363، ER-N-99-364، ER-N-99-365، ER-N-99-366، ER-N-99-367، ER-N-99-368، ER-N-99-369، ER-N-99-370، ER-N-99-371، ER-N-99-372، ER-N-99-373، ER-N-99-374، ER-N-99-375، ER-N-99-376، ER-N-99-377، ER-N-99-378، ER-N-99-379، ER-N-99-380، ER-N-99-381، ER-N-99-382، ER-N-99-383، ER-N-99-384، ER-N-99-385، ER-N-99-386، ER-N-99-387، ER-N-99-388، ER-N-99-389، ER-N-99-390، ER-N-99-391، ER-N-99-392، ER-N-99-393، ER-N-99-394، ER-N-99-395، ER-N-99-396، ER-N-99-397، ER-N-99-398، ER-N-99-399، ER-N-99-400، ER-N-99-401، ER-N-99-402، ER-N-99-403، ER-N-99-404، ER-N-99-405، ER-N-99-406، ER-N-99-407، ER-N-99-408، ER-N-99-409، ER-N-99-410، ER-N-99-411، ER-N-99-412، ER-N-99-413، ER-N-99-414، ER-N-99-415، ER-N-99-416، ER-N-99-417، ER-N-99-418، ER-N-99-419، ER-N-99-420، ER-N-99-421، ER-N-99-422، ER-N-99-423، ER-N-99-424، ER-N-99-425، ER-N-99-426، ER-N-99-427، ER-N-99-428، ER-N-99-429، ER-N-99-430، ER-N-99-431، ER-N-99-432، ER-N-99-433، ER-N-99-434، ER-N-99-435، ER-N-99-436، ER-N-99-437، ER-N-99-438، ER-N-99-439، ER-N-99-440، ER-N-99-441، ER-N-99-442، ER-N-99-443، ER-N-99-444، ER-N-99-445، ER-N-99-446، ER-N-99-447، ER-N-99-448، ER-N-99-449، ER-N-99-450، ER-N-99-451، ER-N-99-452، ER-N-99-453، ER-N-99-454، ER-N-99-455، ER-N-99-456، ER-N-99-457، ER-N-99-458، ER-N-99-459، ER-N-99-460، ER-N-99-461، ER-N-99-462، ER-N-99-463، ER-N-99-464، ER-N-99-465، ER-N-99-466، ER-N-99-467، ER-N-99-468، ER-N-99-469، ER-N-99-470، ER-N-99-471، ER-N-99-472، ER-N-99-473، ER-N-99-474، ER-N-99-475، ER-N-99-476، ER-N-99-477، ER-N-99-478، ER-N-99-479، ER-N-99-480، ER-N-99-481، ER-N-99-482، ER-N-99-483، ER-N-99-484، ER-N-99-485، ER-N-99-486، ER-N-99-487، ER-N-99-488، ER-N-99-489، ER-N-99-490، ER-N-99-491، ER-N-99-492، ER-N-99-493، ER-N-99-494، ER-N-99-495، ER-N-99-496، ER-N-99-497، ER-N-99-498، ER-N-99-499، ER-N-99-500، ER-N-99-501، ER-N-99-502، ER-N-99-503، ER-N-99-504، ER-N-99-505، ER-N-99-506، ER-N-99-507، ER-N-99-508، ER-N-99-509، ER-N-99-510، ER-N-99-511، ER-N-99-512، ER-N-99-513، ER-N-99-514، ER-N-99-515، ER-N-99-516، ER-N-99-517، ER-N-99-518، ER-N-99-519، ER-N-99-520، ER-N-99-521، ER-N-99-522، ER-N-99-523، ER-N-99-524، ER-N-99-525، ER-N-99-526، ER-N-99-527، ER-N-99-528، ER-N-99-529، ER-N-99-530، ER-N-99-531، ER-N-99-532، ER-N-99-533، ER-N-99-534، ER-N-99-535، ER-N-99-536، ER-N-99-537، ER-N-99-538، ER-N-99-539، ER-N-99-540، ER-N-99-541، ER-N-99-542، ER-N-99-543، ER-N-99-544، ER-N-99-545، ER-N-99-546، ER-N-99-547، ER-N-99-548، ER-N-99-549، ER-N-99-550، ER-N-99-551، ER-N-99-552، ER-N-99-553، ER-N-99-554، ER-N-99-555، ER-N-99-556، ER-N-99-557، ER-N-99-558، ER-N-99-559، ER-N-99-560، ER-N-99-561، ER-N-99-562، ER-N-99-563، ER-N-99-564، ER-N-99-565، ER-N-99-566، ER-N-99-567، ER-N-99-568، ER-N-99-569، ER-N-99-570، ER-N-99-571، ER-N-99-572، ER-N-99-573، ER-N-99-574، ER-N-99-575، ER-N-99-576، ER-N-99-577، ER-N-99-578، ER-N-99-579، ER-N-99-580، ER-N-99-581، ER-N-99-582، ER-N-99-583، ER-N-99-584، ER-N-99-585، ER-N-99-586، ER-N-99-587، ER-N-99-588، ER-N-99-589، ER-N-99-590، ER-N-99-591، ER-N-99-592، ER-N-99-593، ER-N-99-594، ER-N-99-595، ER-N-99-596، ER-N-99-597، ER-N-99-598، ER-N-99-599، ER-N-99-600، ER-N-99-601، ER-N-99-602، ER-N-99-603، ER-N-99-604، ER-N-99-605، ER-N-99-606، ER-N-99-607، ER-N-99-608، ER-N-99-609، ER-N-99-610، ER-N-99-611، ER-N-99-612، ER-N-99-613، ER-N-99-614، ER-N-99-615، ER-N-99-616، ER-N-99-617، ER-N-99-618، ER-N-99-619، ER-N-99-620، ER-N-99-621، ER-N-99-622، ER-N-99-623، ER-N-99-624، ER-N-99-625، ER-N-99-626، ER-N-99-627، ER-N-99-628، ER-N-99-629، ER-N-99-630، ER-N-99-631، ER-N-99-632، ER-N-99-633، ER-N-99-634، ER-N-99-635، ER-N-99-636، ER-N-99-637، ER-N-99-638، ER-N-99-639، ER-N-99-640، ER-N-99-641، ER-N-99-642، ER-N-99-643، ER-N-99-644، ER-N-99-645، ER-N-99-646، ER-N-99-647، ER-N-99-648، ER-N-99-649، ER-N-99-650، ER-N-99-651، ER-N-99-652، ER-N-99-653، ER-N-99-654، ER-N-99-655، ER-N-99-656، ER-N-99-657، ER-N-99-658، ER-N-99-659، ER-N-99-660، ER-N-99-661، ER-N-99-662، ER-N-99-663، ER-N-99-664، ER-N-99-665، ER-N-99-666، ER-N-99-667، ER-N-99-668، ER-N-99-669، ER-N-99-670، ER-N-99-671، ER-N-99-672، ER-N-99-673، ER-N-99-674، ER-N-99-675، ER-N-99-676، ER-N-99-677، ER-N-99-678، ER-N-99-679، ER-N-99-680، ER-N-99-681، ER-N-99-682، ER-N-99-683، ER-N-99-684، ER-N-99-685، ER-N-99-686، ER-N-99-687، ER-N-99-688، ER-N-99-689، ER-N-99-690، ER-N-99-691، ER-N-99-692، ER-N-99-693، ER-N-99-694، ER-N-99-695، ER-N-99-696، ER-N-99-697، ER-N-99-698، ER-N-99-699، ER-N-99-700، ER-N-99-701، ER-N-99-702، ER-N-99-703، ER-N-99-704، ER-N-99-705، ER-N-99-706، ER-N-99-707، ER-N-99-708، ER-N-99-709، ER-N-99-710، ER-N-99-711، ER-N-99-712، ER-N-99-713، ER-N-99-714، ER-N-99-715، ER-N-99-716، ER-N-99-717، ER-N-99-718، ER-N-99-719، ER-N-99-720، ER-N-99-721، ER-N-99-722، ER-N-99-723، ER-N-99-724، ER-N-99-725، ER-N-99-726، ER-N-99-727، ER-N-99-728، ER-N-99-729، ER-N-99-730، ER-N-99-731، ER-N-99-732، ER-N-99-733، ER-N-99-734، ER-N-99-735، ER-N-99-736، ER-N-99-737، ER-N-99-738، ER-N-99-739، ER-N-99-740، ER-N-99-741، ER-N-99-742، ER-N-99-743، ER-N-99-744، ER-N-99-745، ER-N-99-746، ER-N-99-747، ER-N-99-748، ER-N-99-749، ER-N-99-750، ER-N-99-751، ER-N-99-752، ER-N-99-753، ER-N-99-754، ER-N-99-755، ER-N-99-756، ER-N-99-757، ER-N-99-758، ER-N-99-759، ER-N-99-760، ER-N-99-761، ER-N-99-762، ER-N-99-763، ER-N-99-764، ER-N-99-765، ER-N-99-766، ER-N-99-767، ER-N-99-768، ER-N-99-769، ER-N-99-770، ER-N-99-771، ER-N-99-772، ER-N-99-773، ER-N-99-774، ER-N-99-775، ER-N-99-776، ER-N-99-777، ER-N-99-778، ER-N-99-779، ER-N-99-780، ER-N-99-781، ER-N-99-782، ER-N-99-783، ER-N-99-784، ER-N-99-785، ER-N-99-786، ER-N-99-787، ER-N-99-788، ER-N-99-789، ER-N-99-790، ER-N-99-791، ER-N-99-792، ER-N-99-793، ER-N-99-794، ER-N-99-795، ER-N-99-796، ER-N-99-797، ER-N-99-798، ER-N-99-799، ER-N-99-800، ER-N-99-801، ER-N-99-802، ER-N-99-803، ER-N-99-804، ER-N-99-805، ER-N-99-806، ER-N-99-807، ER-N-99-808، ER-N-99-809، ER-N-99-810، ER-N-99-811، ER-N-99-812، ER-N-99-813، ER-N-99-814، ER-N-99-815، ER-N-99-816، ER-N-99-817، ER-N-99-818، ER-N-99-819، ER-N-99-820، ER-N-99-821، ER-N-99-822، ER-N-99-823، ER-N-99-824، ER-N-99-825، ER-N-99-826، ER-N-99-827، ER-N-99-828، ER-N-99-829، ER-N-99-830، ER-N-99-831، ER-N-99-832، ER-N-99-833، ER-N-99-834، ER-N-99-835، ER-N-99-836، ER-N-99-837، ER-N-99-838، ER-N-99-839، ER-N-99-840، ER-N-99-841، ER-N-99-842، ER-N-99-843، ER-N-99-844، ER-N-99-845، ER-N-99-846، ER-N-99-847، ER-N-99-848، ER-N-99-849، ER-N-99-850، ER-N-99-851، ER-N-99-852، ER-N-99-853، ER-N-99-854، ER-N-99-855، ER-N-99-856، ER-N-99-857، ER-N-99-858، ER-N-99-859، ER-N-99-860، ER-N-99-861، ER-N-99-862، ER-N-99-863، ER-N-99-864، ER-N-99-865، ER-N-99-866، ER-N-99-867، ER-N-99-868، ER-N-99-869، ER-N-99-870، ER-N-99-871، ER-N-99-872، ER-N-99-873، ER-N-99-874، ER-N-99-875، ER-N-99-876، ER-N-99-877، ER-N-99-878، ER-N-99-879، ER-N-99-880، ER-N-99-881، ER-N-99-882، ER-N-99-883، ER-N-99-884، ER-N-99-885، ER-N-99-886، ER-N-99-887، ER-N-99-888، ER-N-99-889، ER-N-99-890، ER-N-99-891، ER-N-99-892، ER-N-99-893، ER-N-99-894، ER-N-99-895، ER-N-99-896، ER-N-99-897، ER-N-99-898، ER-N-99-899، ER-N-99-900، ER-N-99-901، ER-N-99-902، ER-N-99-903، ER-N-99-904، ER-N-99-905، ER-N-99-906، ER-N-99-907، ER-N-99-908، ER-N-99-909، ER-N-99-910، ER-N-99-911، ER-N-99-912، ER-N-99-913، ER-N-99-914، ER-N-99-915، ER-N-99-916، ER-N-99-917، ER-N-99-918، ER-N-99-919، ER-N-99-920، ER-N-99-921، ER-N-99-922، ER-N-99-923، ER-N-99-924، ER-N-99-925، ER-N-99-926، ER-N-99-927، ER-N-99-928، ER-N-99-929، ER-N-99-930، ER-N-99-931، ER-N-99-932، ER-N-99-933، ER-N-99-934، ER-N-99-935، ER-N-99-936، ER-N-99-937، ER-N-99-938، ER-N-99-939، ER-N-99-940، ER-N-99-941، ER-N-99-942، ER-N-99-943، ER-N-99-944، ER-N-99-945، ER-N-99-946، ER-N-99-947، ER-N-99-948، ER-N-99-949، ER-N-99-950، ER-N-99-951، ER-N-99-952، ER-N-99-953، ER-N-99-954، ER-N-99-955، ER-N-99-956، ER-N-99-957، ER-N-99-958، ER-N-99-959، ER-N-99-960، ER-N-99-961، ER-N-99-962، ER-N-99-963، ER-N-99-964، ER-N-99-965، ER-N-99-966، ER-N-99-967، ER-N-99-968، ER-N-99-969، ER-N-99-970، ER-N-99-971، ER-N-99-972، ER

می باشد، بر حسب روز محاسبه شد، وزن هزار دانه (TKW) و عملکرد دانه (YLD) بود که یادداشتبرداری ها بر اساس میانگین داده های ۵ بوته انجام گرفت. برای شناسایی تفاوت موجود بین لاین های امیدبخش گندم مورد مطالعه از نظر صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه بعد از اطمینان از برقراری مفروضات از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها استفاده شد. تجزیه های آماری انجام شده در این پژوهش که بیشتر آنها جزء روش های آماری چند متغیره به شمار می آید شامل تجزیه واریانس، مقایسه میانگین به روش دانکن، تجزیه همبستگی، تجزیه به مولفه های اصلی و در تجزیه گرافیکی از روش های نمای چند ضلعی بای پلات، همبستگی بین صفات، رتبه بندی ژنتیک پهلا براساس ژنتیک ایده آل و گروه بندی لاین ها بودند. به منظور آنالیز داده های بدست آمده از آزمایش تجزیه خوش ای و تجزیه به مولفه های اصلی و همچنین رسم نمودارها از نرم افزار SAS V 9.2 و همچنین از نرم افزارهای Genstat.v12 و XLstat2020 به منظور تجزیه گرافیکی استفاده شد.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس انجام گرفته در سطح احتمال ۰/۰۱ و ۰/۰۵ بر روی ۲۱ لاین امیدبخش گندم مورد بررسی از نظر صفات مورد ارزیابی حاکی از آن بود که لاین ها از نظر تمامی صفات به جزء صفت تعداد دانه در سنبله دارای اختلاف معنی داری باهم بودند (جدول ۲).

اثر بلوک نیز از نظر صفات تعداد پنجه بارور، طول پدانکل، وزن دانه در سنبله، وزن دانه در کل بوته، روز تا سنبله دهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار شد. بیشترین میزان ضریب تغییرات مربوط به صفت تعداد دانه در سنبله (۲۹/۰۷) و کمترین میزان ضریب تغییرات را صفت روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی (۲۹/۰۵) به خود اختصاص داد (جدول ۲). مقدار بالای ضریب تغییرات برای صفت نشان می دهد که مقادیر آن در بین ژنتیک ها بسیار متفاوت است.

ER-N-99-18، ER-N-99-17، ER-N-99-16، ER-N-99-19 و ER-N-99-21 (ER-N-99-19) و ارقام شاهد (تیرگان و کلاته) جزء آخرین ارقام معرفی شده اقلیم گرم و مرتبط شمال هستند که علاوه بر داشتن عملکرد خوب دارای مقاومت قابل قبول نسبت به بیماری های مهم قارچی (گندم هستند) در سطح هشت مترمربع (برای هر ژنتیک مجموعاً شش خط کاشت روی دو پشته (روی هر پشته سه خط کاشت) به طول ۶/۶۶ متر و عرض دو پشته ۱/۲ متر) با بذر کار غلات با تراکم بذر ۴۰۰ دانه در متر مربع عملیات کشت انجام شد. بذور پیش از کاشت جهت مبارزه با سیاهک ها با قارچ کش مناسب ضد عفونی شدند. بعد از عملیات کشت در اواسط آبان ماه آبیاری انجام یافت و تاریخ سبز شدن لاین ها یادداشت گردید. در طول فصول پاییز و زمستان بازدید انجام شد.

در اوسط فروردین در مرحله سه تا پنجم برگی با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه از علف کش مناسب (با سوم پهن برگ کش و باریک برگ کش اختصاصی) برای مازره با علف های هرز استفاده گردید. در هر یک از مراحل ساقه رفتن و سنبله دهی از کود اوره به صورت سرک استفاده شد. در طول دوره رشد یادداشتبرداری های لازم همچون تعداد روز تا سنبله دهی و تعداد روز تا رسیدن صورت گرفت. برداشت در اوایل تیر ماه سال ۱۴۰۰ انجام و عملکرد هر قطعه توزین و به هکتار تعیین داده شد.

صفات اندازه گیری شده در آزمایش شامل: ارتفاع بوته (PLH) بر حسب سانتی متر از سطح خاک تا انتهای سنبله، تعداد پنجه (NT)، تعداد پنجه بارور (NFT) در متر مربع در زمان رسیدن دانه، طول پدانکل (PL)، طول سنبله (SL)، تعداد سنبله (NS)، تعداد دانه در سنبله (NGS)، وزن دانه در سنبله (GWS)، وزن دانه در کل بوته (GWP)، روز کل بوته (TPW)، روز تا سنبله دهی (DHE)

فیزیولوژیکی (DMA) زمان از کاشت تا ظهور سنبله و رسیدن فیزیولوژیکی دانه ها که مصادف با زرد شدن پدانکل گیاهان

جدول ۱- شجره لاین های امیدبخش گندم مورد مطالعه

Table 1. Pedigree of studied promising wheat lines

ER-N-99 No.	Pedigree شجره	ER-N-99 No.	Pedigree شجره
1	Tirgan	13	MUCUY/3/PBW343*2//KUKUNA*2//FRTL/PIFED
2	Kalate	14	KFA/2*KACHU/3/PBW343*2//KUKUNA*2//FRTL/PIFED/4/KFA
3	Morvarid/Yang//VOROBAY	15	NELOKI//SOKOLL/EXCALIBUR
4	KACHU//WBLL1*2//BRAMBLING/3/KACHU/KIRITATI	16	MUCUY
5	KACHU//WBLL1*2//BRAMBLING*2/3/KACHU/KIRITATI	17	NELOKI//SOKOLL/EXCALIBUR
6	KACHU//WBLL1*2//BRAMBLING*2/3/KACHU/KIRITATI	18	BAJ #1*2*PREMIO
7	KACHU//WBLL1*2//BRAMBLING*2/3/KACHU/KIRITATI	19	KACHU #1/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1/4/KACHU/8/TACUPE
8	ONIX/KBIRD*2//KFA/2*KACHU	20	SAUAL/MUTUS/4/KACHU #1//WBLL1*2//KUKUNA/3/BRBT1*2/K
9	KACHU/SAUAL*2/3/KINGBIRD #1//INQALAB 91*2/TUKURU	21	BABAX/LR42//BABAX/3/ER2000/7/CNO79//PF70354/MUS/3/PAS
10	KACHU/SAUAL*2/3/KINGBIRD #1//INQALAB 91*2/TUKURU	22	BAJ #1*2*PREMIO
11	UP2338*2//SHAMA/3/MILAN/KAUZ//CHIL/CHUM18/4/UP2338*2	23	BAVIS #1*2*PREMIO
12	MUTUS*2/TECUE #1/3/KINGBIRD #1//INQALAB 91*2/TUKURU		

جدول -۲- تجزیه واریانس ۲۱ لاین امیدبخش گندم مورد مطالعه به همراه دو رقم به عنوان شاهد از نظر صفات مورد ارزیابی در آزمایش
Table 2. Analysis of variance of studied 21 promising wheat lines of along with two cultivars as a control in terms of evaluated traits in the experiment

NGS	NS	SL	PL	NFT	NT	PLH	Df	V.O.A منابع تغییرات
89.5 ^{ns}	4*	3.85*	71.7*	0.10*	0.14*	343*	22	Genotype
148.6 ^{ns}	1.63 ^{ns}	2.02 ^{ns}	202.2*	1.09**	0.18 ^{ns}	257.7 ^{ns}	2	ژنتیپ
138.8	2.37	40.65	40.65	0.05	0.07	213.4	44	Block تکرار
29.07	9.51	16.41	16.41	13.69	14.24	16.13	--	خطا Error
								CV% ضریب تغییرات
YLD	TKW	DMA	DHE	TPW	GWP	GWS	Df	V.O.A منابع تغییرات
1.19*	75.3**	68.8**	83.77**	7.36**	0.96**	0.55*	22	Genotype
26.6*	699.8*	3562.1*	2321.3*	12.4*	1.25*	1.14*	2	ژنتیپ
0.59	21.91	28.1	23.77	2.12	0.46	0.33	44	Block تکرار
13.44	11.79	2.95	3.53	22.25	28.5	24.8	--	خطا Error
								CV% ضریب تغییرات

ms و ** به ترتیب اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۰/۰۱ و ۰/۰۵ و عدم معنی‌داری

**,* and ns: respectively, significant difference at the probability level of 0.01 and 0.05 and non-significance
ارتفاع بوته: PLH، تعداد پنجه بارور: NT، طول سنبله: NS، تعداد دانه در سنبله: SL، وزن دانه در سنبله: GWS،
وزن دانه در کل بوته: GWP، وزن کل بوته: TPW، روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی: DHE، روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی: DMA، وزن هزار دانه: YLD

Plant height: PLH, number of tillers: NT, number of fertile tillers: NFT, peduncle length: PL, spike length: SL, number of spikes: NS, number of seeds per spike: NGS, seed weight per spike: GWS, seed weight per plant : GWP, total plant weight: TPW, days to spike: DHE, days to physiological maturity: DMA, thousand seed weight: TKW, grain yield: YLD

صفت نیز، لاین‌های G17 و G13 به ترتیب به عنوان لاین‌های مطلوب و نامطلوب شناسایی شدند.

از نظر صفت تعداد سنبله لاین G13 بهترین رتبه را به خود اختصاص داد و لاین G3 کمترین رتبه را دارا بود. نمودار بدست آمده از این صفت نیز حاکی از آن بود که لاین‌های G10، G17 و G12 به عنوان لاین‌های مطلوب و لاین‌های G3 و G23 به عنوان لاین‌های نامطلوب شناسایی شدند (جدول ۳).

براساس نتایج مقایسه میانگین در صفت تعداد دانه در سنبله، لاین G23 دارای بهترین رتبه و لاین G3 کمترین رتبه را به خود اختصاص داد. بر اساس نمودار بدست آمده از این صفت نیز لاین G23 به عنوان بهترین لاین و لاین‌های G3 و G19 به عنوان نامطلوب‌ترین لاین‌ها انتخاب شدند (جدول ۳).

از نظر صفات وزن دانه در سنبله، وزن دانه در کل بوته و وزن کل بوته نیز لاین‌های G17 و G3 به ترتیب بهترین و کمترین رتبه را دارا بودند و نمودار مقایسه میانگین بدست آمده از نظر این صفات نیز نتایج مشابه را نشان داد (جدول ۳). از نظر صفات روز تا سنبله‌دهی و روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی لاین G3 به عنوان لاین مطلوب و لاین G17 به عنوان لاین نامطلوب شناسایی شد. نمودار بدست آمده از میانگین دادهای این صفات نیز حاکی از آن بیشتری نسبت به سایر لاین‌ها بوده و لاین G17 از مطلوبیت کمتری برخوردار می‌باشد.

از نظر صفات وزن هزار دانه و عملکرد دانه بر اساس نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین و نمودارهای رسم شده، لاین G17 به عنوان لاین مطلوب و لاین G3 به عنوان لاین نامطلوب شناسایی شدند. با توجه به بررسی لاین‌ها از نظر

اهری‌زاد و همکاران (۱) نیز برای صفات فنولوژیکی کمترین ضریب تغییرات را گزارش نمودند.

براساس مقایسه میانگین انجام گرفته به روش دانکن بر روی داده‌های حاصل از آزمایش صفت ارتفاع بوته لاین G17 برترین رتبه و لاین G13 کمترین رتبه را به خود اختصاص دادند. نمودار بدست آمده از میانگین صفات مورد ارزیابی نیز از نظر این صفت، لاین‌های G17 و G2 به عنوان لاین‌هایی با میانگین عملکرد بالا و لاین‌های G13 و G3 به عنوان لاین‌هایی با میانگین عملکرد پایین از نظر این صفت انتخاب شدند (جدول ۳).

از نظر صفت تعداد پنجه نیز ژنتیپ G14 به عنوان لاین مطلوب و لاین G3 به عنوان لاین نامطلوب شناسایی شد. نمودار بدست آمده بر روی میانگین این صفت نیز حاکی از آن بود که لاین‌های G14 و G19 به عنوان لاین‌های مطلوب و لاین G3 به عنوان لاین نامطلوب شناسایی شدند (جدول ۳).

نتایج مقایسه میانگین در صفت تعداد پنجه بارور، لاین‌های G17 و G3 به ترتیب به عنوان لاین‌های مطلوب و نامطلوب شناسایی شدند. نمودار بدست آمده در این صفت نیز لاین‌های G17 و G15 را به عنوان لاین‌های مطلوب و لاین G3 به عنوان لاین نامطلوب شناسایی نمود (جدول ۳).

لاین‌های G15 و G3 نیز از نظر طول پدانکل به ترتیب به عنوان لاین‌هایی با رتبه برتر و کمتر انتخاب شدند. نمودار بدست آمده از نظر این صفت نیز دو لاین G15 و G17 را به عنوان لاین‌های مطلوب و لاین G3 را به عنوان لاین نامطلوب شناسایی نمود (جدول ۳).

نتایج مقایسه میانگین از نظر صفت طول سنبله نیز حاکی از آن بود که لاین G17 دارای رتبه برتر و لاین G3 کمترین رتبه را دارا بود. از نظر نمودار مقایسه میانگین از نظر این

پنجه و تعداد پنجه بارور مشاهده شد. همچنین صفت طول سنبله با صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور و طول پدانکل همبستگی مثبت و معنی‌داری را نشان دادند. صفت تعداد سنبله با صفت طول سنبله همبستگی مثبتی نشان دادند. صفت وزن دانه در سنبله نیز با صفات ارتفاع گیاه، طول پدانکل، طول سنبله، تعداد سنبله‌چه و تعداد دانه در سنبله همبستگی مثبت نشان داد. صفت وزن دانه در کل بوته نیز با صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور، طول سنبله، تعداد سنبله‌چه، تعداد دانه در سنبله و وزن دانه در سنبله دارای همبستگی مثبت بود. صفت وزن کل بوته با تمام صفات مورد ارزیابی بهجز صفات روز تا سنبله‌دهی و روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی همبستگی مثبت و معنی‌داری را نشان داد. صفت روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی نیز با صفات تعداد پنجه بارور و روز تا سنبله‌دهی همبستگی مثبتی را نشان دادند.

تمامی صفات و رتبه‌بندی آنها بر اساس صفات مورد ارزیابی نیز می‌توان این گونه نتیجه‌گیری نمود که لاین G17 از نظر صفات مورد آزمایش از مطلوب‌ترین بالاتری نسبت به سایر لاین‌ها برخوردار بود. ترتیب رتبه‌بندی لاین‌ها در این تجزیه از مطلوب‌ترین تا نامطلوب‌ترین لاین بهشرح زیر است:

G17 > G13 > G7 > G15 > G10 > G2 > G18 > G14 > G2 > G4 > G9 > G12 > G16 > G1 > G11 > G5 > G8 > G23 > G22 > G6 > G20 > G19 > G3.

تجزیه همبستگی

تجزیه ضرایب همبستگی بر روی صفات مورد ارزیابی در آزمایش انجام گرفت و میزان همبستگی بین صفات اندازه‌گیری و برآورد شد (جدول ۴). بر این اساس صفت تعداد پنجه بارور با صفات ارتفاع بوته و تعداد پنجه همبستگی مثبت و معنی‌داری را نشان دادند. همچنین همبستگی مثبت و معنی‌داری بین صفت طول پدانکل با صفات ارتفاع بوته، تعداد

جدول ۳- مقایسه میانگین لاین‌های امیدبخش گندم به روش دانکن از نظر صفات مورد ارزیابی در آزمایش
Table 3. Mean comparison of the promising wheat lines by Duncan method in terms of evaluated traits in the experiment

نوعیب Genotype	Total Rank	PLH	R	NT	R	NFT	R	PL	R	SL	R	NS	R	NGS	R
G1	14	96.55abcd	7	1.92 ^{ab}	18	1.77 ^{ab}	9	41.06 ^{abc}	8	9.9 ^{abc}	5	16.9 ^{ab}	7	34.5 ^{bcd}	21
G2	6	107.2 ^a	2	2 ^{ab}	11	1.71 ^{ab}	15	42.2 ^{abc}	4	9.2 ^{abcd}	13	16.7 ^{abc}	9	43.6 ^{abc}	7
G3	23	69.33 ^{dc}	22	1.23 ^c	23	1.23 ^c	23	25.6 ^d	23	6.3 ^d	23	13.7 ^c	23	29.9 ^{ed}	23
G4	10	90.11abcd	12	1.99 ^{ab}	12	1.83 ^{ab}	6	38.9 ^{abc}	14	9.3 ^{abcd}	11	16.35 ^{abc}	13	36.8 ^{bcd}	18
G5	16	90.01abcd	13	1.98 ^{ab}	15	1.76 ^{ab}	10	41.1 ^{abc}	7	7.1 ^{bcd}	21	16.75 ^{abc}	8	39.9 ^{bcd}	13
G6	20	87.5 ^{bcd}	17	1.69 ^{bcd}	22	1.75 ^{ab}	11	37.6 ^{abcd}	16	8.8 ^{abcd}	17	17.06 ^{ab}	6	42.9 ^{abc}	8
G7	3	102.6 ^{ab}	4	2.17 ^{ab}	3	1.82 ^{ab}	7	40.1 ^{abc}	11	10.6 ^a	2	14.9 ^{abc}	19	35.1 ^{bcd}	19
G8	17	89.32abcd	15	2.01 ^{ab}	10	1.95 ^{ab}	4	40.4 ^{abc}	10	9.69 ^{abc}	7	16.4 ^{abc}	12	35.1 ^{bcd}	20
G9	11	90.36abcd	11	1.86 ^{ab}	19	1.74 ^{ab}	13	36a ^{bed}	18	10.22 ^{ab}	3	16.2 ^{abc}	14	42.6 ^{abcd}	9
G10	5	92.27abcd	9	2.06 ^{ab}	8	1.74 ^{ab}	14	34 ^{cd}	20	9.7 ^{abc}	6	17.49 ^a	3	45.7 ^{abc}	5
G11	15	81.38 ^{bcd}	19	1.76 ^{ab}	20	1.79 ^{ab}	8	33.3 ^{cd}	21	9.6 ^{abc}	9	17.13 ^{ab}	5	41.5 ^{abcd}	10
G12	12	81.3 ^{bcd}	20	1.97 ^{ab}	16	1.86 ^{ab}	5	34.4 ^{bcd}	19	9.3 ^{abcd}	12	17.47 ^a	4	41.3 ^{abcd}	11
G13	2	68.6 ^d	23	2.12 ^{ab}	7	1.99 ^{ab}	3	37.4 ^{abcd}	17	10.2 ^{ab}	4	17.67 ^a	1	48.4 ^{ab}	2
G14	8	89.74abcd	14	2.27 ^a	1	1.7 ^{ab}	17	42 ^{abc}	5	8.9 ^{abcd}	19	16.43 ^{abc}	11	41.1 ^{abcd}	12
G15	4	98.93 ^{ab}	5	2.14 ^{ab}	4	2.1 ^a	2	47.4 ^a	1	9.5 ^{abc}	10	14.7 ^{abc}	20	37.2 ^{bcd}	17
G16	13	91.96abcd	10	2.14 ^{ab}	5	1.7 ^{ab}	18	39.4 ^{abc}	12	8.9 ^{abcd}	16	16.5 ^{abc}	10	44.3 ^{abc}	6
G17	1	110.3 ^a	1	2.02 ^{ab}	9	2.11 ^a	1	47.1 ^{ab}	2	11.3 ^a	1	17.62 ^a	2	46.6 ^{ab}	4
G18	7	98.2 ^{abc}	6	2.13 ^{ab}	6	1.74 ^{ab}	12	41.22 ^{abc}	6	9.61 ^{abc}	8	15.99 ^{abc}	17	37.4 ^{bcd}	16
G19	22	94 ^{abcd}	8	2.22 ^{ab}	2	1.57 ^{bcd}	21	37.8 ^{abc}	15	7.03 ^{cd}	22	15.7 ^{abc}	18	30.9 ^{bcd}	22
G20	21	84.13 ^{bcd}	18	1.99 ^{ab}	13	1.61 ^{bc}	20	40.7 ^{abc}	9	9.2 ^{abcd}	14	16 ^{abc}	16	38.8 ^{bcd}	15
G21	9	103.6 ^{ab}	3	1.99 ^{ab}	14	1.65 ^{abc}	19	31.5 ^{cd}	22	9.1 ^{abcd}	15	14 ^{bc}	21	47.5 ^{ab}	3
G22	19	88.2 ^{bcd}	16	1.97 ^{ab}	17	1.71 ^{ab}	16	39.4 ^{abc}	13	8.7 ^{abcd}	18	16.1 ^{abc}	15	39 ^{bcd}	14
G23	18	76.8 ^{bcd}	21	1.74 ^{ab}	21	1.51 ^{bc}	22	43.7 ^{abc}	3	8.3 ^{abcd}	20	14 ^{bc}	22	50.88 ^a	1

***، **، * و ns به ترتیب اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۰/۰۱ و ۰/۰۵ و عدم معنی‌داری

ارتفاع بوته: PLH، تعداد پنجه: NT، تعداد سنبله: SL، طول سنبله: NFT، تعداد دانه در سنبله: NS

**، * and ns: significant difference at the probability level of 0.01 and 0.05 and non-significance, respectively.
Plant height: PLH, number of tillers: NT, number of fertile tillers: NFT, peduncle length: PL, spike length: SL, number of spikelets: NS and number of seeds per spike: NGS

ادامه جدول ۳- مقایسه میانگین لاین‌های امیدبخش گندم به روش دانکن از نظر صفات مورد ارزیابی در آزمایش
Continuated of Table 3. Mean comparison of the promising wheat lines by Duncan method in terms of evaluated traits in the experiment

*نوت‌پ	GWS	R	GWP	R	TPW	R	DHE	R	DMA	R	TKW	R	YLD	R
Genotype														
G1	1.48 ^{bc}	19	1.74 ^{cde}	22	6.55 ^{bcd}	12	136 ^{bcd}	15	179.3 ^{bc}	11	39 ^{bc}	12	6.07 ^b	4
G2	1.53 ^{bc}	10	2.43 ^{bcd}	8	6.6 ^{bde}	10	133 ^{cde}	21	184 ^{abc}	4	36.3 ^{bc}	19	5.84 ^b	11
G3	0.87 ^e	23	1.31 ^d	23	3.8 ^e	23	154.6 ^a	1	192.3a	1	30.6 ^c	23	4.29 ^c	23
G4	1.9 ^{bc}	5	2.41 ^{bcd}	9	6.9 ^{bcd}	7	135.3 ^{cde}	17	177.6 ^b	18	41 ^b	5	5.54 ^{bc}	17
G5	1.5 ^{bc}	18	2.32 ^{bcd}	11	6.8 ^{bcd}	8	140 ^{bcd}	7	179.3 ^{bc}	12	38 ^{bc}	17	5.25 ^{bc}	19
G6	1.53 ^{bc}	11	2.26 ^{bcd}	13	6.16 ^{bde}	15	131.6 ^{de}	22	179.3 ^{bc}	13	36.4 ^{bc}	18	5.3 ^{bc}	18
G7	1.82 ^{bc}	6	2.79 ^b	5	7.43 ^{bc}	4	139.6 ^{bcd}	8	179.6 ^b	7	40.4 ^b	8	5.95 ^b	9
G8	1.38 ^{bc}	21	2.21 ^{bcd}	15	7.5 ^{be}	3	135 ^{cde}	18	177.3 ^{bc}	21	38.3 ^{bc}	16	5.69 ^{bc}	13
G9	1.43 ^{bc}	20	2.37 ^{bcd}	10	7.02 ^{bcd}	6	140 ^{bcd}	6	179.3 ^{bc}	14	38.5 ^{bc}	15	5.97 ^b	8
G10	1.93 ^{bc}	4	3.16 ^{ab}	2	7.38 ^{bcd}	5	139 ^{bcd}	9	175 ^c	22	38.7 ^{bc}	14	6.41 ^b	2
G11	1.53 ^{bc}	12	2.29 ^{bcd}	12	6.12 ^{bcd}	16	137 ^{bcd}	12	179 ^{bc}	16	40.6 ^b	7	5.85 ^b	10
G12	1.51 ^{bc}	13	2.89 ^b	4	6.5 ^{bde}	13	136.6 ^{bcd}	13	175.3 ^{bc}	20	39.5 ^{bc}	11	6.02 ^b	6
G13	2 ^b	3	3.01 ^{abc}	3	7.77 ^b	2	135.6 ^{cde}	16	178.3 ^{bc}	17	43.4 ^b	3	6.03 ^b	5
G14	1.71 ^{bc}	7	2.52 ^{bcd}	7	6.4 ^{bde}	14	137.3 ^{bcd}	10	180.6 ^b	6	36 ^{bc}	20	5.68 ^{bc}	14
G15	1.5 ^{bc}	16	2.23 ^{bcd}	14	6.6 ^{bde}	11	137.3 ^{bcd}	11	184 ^{abc}	5	44.5 ^b	2	6.16 ^b	3
G16	1.5 ^{bc}	7	1.9 ^{bcd}	21	5.26 ^{bcd}	20	133.6 ^{cde}	20	185.6 ^{ab}	2	40.9 ^b	6	5.61 ^{bc}	16
G17	3.15 ^a	1	4.12 ^a	1	12.13 ^a	1	127.6 ^b	23	166 ^d	23	58.4 ^a	1	7.7 ^a	1
G18	2.33 ^{ab}	2	1.93 ^{bcd}	20	6.12 ^{bcd}	17	141 ^{bcd}	5	179.6 ^{bc}	8	41.1 ^b	4	4.96 ^{bc}	22
G19	1.31 ^{bc}	22	2.11 ^{bcd}	17	4.6 ^{cde}	21	135 ^{cde}	19	179.3 ^{bc}	15	40.4 ^b	9	5.79 ^{bc}	12
G20	1.61 ^{bc}	8	2.16 ^{bcd}	16	6.75 ^{bcd}	9	136.3 ^{bcd}	14	177.3 ^{bc}	19	35 ^{bc}	22	5.2 ^b	20
G21	1.61 ^{bc}	9	2.67 ^{bcd}	6	5.8 ^{bde}	18	145.3 ^b	2	184.6 ^{ab}	3	35.9 ^{bc}	21	6.01 ^b	7
G22	1.5 ^{bc}	14	2 ^{bcd}	18	5.7 ^{bde}	19	142.6 ^{bcd}	3	179.6 ^{bc}	9	39 ^{bc}	13	5.16 ^{bc}	21
G23	1.5 ^{bc}	15	1.98 ^{bcd}	19	4.5 ^{de}	22	141 ^{bcd}	4	179.6 ^{bc}	10	39.8 ^{bc}	10	5.65 ^{bc}	15

** و *** به ترتیب اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۰/۰۱ و ۰/۰۵ و عدم معنی‌داری.

وزن دانه در سنبله: GWS، وزن دانه در کل بوته: DMA، روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی: TPW، وزن هزار دانه: TKW و عملکرد دانه: YLD.

**، * and ns: significant difference at the probability level of 0.01 and 0.05 and non-significance, respectively.
Seed weight per spike: GWS, seed weight per whole plant: GWP, whole plant weight: TPW, days to spike: DHE, days to physiological maturity: DMA, thousand seed weight: TKW and grain yield: YLD

صفات به جز صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، طول پدانکل و طول سنبله دارای ضرایب مثبت بوده و از میان صفات با تأثیر مثبت بر روی این مولفه، صفت تعداد دانه در سنبله بیشترین تأثیر را دارد. مولفه چهارم نیز دارای ضرایب مثبت از نظر صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول پدانکل، تعداد سنبله، وزن دانه در سنبله، وزن دانه در کل بوته و وزن کل بوته بود که از میان این صفات، صفت تعداد پنجه بیشترین تأثیر را بر روی این مولفه داشت (جدول ۵).


بر اساس نمودار مقدار بردار ویژه نیز ۵ مولفه اول بیشترین واریانس داده‌ها را توجیه نمودند (شکل ۲). نمودار پراکنش لاین‌ها از نظر مولفه اول و دوم که در مجموع بیش از ۴۶ درصد از واریانس داده‌ها را توجیه می‌نمود، لاین‌ها را به چهار گروه، گروه‌بندی نمود. گروه اول شامل لاین‌های G15، G16، G17، G18، G19، G4، G21، G22، G23، G6، G20 و G13، G5، G9 و G11، G8 و G10 و گروه چهارم شامل لاین‌های G4، G7، G12 و G13 بود که لاین‌های موجود در گروه چهارم به عنوان لاین‌های مطلوب از نظر این دو مولفه شناسایی شدند (شکل ۳).

صفت وزن هزار دانه با تمام صفات به جز تعداد پنجه و تعداد دانه در سنبله و صفت عملکرد دانه با تمام صفات به جز صفات تعداد پنجه، طول پدانکل و تعداد دانه در سنبله همبستگی مثبت و معنی‌داری داشتند (جدول ۴). نتایج تحقیق با نتایج طهماسبی و همکاران (۱۶) برای بیشتر صفات منطبق بود.

براساس نقشه همبستگی رسم شده بین صفات که میزان شدت همبستگی را براساس رنگ (رنگ قرمز بیشترین میزان همبستگی تا رنگ سفید عدم همبستگی) نمایش می‌دهد، بیشترین میزان همبستگی بین صفت وزن کل بوته با صفات وزن دانه در سنبله و وزن دانه در کل بوته، صفت وزن دانه در کل بوته با صفت وزن دانه در سنبله، صفت عملکرد دانه با صفت وزن هزار دانه و صفت تعداد پنجه بارور با صفت تعداد پنجه بود (شکل ۱).

تجزیه به مولفه‌های اصلی

بر اساس تجزیه به مولفه‌های اصلی انجام گرفته، ۵ مولفه اول بیش از ۷۵ درصد از واریانس کل داده‌ها را توجیه نمودند. مولفه اول دارای ضرایب مثبت برای تمامی صفات مورد ارزیابی را دارا بود و از میان این صفات، صفات وزن کل بوته، وزن هزار دانه و وزن دانه در کل بوته بیشترین تأثیر را بر روی این مولفه دارا بودند. مولفه دوم دارای ضرایب مثبت برای سنبله، تعداد پنجه و گروه چهارم مثبت از نظر صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول سنبله، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله و وزن دانه در کل بوته و وزن کل بوته دارای ضرایب مثبت بود و از نظر صفات ارتفاع سنبله، وزن دانه در سنبله، وزن دانه در کل بوته و وزن کل بوته دارای ضرایب منفی بود. مولفه سوم نیز از نظر تمامی

Correlation maps:

شکل ۱- شدت میزان همبستگی بین صفات مورد ارزیابی در آزمایش

Figure 1. Intensity of the correlation between the evaluated traits in the experiment

جدول ۴- ضرایب همبستگی بین صفات مورد ارزیابی در آزمایش

Table 4. Correlation coefficients between the evaluated traits in the experiment

	PLH	NT	NFT	PL	SL	NS	NGS	GWS	GWP	TPW	DHE	DMA	TKW
NT	0.13												
NFT	0.24*	0.44**											
PL	0.5**	0.24*	0.39**										
SL	0.35**	0.03	0.31**	0.25*									
NS	0.05	0.027	0.15	-0.004	0.35**								
NGS	-0.06	-0.04	-0.08	-0.07	0.006	0.17							
GWS	0.35**	-0.01	0.08	0.25*	0.3*	0.32**	0.37*						
GWP	0.33**	0.17	0.3*	0.14	0.24*	0.39**	0.39**	0.71**					
TPW	0.34**	0.21*	0.43**	0.34**	0.41**	0.31**	0.3*	0.64**	0.75**				
DHE	-0.001	-0.2	-0.02	-0.01	-0.15	-0.17	0.11	-0.02	0.02	-0.02			
DMA	0.01	-0.01	0.3*	0.15	-0.14	-0.14	0.03	-0.12	-0.04	-0.01	0.73**		
TKW	0.27*	0.19	0.48**	0.34**	0.31**	0.25*	0.18	0.45**	0.45**	0.57**	0.3*	0.3*	
YLD	0.29*	0.12	0.48**	0.21	0.38**	0.2*	0.22	0.32**	0.47**	0.47**	0.36*	0.3*	0.67**

**، * و ns به ترتیب اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۰/۰۱ و ۰/۰۵ و عدم معنی‌داری.

ارتفاع بوته: PLH، تعداد پنجه: NT، طول پدانکل: NFT، طول پدانکل: PL، طول چاروور: GWP، عدد دانه در سنبله: GWS، وزن دانه در سنبله: NS، تعداد سنبله: SL، عملکرد دانه: DMA، روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی: DHE، روز تا متسله‌دهی: TPW، وزن هزار دانه: TKW، گردنده: YLD.

** و ns: significant difference at the probability level of 0.01 and 0.05 and non-significance, respectively.
Plant height: PLH, number of tillers: NT, number of fertile tillers: NFT, peduncle length: PL, spike length: SL, number of spikes: NS, number of seeds per spike: NGS, seed weight per spike: GWS, seed weight per plant : GWP, total plant weight: TPW, days to physiological maturity: DMA, thousand seed weight: TKW, grain yield: YLD

خطی که از مبدأ گذشته و روی محور میانگین محیطها عمود شده است (این خط با دو علامت پیکان در شکل مشخص شده است) جهت تعیین پایداری ارقام استفاده می‌شود.

لاینهایی که نزدیک به این خط می‌باشند از نظر صفات مورد ارزیابی از پایداری بیشتری برخوردار هستند. بر این اساس لاینهای G4، G6، G1، G20، G3، G5 و G2 مشخص شده است. این خط محور ارزیابی از پایداری بیشتری برخوردار بودند. به طور کلی لاینهایی که نزدیک مبدأ قرار دارند از پایداری بیشتری برخوردار بوده به عبارتی به تغییر محیط واکنش زیادی نشان نمی‌دهند. یک لاین ایده‌آل باید اولاً دارای عملکرد بالایی باشد و ثانیاً از پایداری بیشتری برخوردار باشد به عبارتی نزدیک به انتهای مثبت محور میانگین محیطها باشد. بر این اساس می‌توان لاین G4 را شناسایی نمود.

نمودار چندوجهی

نمودار چند وجهی (شکل ۵) جهت تعیین بهترین لاین برای هر منطقه استفاده می‌شود. این شکل از وصل کردن

تجزیه گرافیکی نمودار رتبه‌بندی لاینهای

جهت بررسی و تفسیر تنوع لاینهای، محیطها و مطالعه اثر مقابل لاین و مکان از تجزیه گرافیکی استفاده شد. در نمودار بایپلات محور افقی (PC1) معرف اثر اصلی ژنتیک و محیط عمودی (PC2) نشان‌دهنده اثر متقابل ژنتیک و محیط می‌باشد که خود معیاری از نایپایداری ژنتیک‌ها را نشان می‌دهد (۱۹). از مبدأ مختصات خطی به میانگین مکان‌ها وصل می‌شود (محل میانگین مکان‌ها با دایره نقطه چین مشخص شده است)، این خط محور میانگین مکان‌ها نام دارد. ارقامی که در ابتدای مثبت این محور قرار دارند دارای عملکرد بیشتری هستند و بالعکس. بر این اساس لاین G15 و G17 نسبت به سایر لاینهای از عملکرد مطلوب‌تری از نظر صفات برخوردار بودند همچنین لاینهای G6 و G23 نسبت به سایر لاینهای از مطلوب‌بیت پایینی برخوردار بودند. بنابراین بر اساس شکل ۴، ترتیب لاینهای از نظر صفات مورد ارزیابی در آزمایش به صورت زیر می‌باشد:


G15>G17>G13>G7>G14>G12>G19>G18>
G4>G11>G10>G6>G8>G9>G20>G1>G3>
G5>G21>G22>G2>G23>G6.

ر تیه بندی لاین ها بر اساس ژنو تیپ ایده آل


شکل ۶ رتبه‌بندی لاین‌ها را براساس بهترین لاین نشان می‌دهد. بدین منظور از مبدأ مختصات خطی به نقطه میانگین‌ها وصل می‌شود و به طرفین ادامه می‌یابد. بهترین لاین، ژنتیکی است که متمایل به انتهای مثبت این محور باشد و فاصله عمود آن از این خط کمترین مقدار باشد. در این شکل بهترین نقطه مرکز دوایر هم مرکز می‌باشد که با علامت پیکان مشخص شده است. سایر لاین‌ها بر اساس این نقطه گروه‌بندی می‌شوند. نمودار لاین ایده‌آل بر اساس تعیین فاصله از لاین ایده‌آل فرضی رسم می‌شود. این لاین ایده‌آل فرضی براساس پایدارترین و پرمحصول‌ترین لاین تعریف می‌گردد (۱۶). لاینی که فاصله کمتری داشته باشد ژنتوپ بهتری می‌باشد. بر اساس این نمودار لاین‌های G15 و G17 به عنوان برترین لاین‌ها و لاین‌های G23 و G6 به عنوان نامطلوب‌ترین لاین‌ها شناسایی شدند. ترتیب رتبه لاین‌ها از مطلوب‌ترین تا نامطلوب‌ترین به شرح زیر است:

G15>G17>G7>G14>G19>G18>G13>G12>G4>G16>G11>G20>G9>G8>G3>G1>G5>G10>G21>G22>G2>G6>G23.

ژنتیپهای حاصل می‌شود که بیشترین فاصله از مبدأ را دارند بطوری که سایر ژنتیپها داخل این چند وجهی قرار دارند. از مبدأ روی هر ضلع چند وجهی خطی عمود می‌شود تا شکل به چند قسمت تقسیم شود. در این شکل ارقامی که در یک بخش با یک محیط خاص قرار داشته باشند در آن محیط عملکرد خوبی داشته‌اند. بر این اساس لاینهای G17، G15، G18، G10 و G13 بیشترین فاصله را از مبدأ نمودار داشته و در راس چندوجهی قرار گرفته و به عنوان لاینهای مطلوب انتخاب شدن. در هر بخش نیز لاینهای G15 و G17 از نظر صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد پنجه، لاینهای G18 و G19 از نظر صفات روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی و وزن دانه در سنبله، لاینهای G21 و G22 از نظر صفت ارتفاع بوته، لاینهای G10 از نظر صفت طول سنبله از مطلوبیت بالایی برخوردار بودند. محققین مختلف در آزمایشات خود بر روی بررسی عملکرد و اجزای عملکرد و همچنین بررسی اثر مقابل ژنتیپ و صفت در گیاهان مختلف از این نوع نمودار استفاده نمودند که از آن جمله گندم (۸) و ذرت (۱۲ و ۱۳) را می‌توان اشاره داشت.



شکل ۲- نمودار مقدار بردار ویژه برای صفات مورد مطالعه درآزمایش



شکل ۳- گروه‌بندی لاین‌های گندم براساس مولفه اول و دوم
Figure 3. Grouping of wheat lines based on the first and second components


جدول ۵- تجزیه به مولفه‌های اصلی

Table 5. Analysis of principal components


	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10	PC11	PC12	PC13	PC14
PLH	0.24	-0.03	-0.25	-0.53	0.14	-0.01	-0.14	0.59	0.09	-0.22	0.26	-0.22	-0.06	0.05
NT	0.13	-0.02	-0.4	0.52	0.35	-0.05	-0.02	0.38	-0.3	0.39	-0.02	0.1	-0.05	0.02
NFT	0.28	0.16	-0.36	0.34	-0.1	-0.01	0.03	-0.18	0.47	-0.28	0.23	0.13	0.23	0.3
PL	0.23	0.07	-0.38	-0.33	0.23	0.34	0.46	-0.24	-0.14	-0.05	-0.42	0.08	0.13	-0.06
SL	0.25	-0.17	-0.14	-0.19	-0.55	-0.36	0.29	0.05	0.08	0.5	0.06	0.08	0.15	-0.13
NS	0.19	-0.26	0.14	0.21	-0.47	0.68	0.04	0.29	-0.08	-0.07	-0.09	-0.06	-0.06	0.11
NGS	0.14	-0.05	0.49	0.16	0.28	-0.17	0.69	0.23	0.08	-0.14	0.12	-0.09	0.06	0.05
GWS	0.32	-0.21	0.25	-0.22	0.21	0.12	-0.14	-0.18	-0.12	0.16	0.29	0.61	-0.18	0.25
GWP	0.36	-0.14	0.22	0.08	0.2	0.03	-0.35	0.06	0.3	0.001	-0.25	0.06	0.49	-0.45
TPW	0.39	-0.11	0.06	0.04	0.13	-0.05	-0.1	-0.3	0.21	0.26	-0.18	-0.56	-0.45	0.17
DHE	0.05	0.56	0.27	-0.14	-0.03	0.03	-0.12	0.16	-0.09	0.31	-0.21	-0.08	0.34	0.49
DMA	0.07	0.6	0.04	0.03	-0.01	0.28	0.1	0.06	0.3	0.21	0.22	0.13	-0.35	-0.44
TKW	0.36	0.2	0.03	0.08	-0.09	-0.005	-0.05	-0.27	-0.57	-0.14	0.43	-0.3	0.2	-0.21
YLD	0.34	0.23	0.06	0.07	-0.23	-0.39	-0.07	0.13	-0.18	-0.4	-0.43	0.27	-0.34	-0.44
Eigenvalue	4.51	2.16	1.77	1.13	1.02	0.61	0.59	0.52	0.45	0.38	0.28	0.25	0.14	0.12
Relative	0.32	0.15	0.12	0.08	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.008
Cumulative	0.32	0.47	0.6	0.68	0.75	0.8	0.84	0.88	0.91	0.94	0.96	0.98	0.99	1

ارتفاق بوت: PLH، تعداد پنجه بارور: NT، تعداد پنجه: NFT، طول بدانکل: SL، تعداد سنبله: GWS، وزن دانه در سنبله: DMA، وزن دانه در کل بوت: GWP، وزن کل بوت: TPW، روز ت رسیدگی فیزیولوژیکی: DHE، روز هزار دانه: TKW، عملکرد دانه: YLD

Plant height: PLH, number of tillers: NT, number of fertile tillers: NFT, peduncle length: PL, spike length: SL, number of seeds per spike: NS, seed weight per spike: GWS, seed weight per plant: GWP, total plant weight: TPW, days to spike: DHE, days to physiological maturity: DMA, thousand seed weight: TKW, grain yield: YLD




شکل ۴- نمودار رتبه‌بندی کلی لاین‌های گندم بر اساس صفات مورد ارزیابی در آزمایش
Figure 4. General ranking diagram of wheat lines based on the evaluated traits



شکل ۵- نمودار چندوجهی و انتخاب لاین‌های گندم مطلوب از نظر صفات مورد بررسی در آزمایش

Figure 5. Multidimensional diagram and selection of optimal wheat lines in terms of studied traits in the experiment
 ارتفاع بوته: PLH, تعداد پنجه: YLD, تعداد پنجه بارور: NT, طول پدانکل: DMA, عدد سنبله: SL, عدد دانه در سنبله: GWS, وزن دانه در سنبله: GWP, وزن کل بوته: TPW, وزن تا سنبله‌دهی: DHE, روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی: DMA, وزن هزار دانه: PLH, وزن هزار دانه: DMA, عملکرد دانه: YLD

Plant height: PLH, Number of tillers: NT, Number of fertile tillers: NFT, Peduncle length: PL, Spike length: SL, Number of spikelets: NS, Number of grain per spike: NGS, Grain weight per spike: GWS, total grain weight per plant : GWP, Total plant weight: TPW, Day to spike: DHE, Day to physiological maturity: DMA, 1000-kernel weight: DMA, and Grain yield: YLD




شکل ۶- نمودار رتبه‌بندی لاین‌های گندم بر اساس لاین ایده‌آل از نظر صفات مورد ارزیابی در آزمایش

Figure 6. Ranking diagram of wheat lines based on ideal line in terms of evaluated traits in the experiment
 ارتفاع بوته: PLH, تعداد پنجه: YLD, تعداد پنجه بارور: NT, طول پدانکل: DMA, عدد سنبله: SL, عدد دانه در سنبله: GWS, وزن دانه در سنبله: GWP, وزن کل بوته: TPW, وزن تا سنبله‌دهی: DHE, روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی: DMA, وزن هزار دانه: PLH, وزن هزار دانه: DMA, عملکرد دانه: YLD

Plant height: PLH, Number of tillers: NT, Number of fertile tillers: NFT, Peduncle length: PL, Spike length: SL, Number of spikelets: NS, Number of grain per spike: NGS, Grain weight per spike: GWS, total grain weight per plant : GWP, Total plant weight: TPW, Day to spike: DHE, Day to physiological maturity: DMA, 1000-kernel weight: DMA, and Grain yield: YLD

روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی، وزن دانه در سنبله، روز تا سنبله‌دهی، طول پدانکل و ارتفاع بوته نیز همیستگی مثبتی را با هم نمایش دادند. صفات تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، تعداد سنبله‌چه، وزن دانه در کل بوته و وزن کل بوته نیز باهم همیستگی مثبتی داشتند. صفت تعداد پنجه بارور با صفات تعداد پنجه، عملکرد دانه و وزن هزار دانه و از طرف دیگر با صفات وزن کل بوته، وزن دانه در کل بوته و تعداد سنبله‌چه دارای همیستگی مثبت بود. زاویه بین دو بردار دو صفت تعداد پنجه بارور با روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی و همچنین زاویه بین دو بردار دو صفت طول پدانکل با تعداد پنجه ۹۰ درجه را نمایش داد که نشان‌دهنده میزان همیستگی صفر بین این صفات بود. صفات روز تا سنبله‌دهی و طول پدانکل نیز با صفت تعداد سنبله‌چه همیستگ، منفی، نشان دادند.

نمودار همبستگی بین صفات اندازه‌گیری شده به منظور بررسی همبستگی صفات مورد بررسی از تجزیه گرافیکی همبستگی بین صفات استفاده شد (شکل ۷). در این نمودار بای پلات کسینوس زاویه بین بردارهای صفات، نشانگر شدت همبستگی بین صفات می‌باشد. اگر زاویه بین بردارها کمتر از ۹۰ درجه باشد، همبستگی موجود بین بردارها برابر با +۱، در صورتیکه زاویه بین بردارهای صفات ۹۰ درجه باشد، همبستگی موجود بین بردارهای صفات برابر با صفر و در صورتیکه زاویه بین بردارها ۱۸۰ درجه باشد نشان دهنده همبستگی -۱ - خواهد بود (۱۸). بر این اساس صفات تعداد پنجه، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی و وزن دانه در سنبله با توجه به زاویه بین بردارشان دارای همبستگی مثبت با هم بودند. همچنین صفات



PC1 - 27.95%

شکل ۷- نمودار همبستگی بین صفات مورد ارزیابی در آزمایش

Figure 7. Correlation diagram between the evaluated traits in the experiment

ارتفاع بوته: PLH، تعداد پنجه بارور: NT، طول پانکل: PL، طول سنبله: SL، تعداد سنبله: NS، تعداد دانه در سنبله: NGS، وزن دانه در سنبله: GWS، وزن کل بوته: GWP، وزن کل بوته: TPW، روز تا سنبله دهی: DHE، روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی: YLD، من: هزار، عماکر: TKW، دانه: DMA

Plant height: PLH, Number of tillers: NT, Number of fertile tillers: NFT, Peduncle length: PL, Spike length: SL, Number of spikelets: NS, Number of grain per spike: NGS, Grain weight per spike: GWS, total grain weight per plant : GWP, Total plant weight: TPW, Day to spike: DHE, Day to physiological maturity: DMA, 1000-kernel weight: TKW and Grain yield: YLD.

صفات مختلف واکنش یکسانی را نمایش داده بودند. لاین‌های G5، G6 و G7 نیز در گروه چهارم جای گرفتند. گروه پنجم نیز شامل لاین‌های G11، G13، G8، G7، G12 و G9 بود که لاین G11 به همراه لاین G4 نیز گنجینه ایجاد شد (شکل ۸).


نحوه سیم را سیل
نتیجه گیری کلم

معرفی لاین‌های برتر از نظر عملکرد و سایر صفات زراعی مطلوب و سازگار با شرایط محیطی اقلیم مربوطه، می‌تواند

گروه‌بندی لاین‌ها از نظر صفات مورد ارزیابی
بر اساس نمودار گروه‌بندی لاین‌ها، لاین‌های مورد بررسی
به ۶ گروه از نظر تمامی صفات مورد ارزیابی گروه‌بندی شدند.
مولفه اول ۳۲/۰۴ درصد و مولفه دوم ۱۹/۵۸ درصد و در
مجموع ۵۱/۶۲ درصد از واریانس کل داده‌ها توجیه شد. گروه
اول شامل لاین‌های G16، G14، G15، G19، G17 بود. دو
لاین G18 و G3 در گروه دوم قرار گرفتند. گروه سوم شامل
لاین‌های G22، G23، G21، G1 و G20 بود که از نظر

اینکه کاربرد تجزیه به مولفه‌های اصلی کاهش داده‌های مورد مطالعه و استفاده از صفات دارای کاربرد بیشتر بر روی صفت عملکرد دانه می‌باشد، با ارزیابی ضرایب مثبت صفات موثر بر روی صفت عملکرد دانه می‌توان مولفه اول را به عنوان "مشخصات عملکرد دانه"، مولفه دوم را به عنوان "مشخصات زمانی تا رسیدگی گیاه"، مولفه سوم را به عنوان "مشخصات بوته"، مولفه چهارم را به عنوان "مشخصات پنجه" و مولفه پنجم را به عنوان "مشخصات وزنی گیاه" نامگذاری نمود. به طور کلی می‌توان لاین‌های G15، G17 و G13 را به عنوان لاین‌هایی مطلوب از نظر صفات زراعی مختلف ارزیابی شده، معرفی نمود. می‌توان از این لاین‌ها در برنامه‌های اصلاحی برای افزایش عملکرد گندم استفاده نمود.

باعث افزایش تولید گندم در واحد سطح و به موجب آن افزایش تولید در سطح کلان و بالا رفتن ضریب امنیت غذایی کشور و همچنین افزایش درآمد کشاورزان شود. برای گزینش آخرين لاین‌های اميدبخش گندم برتر از نظر عملکرد و سایر صفات زراعي كه برنامه‌های بهتره متعدي را گذرانده بودند و همچنین بررسی روابط حاكم بین عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌ها از روش‌های آماري چند متغیره در اين پژوهش استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که براساس مقاييسه ميانگين لاین‌ها، لاین‌های G17 و G13 به عنوان لاین‌های با رتبه برتر شناسايي شدند. تجزيه همبستگي نيز همبستگي بسياري از صفات را با صفت عملکرد دانه نمايش داد و براساس تجزيه به مولفه‌های اصلی نيز، ۵ مولفه اول بيش از ۷۵ درصد از واريанс كل داده‌ها را توجيه مي‌نمایند. با توجه به



PC1 - 32.04%

شکل ۸- گروه‌بندی لاین‌های گندم از نظر صفات مورد ارزیابی در آزمایش

Figure 8. Grouping of wheat lines in terms of evaluated traits in the experiment

ارتفاع بوته: PLH، تعداد پنجه: NT، تعداد پنجه بارور: NFT، طول پدانکل: PL، عدد سنبلاچه: NS، تعداد دانه در سنبله: NGS، وزن دانه در سنبله: GWS، وزن کل بوته: GWP، وزن کل بوته: TPW، روز تا سنبلاهدی: DHE، روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی: YLD، وزن هزار دانه: DMA، وزن هزار دانه: TKW.

Plant height: PLH, Number of tillers: NT, Number of fertile tillers: NFT, Peduncle length: PL, Spike length: SL, Number of spikelets: NS, Number of grain per spike: NGS, Grain weight per spike: GWS, total grain weight per plant : GWP, Total plant weight: TPW, Day to spike: DHE, Day to physiological maturity: DMA, 1000-kernel weight: TKW and Grain yield: YLD

منابع

1. Aharizad, S., M. Sabzi, S.A. Mohammadi and E. Khodadadi. 2012. Multivariate analysis of genetic diversity in wheat (*Triticum aestivum* L.) recombinant inbred lines using agronomic traits. *Annals of Biological Research*, 3: 2118-2126.
2. Dehghani, H., H. Omidi and N. Sabaghnia. 2008. Graphic analysis of trait relations of rapeseed using the biplot method. *Agronomy Journal*, 100(5): 1443-1449.
3. FAO. 2020. FAOSTAT. Food and agricultural commodities production. Available at <http://www.fao.org/faostat/en/#home>. FAO, Rome, Italy.
4. Flister, L. and V. Galushko. 2016. The impact of wheat market liberalization on the seed industry's innovative capacity: an assessment of Brazil's experience. *Agricultural and Food Economics*, 4(1): 11.
5. Ghafari, M. 2004. Use of principal component analysis method for selection of superior three-way cross hybrids in sunflower. *Seed and Plant Journal*, 19(4): 513-527 (In Persian).
6. Khodarahmi, M., H. Soughi, J. Jafarby, M.S. Khavarinejad and H. Khanzadeh. 2021. Stability analysis of bread wheat genotypes by using GGE biplot method in Caspian sea regions. *Journal of Crop Breeding*, 13(40): 83-90 (In Persian).
7. Nematzadeh, G.H. and G.h. Kiyani. 2010. *Plant Breeding; Classical Methods*. First volume. Mazandaran University Press. 153 pp (In Persian).
8. Omrani, A., S. Omrani, M. Khodarahmi, S.H. Shojaei, Á. Illés, C. Bojtor, S.M.N. Mousavi and J. Nagy. 2022. Evaluation of grain yield stability in some selected wheat genotypes using AMMI and GGE biplot methods. *Agronomy*, 12(5): 1130.
9. Poehlman, J.M. 2013. *Breeding field crops*: Springer Science & Business Media, USA, 723 pp.
10. Qaseem, M.F., R. Qureshi, N. Illyas and S.G. Jalal-Ud-Din. 2017. Multivariate statistical analysis for yield and yield components in bread wheat planted under rainfed conditions. *Pakistan Journal of Botany*, 49(6): 2445-2450.
11. Reif, J.C., P. Zhang, S. Dreisigacker, M.L. Warburton, M. van Ginkel, D. Hoisington, M. Bohn and A.E. Melchinger. 2005. Wheat genetic diversity trends during domestication and breeding. *Theoretical and Applied Genetics*, 110(5): 859-864.
12. Shojaei, S.H., K. Mostafavi, M.R. Bihamta, A. Omrani, S.M.N. Mousavi, Á Illés, C. Bojtor and J. Nagy. 2022. Stability on maize hybrids based on GGE biplot graphical technique. *Agronomy*, 12(2): 394.
13. Shojaei, S.H., K. Mostafavi, A. Omrani, Á. Illés, C. Bojtor, S. Omrani, S.M.N. Mousavi and J. Nagy. 2022. Comparison of maize genotypes using drought-tolerance indices and graphical analysis under normal and humidity stress conditions. *Plants*, 11(7): 942.
14. Singh, B.D. 2015. *Plant Breeding: Principles and Methods*: Kalyani Publishers, India.
15. Singh, R.P. and R. Trethowan. 2007. Breeding spring bread wheat for irrigated and rainfed production systems of the developing world. *Breeding Major Food Staples*, 109-140 pp.
16. Tahmasebi, G., J. Heydarnezhadian and A.P. Aboughadareh. 2013. Evaluation of yield and yield components in some of promising wheat lines. *International Journal of Agriculture and Crop Sciences*, 5(20): 2379-2384.
17. Vahabzadeh, M., G. Aminzadeh, M. Ghasemi, M. Kalateh, J. Jaafabai, S. Khavarinejad, M. Abedi Parikhian, H. Fallah, A. Tarinejad, A. Abroudi, A. Saidi, G. Yahyaie, B. Pirayeshfar, A. Nourinia, K. Nazari, F. Afshari, M. Torabi, M. Serajazari, M. Dehghan and M. Ahmadian Moghaddam. 2008. Moghan 3, A new bread wheat cultivar for warm humid climate of Khazar, Iran. *Seed and Plant Journal*, 24(4): 767-771 (In Persian).
18. Yan, W. and M.S. Kang. 2003. *GGE Biplot Analysis: A graphical Tool for Breeders, Geneticists, and Agronomist*. CRC press. Boca Raton, FL
19. Yan, W. 2001. GGEbiplot-a windows application for graphical analysis of multi-environment trial data and other types of two-way data. *Agronomy Journal*, 93: 1111-1118.

Evaluation of Yield and Yield Components in Promising Wheat Lines using Multivariate Statistical Methods

Amir Kabiri¹, Faezeh Zafarian², Ali Omrani³ and Arasto Abbasian⁴

1 and 4- Respectively, A master's Student and an Assistant Professor of the Department of Agriculture, Faculty of Agricultural Sciences, Sari University of Agriculture and Natural Resources, Sari, Iran

2- Associate Professor, Department of Agriculture, Faculty of Agricultural Sciences, Sari University of Agriculture and Natural Resources, Sari, Iran, (Corresponding author: fa.zafarian@sanru.ac.ir)

3- Research Assistant Professor, Agricultural and Horticultural Science Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Ardabil Province (Moghan), Agricultural Research, Education and Extension Organization, Moghan, Iran

Received: 19 June, 2022 Accepted: 17 August, 2022

Extended Abstract

Introduction and Objective: Wheat (*Triticum aestivum* L.) is the most important crop and staple food of three quarters of the world's population. Therefore, the study of genetic diversity of this strategic plant helps breeders to identify the genetic potential and capacity of traits related to breeding goals, including yield and yield components. Knowing the differences between different wheat genotypes and how these differences relate to their potential yield is crucial in improving the yield of new cultivars.

Material and Methods: In order to achieve the desired wheat genotypes, study of genetic diversity of yield, yield components and interaction of genotype \times treat of 21 promising wheat lines in terms of 14 important agronomic traits in a randomized complete block design (RCBD) in three replications with important commercials cultivars of the region (Tirgan and Kalateh) as controls, was performed. The experiment was planted in the Agricultural Research Station of the Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (Moghan). Among the existing methods for evaluating diversity, multivariate analysis is one of the most important and widely used methods.

Results: The results of analysis of variance at the probability level of 0.01 and 0.05 indicated that the studied wheat lines had significant differences in all traits except the number of grains per spike. Comparison of the mean performed by Duncan method also showed that G17 and G15 lines were selected as desirable lines in terms of all measured traits; while, G3 and G19 lines also had the lowest rank in this analysis. The results of correlation analysis also showed that the grain yield had a positive and significant correlation with all the evaluated traits except the number of tillers, peduncle length and number of grains per spike. Based on the principal component analysis performed on the experimental data, the first 5 components explained more than 75% of the variance of the data. According to the grouping diagram of the lines in terms of the first and second components, the lines were grouped into four groups. Based on the graphical analysis of the line ranking chart, the promising wheat lines G15 and G17 had better performance in the evaluated traits than the other studied lines, and the G4 line in terms of stability in the traits, as stable line, was selected. The multidimensional diagram also identified G15, G17, G18, G23, G6, G10 and G12 lines as desirable genotypes, and in terms of line ranking diagram based on the ideal line, G15 and G17 lines were also identified as the top ranking line.

Conclusion: Lines with high yield potential and other desirable agronomic traits identified in this study can be used to create superior populations and compatible with the characteristics of hot and humid zone in the north of the country.

Keywords: Correlation analysis, Grain yield, Graphic analysis, Principal component analysis