

"Research Paper"

Evaluation of Genetic Diversity and Zinc Deficiency Stress Tolerance in Spring Wheat Cultivars

Nasrin Valipour¹, Hadi Alipour² and Reza Darvishzadeh³

1- M.Sc. Graduated Student Urmia University, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia

2- Associate Professor Urmia University, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, (Corresponding author: ha.alipour@urmia.ac.ir)

3- Professor Urmia University, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia

Received: 4 June, 2023

Accepted: 15 October, 2023

Extended Abstract

Introduction and Objective: Like other crops, wheat also faces several environmental limitations during its growth period, such as the lack of micronutrients. Zinc deficiency causes limitations in crop production, especially growth, and yield in calcareous soils. Considering the economic and agricultural importance of wheat in the world and Iran, it is necessary to pay attention to and identify genetic relationships, to know the level of genetic diversity, and estimate it in wheat germplasm by plant breeders. The present research was conducted with the aim of identifying genetic diversity and investigating stress tolerance indicators on phenological, physiological, and biochemical traits in desirable spring wheat cultivars under optimal conditions and zinc deficiency stress.

Material and Methods: Sixty-four spring wheat cultivars under both optimal conditions and zinc deficiency stress, a simple lattice design was performed in 2019-2020 in the research farm of the Faculty of Agriculture, Urmia University. In this research, phenological traits including the number of days to germination, number of days to booting, number of days to pollination, number of days to physiological maturity, grain filling period, and physiological and biochemical characteristics including canopy temperature, total chlorophyll, leaf area index, fresh weight and dry weight, relative water content, grain protein concentration, zinc concentration in shoot and grain yield were measured.

Results: The results of the analysis of variance revealed a significant difference among the cultivars in both optimal conditions and zinc deficiency stress in most of the studied traits. positive and significant correlations of Y_s and Y_p with MP, GMP, STI, and HM indices showed that these indices are the most suitable indices for screening cultivars under zinc deficiency stress conditions.

Conclusion: Generally, based on studied traits, tolerance indices, the results of principal components analysis, and cluster analysis, Aflak, Darya, Arvand, Roshan, Kavir, and Sirvand were selected as desirable cultivars and VEE/NAC, Tajan, Parsi, and Panjamo were identified as undesirable and susceptible cultivars. The selected tolerant and susceptible cultivars can be used for developing biparental populations, gene expression analysis, and breeding programs to produce cultivars with high yield.

Keywords: Physiological and biochemical traits, Tolerance indices, Wheat, Zinc

**"مقاله پژوهشی"****ارزیابی تنوع ژنتیکی و تحمل تنش کمبود روی در ارقام گندم بهاره**نسرین ولی پور^۱، هادی علی پور^۲ و رضا درویش زاده^۳

۱- کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

۲- دانشیار دانشگاه ارومیه، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، (نویسنده مسؤل: ha.alipour@urmia.ac.ir)

۳- استاد دانشگاه ارومیه، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۳/۱۴ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۷/۲۳

صفحه: ۱ تا ۱۳

چکیده مبسوط

مقدمه و هدف: گندم مانند سایر محصولات زراعی در طول دوره رشد خود با محدودیت‌های زیست محیطی متعددی مانند کمبود عناصر ریزمغذی مواجه است. کمبود روی باعث ایجاد محدودیت در تولید محصول به‌ویژه رشد و عملکرد در خاک‌های آهکی می‌شود. با توجه به اهمیت اقتصادی و کشاورزی گندم در جهان و ایران، توجه و شناسایی روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ‌ها، شناخت میزان تنوع ژنتیکی و برآورد آن در ژرم پلاسما گندم توسط اصلاح‌کنندگان گیاه ضروری است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی تنوع ژنتیکی و بررسی شاخص‌های تحمل به تنش بر صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام مطلوب گندم بهاره تحت شرایط نرمال و تنش کمبود روی انجام شد.

مواد و روش‌ها: ۶۴ رقم گندم بهاره در دو شرایط نرمال و تنش کمبود روی آزمایشی به‌صورت طرح لاتیس ساده در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ انجام شد. صفاتی همچون روز تا جوانه‌زنی، روز تا سنبله‌دهی، روز تا گرده‌افشانی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و طول پر شدن دانه، دمای کانوپی، کلروفیل کل، شاخص سطح برگ، وزن تر و خشک، محتوای نسبی آب، غلظت پروتئین، غلظت روی اندام هوایی و عملکرد دانه اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در هر دو شرایط نرمال و تنش کمبود روی برای اکثر صفات مورد بررسی تفاوت آماری معنی‌داری بین ارقام وجود دارد. همبستگی‌های مثبت و معنی‌دار بین عملکرد در شرایط نرمال و تنش با شاخص‌های MP، GMP، STI و HM مشاهده شد که این شاخص‌ها مناسب‌ترین شاخص‌ها برای غربال کردن ارقام در شرایط تنش کمبود روی شناسایی شدند.

نتیجه‌گیری: به‌طور کلی براساس صفات مورد مطالعه، شاخص‌های تحمل و نتایج تجزیه به عامل و تجزیه خوشه‌ای ارقام افلاک، دریا، ارون، روشن، کویر و سیروند به‌عنوان ارقام مطلوب و متحمل و ویناک، تجن، پارس و پنجامو به‌عنوان ارقام نامطلوب و حساس معرفی شدند. از ارقام متحمل و حساس شناسایی شده می‌توان در ایجاد جمعیت‌های دووالدی، بررسی بیان ژن و برنامه‌های به‌نژادی جهت تولید ارقامی با عملکرد بالا استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: تحمل تنش، روی، شاخص‌های صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی، گندم

مقدمه

گندم (*Triticum aestivum* L.) مهم‌ترین محصول زراعی در جهان و از سازگارترین گونه‌های غلات است (Bavandpour et al., 2022; Ebadzadeh et al., 2017) که غذای بیش از ۳۵ درصد از جمعیت جهان را تامین می‌کند (Amiri and Assad, 2005). سازگاری گندم با شرایط آب و هوایی مختلف، خاک، تنوع محصولات و کیفیت انباری گندم، باعث شده تا دانه این گیاه جزو غذای اصلی بیش از یک سوم مردم جهان باشد (Arzani, 2006). همانند سایر گیاهان زراعی، گندم نیز در طول دوره رشد خود با محدودیت‌های محیطی متعددی همچون کمبود عناصر کم‌مصرف مواجه می‌شود (Abdoli and Esfandiari, 2014).

کمبود روی باعث ایجاد محدودیت در تولید محصولات زراعی به‌ویژه رشد و عملکرد در خاک‌های آهکی می‌شود (Alloway, 2009; Cakmak et al., 2010). در گزارشی مک‌کاولی و همکاران (McCauley et al., 2009) افزایش عملکرد دانه و زیست توده را در نتیجه‌ی استفاده از روی بیان کردند. روی یک ماده مغذی مهم برای رشد و نمو انسان است و کمبود آن در مواد غذایی باعث عقب‌ماندگی رشد، اختلال در سیستم عصبی، ایمنی، کوتاهی قد کودکان، افزایش ابتلا به بیماری‌های عفونی، اختلالات پوستی، کاهش باروری در زنان و افزایش مرگ و میر در جوامع انسانی شود (White and Broadley, 2009).

اخیراً روش‌های به‌نژادی مختلفی در رابطه با کاربرد کودهای مناسب برای افزایش کیفیت و کمیت محصولات انجام شده است. به‌عنوان مثال در مطالعه‌ای بر روی ارقام گندم نان استفاده از محلول‌های غذایی حاوی عناصر ماکرو باعث بهبود کیفیت عملکرد دانه و زیست‌توده در خاک‌های با کمبود روی شد (Pataco et al., 2017). در پژوهشی دیگر بر روی گندم در خاک‌های آهکی و استفاده از محلول‌پاشی سولفات روی باعث بهبود کمی و کیفی عملکرد گندم در خاک‌های دارای کمبود روی گردید (Abdoli et al., 2016). در یک مطالعه مروری به این نتیجه رسیدند که استفاده بهینه از کودهای حاوی روی در هر دو شرایط مزرعه و گلخانه، برای گیاهان زراعی از جمله گندم بسیار حائز اهمیت می‌باشد (Cakmak and Kutman, 2018).

با توجه به اهمیت اقتصادی و زراعی گندم در جهان و ایران، توجه و شناسایی روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ‌ها، آگاهی از سطح تنوع ژنتیکی و برآورد آن در ژرم‌پلاسما گندم توسط به‌نژادگران گیاهی ضروریست. تنوع از تکامل طبیعی ناشی شده و جز نیازهای مهم به‌نژادی است. دامنه تنوع ژنتیکی در ارقام در حال کشت گندم به دلیل کاربرد پایه‌های ژنتیکی محدود و افزایش تمایل به کشت خالص رو به کاهش می‌باشد. همچنین تنوع موجود در ارقام بومی نیز به دلیل کاهش جمعیت رو به نابودی است. بهره‌برداری از تنوع موجود در یک ژرم‌پلاسما منجر به شناسایی والدین مناسب، استفاده از این تنوع در جهت

و از این رو به عنوان مناسب ترین شاخص ها جهت غربال گری معرفی شدند (Sangi et al., 2020). تحقیق حاضر با هدف شناسایی تنوع ژنتیکی و بررسی شاخص های تحمل به تنش در صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام مطلوب گندم بهاره تحت شرایط نرمال و تنش کمبود روی انجام شد.

مواد و روش ها

در پژوهش حاضر تعداد ۶۴ رقم گندم بهاره (جدول تکمیلی ۱) در قالب طرح لاتیس ساده تحت شرایط نرمال و تنش کمبود روی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه واقع در منطقه نازلو با طول جغرافیایی ۴۵ درجه و ۴ ثانیه و عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۳۲ ثانیه و ارتفاع ۱۳۲۰ متر از سطح دریا مورد بررسی قرار گرفتند. کشت به صورت گلدانی بوده و خاک رس و ماسه با نسبت (۲:۱) ترکیب شد تا روی خاک به کمترین میزان خودش برسد. در نهایت بعد از آزمایش خاک میزان روی خاک ۰/۳۵ میلی گرم بر کیلوگرم شد. کوددهی و تأمین عناصر ریز مغذی به صورت محلول هوکلند انجام گرفت. کشت بذور و کنترل علف هرز به صورت دستی انجام شد. با توجه به اینکه گیاهان در مراحل اولیه رشد قدرت کمی دارند و همچنین جهت جلوگیری از سوختگی ناشی از تجمع مواد غذایی و شوری خاک، مواد مغذی براساس نیاز گیاه و به تدریج به خاک اضافه گردید تا قابل جذب بوده و تأمین کننده نیاز گیاه باشد و همچنین از شور شدن خاک جلوگیری شود. محلول هوکلند با نسبت های ۱/۱۶، ۱/۸، ۱/۴، ۱/۲، ۱، آماده شده که در شرایط نرمال میزان روی برای غلظت یک ۵۰، غلظت یک دوم ۲۵، غلظت یک چهارم ۱۲/۵، غلظت یک هشتم ۶/۲۵ و غلظت یک شانزدهم ۳/۱۲ میلی گرم بر لیتر و در شرایط تنش کمبود روی برای تمامی غلظت ها صفر در نظر گرفته شد. بعد از جوانه زنی، محلول هوکلند به میزان ۲۰۰ سی سی در هر دو شرایط نرمال و تنش کمبود روی به گلدان ها اضافه شد. همچنین آبیاری گلدان ها به صورت دستی و به میزان ۲۰۰ سی سی از آب شهری هر دو روز یکبار انجام شد. مراحل فنولوژیکی گیاه شامل تعداد روز تا جوانه زنی، تعداد روز تا سنبله دهی، تعداد روز تا گرده افشانی و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک در طی فصل رشد در هر گلدان براساس اینکه ۵۰ درصد نمونه ها در مرحله نموی مربوطه قابل مشاهده بودند، تعیین شد. علاوه بر صفات فنولوژیک صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی شامل دمای کانوبی، کلروفیل کل، شاخص سطح برگ، وزن تر و خشک، محتوای نسبی آب، غلظت پروتئین دانه، غلظت روی در اندام هوایی و در نهایت عملکرد دانه نیز مورد بررسی قرار گرفتند. سپس براساس عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش کمبود روی شاخص های تحمل مطابق فرمول های جدول ۱ محاسبه شدند.

بهبود خصوصیات زراعی و در نهایت تولید ارقام بهتر می شود (Mohammadi and Prasanna, 2003).

مطالعه ارقام در شرایط تنش یکی از روش های مهم به نژادگران برای بهبود عملکرد و تحمل تنش های محیطی است (Mohammadi and Abdulahi, 2017). برای تمایز ارقام متحمل به تنش از چندین شاخص تحمل در شرایط مختلف استفاده می شود. شاخص تحمل (TOL) به صورت اختلاف عملکرد دانه در شرایط تنش و نرمال و شاخص میانگین بهره روری (MP) تحت عنوان میانگین عملکرد ارقام در شرایط نرمال و تنش تعریف شده اند (Rosielle and Hamblin, 1981). برای اندازه گیری پایداری عملکرد شاخص حساسیت به تنش پیشنهاد شده است که میزان کمتر از یک این شاخص بیانگر تحمل به تنش است. به طوری که هرچه میزان عملکرد در حالت تنش به عملکرد در حالت نرمال نزدیک باشد نشانه حساسیت کمتر ارقام نسبت به تنش است (Fischer and Maurer, 1978). شاخص تحمل تنش (STI) برای شناسایی ارقامی که در هر دو شرایط تنش و نرمال عملکرد بالایی دارند، استفاده می شود. در حالی که انتخاب بر مبنای SSI یا همان شاخص حساسیت به تنش منجر به گزینش ارقام متحمل به تنش، اما با پتانسیل عملکرد پایین می شود. هرچقدر میزان SSI کمتر باشد نشانه تغییرات کم یک رقم در شرایط تنش نسبت به شرایط بدون تنش و در نهایت پایداری بیشتر آن رقم است (Rasoulzadeh Aghdam et al., 2021). برآورد دیگر مبتنی بر عملکرد برای مقاومت به تنش میانگین هندسی بهره روری (GMP) است که در مقایسه با شاخص میانگین بهره روری به منظور تفکیک ارقام قدرت بیشتری دارد (Fernandez, 1992).

در پژوهشی استفاده خارجی از سولفات روی در ژنوتیپ های گندم نشان داد که پاسخ ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم از بعد کمی عملکرد یکسان نمی باشد، اما استفاده به صورت خاکی و محلول پاشی توانست با افزایش روی دانه و کاهش اسیدفیتیک دانه بعد کیفی عملکرد را بهبود بخشد (Esfandiari and Abdoli, 2017). آزمایشی در رابطه با اثر میزان روی بر عملکرد دانه گندم دیم در فلات پاکستان اجرا شد. این آزمایش تحت شرایط کمبود روی و شرایط نرمال اجرا گردید و نشان داد که اعمال ۰/۵۲ - ۰/۴۹ میلی گرم در کیلوگرم روی در خاک باعث افزایش عملکرد دانه تا ۱۲ درصد شده است (Rafique et al., 2006). کامرانی و همکاران (Kamrani et al, 2016) در مطالعه ۵۰ رقم گندم در شرایط تنش و بدون تنش گزارش کردند که شاخص های MP، GMP، STI و HAM مناسب ترین شاخص ها برای غربال نمودن ارقام در شرایط تنش می باشند. در مطالعه ای که به منظور بررسی شاخص های تحمل به تنش که بر روی ۲۳ رقم گندم دوروم انجام گرفت، شاخص های MP، GMP، STI و HAM همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش داشتند

جدول ۱- شاخص‌های تحمل تنش

Table 1. Stress tolerance indices

ردیف Row	شاخص Indices	فرمول Formula	رفرنس Reference
1	شاخص حساسیت به تنش Stress susceptibility index	$SSI = (1 - (Y_s/Y_p)) / (1 - (\bar{Y}_p/\bar{Y}_s))$	(Fischer and Maurer, 1978)
2	شاخص میانگین هارمونیک Harmonic mean index	$HAM = 2 \times (Y_p \times Y_s) / (Y_p + Y_s)$	(Rosille and Hamblin, 1981)
3	شاخص تحمل Tolerance index	$TOL = Y_p - Y_s$	(Rosille and Hamblin, 1981)
4	شاخص میانگین هندسی بهره‌وری Geometric mean productivity index	$GMP = \sqrt{Y_p \times Y_s}$	(Fernandez, 1992)
5	شاخص میانگین بهره‌وری Mean productivity index	$MP = (Y_p + Y_s) / 2$	(Rosille and Hamblin, 1981)
6	شاخص تحمل غیرزیستی Abiotic tolerance index	$ATI = \left(\frac{Y_p - Y_s}{\bar{Y}_p} \right) \times \sqrt{Y_p \times Y_s}$	(Fischer and Maurer, 1978)
7	شاخص مقاوم به تنش Stress resistant index	$DI = (Y_s \times \frac{Y_s}{Y_p}) / \bar{Y}_s$	(Fischer and Maurer, 1998)
8	شاخص تحمل به تنش Stress tolerance index	$STI = (Y_p \times Y_s) / (\bar{Y}_p)^2$	(Fernandez, 1992)
9	شاخص اصلاح شده در شرایط بدون تنش Modified in non-stressed conditions index	$K1S, K1STI = Y_p^2 / \bar{Y}_p$	(Naderi et al., 2008)
10	شاخص اصلاح شده در شرایط تنش Modified in stressed conditions index	$K2STI = Y_s^2 / \bar{Y}_s$	(Naderi et al., 2008)

نرمال نسبت به شرایط تنش کمبود روی بود؛ در حالی که از نظر صفات تعداد روز تا جوانه‌زنی، تعداد روز تا سنبله‌دهی، تعداد روز تا گرده‌افشانی، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک این صفات در شرایط نرمال مقادیر کمتری نسبت به شرایط تنش کمبود روی داشتند. به‌طور کلی تنوع قابل ملاحظه‌ای بین ارقام مورد مطالعه از نظر عملکرد و صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی وجود داشت و می‌توان از این تنوع جهت انتخاب ارقام برتر به منظور به‌نژادی و بهبود خصوصیات ارقام در برنامه‌های اصلاحی استفاده نمود.

برای تعیین مطلوب‌ترین معیارهای تحمل تنش، ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش کمبود روی و شاخص‌های تحمل تنش محاسبه گردیدند (جدول ۵). نتایج به دست آمده نشان داد که در شرایط تنش کمبود روی (Y_s) عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد همبستگی مثبت و معنی‌دار با شاخص‌های MP ، GMP ، STI ، ATI ، DI ، HM ، $K1S$ ، $K1STI$ و $K2STI$ و همبستگی منفی و معنی‌دار با شاخص SSI داشته است. در شرایط نرمال بین عملکرد دانه با شاخص‌های MP ، TOL ، GMP ، STI ، ATI ، DI ، HM ، $K1S$ ، $K1STI$ و $K2STI$ همبستگی مثبت و معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد وجود داشت که نشان می‌دهد این شاخص‌ها در شناسایی ارقام با عملکرد بالا تحت شرایط نرمال موثر می‌باشند. عملکرد دانه در شرایط تنش کمبود روی (Y_s) با عملکرد دانه در شرایط نرمال (Y_p) همبستگی مثبت معنی‌دار داشت که نشان می‌دهد عملکرد بالا در شرایط نرمال منجر به عملکرد بیشتر در شرایط تنش می‌شود. این نتایج با گزارش‌های امیری و همکاران (Amiri et al., 2014) و فرشادفر و همکاران (Farshadfar et al., 2018) در گندم نان و پاتل و همکاران (Patel et al., 2019) در گندم دوروم مطابقت دارند.

در این روابط Y_p ، Y_s ، \bar{Y}_p و \bar{Y}_s به ترتیب عملکرد دانه در شرایط نرمال، عملکرد دانه در شرایط تنش کمبود روی، میانگین عملکرد دانه در شرایط نرمال و میانگین عملکرد دانه در شرایط تنش کمبود روی هستند.

پس از آزمون نرمال بودن توزیع خطاها، با توجه به اینکه سودمندی نسبی طرح لاتیس در مقایسه با طرح بلوک‌های کامل تصادفی برای صفات مورد بررسی کم بود، بنابراین تجزیه واریانس بصورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. تجزیه به‌عامل‌ها با استفاده از نرم افزار SAS ویرایش ۹٫۴، تجزیه خوشه‌ای و ترسیم نمودارهای بای‌پلات با استفاده از نرم‌افزار R ویرایش ۴٫۲٫۰ به ترتیب با استفاده از پکیج‌های $factoextra$ و $gplots$ انجام شد.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ۶۴ رقم گندم بهاره مورد بررسی به غیر از صفات دمای کانوپی، کلروفیل کل و محتوای نسبی آب در شرایط نرمال میزان روی و صفات دمای کانوپی، تعداد روز تا گرده‌افشانی و محتوای نسبی آب در شرایط تنش کمبود روی تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد (جدول ۲ و ۳).

نتایج حاصل از محاسبه پارامترهای آمار توصیفی (جدول ۴) نشان داد که صفات وزن تر، وزن خشک، غلظت روی در اندام هوایی، غلظت پروتئین و عملکرد دانه دارای بیشترین ضرایب تنوع در هر دو شرایط نرمال و تنش کمبود روی بودند. مقایسه میانگین صفات در شرایط نرمال و تنش کمبود روی حاکی از بالا بودن عملکرد دانه، غلظت پروتئین، غلظت روی در اندام هوایی، محتوای نسبی آب، وزن خشک، وزن تر، شاخص سطح برگ، کلروفیل کل و دمای کانوپی در شرایط

جدول ۲- تجزیه واریانس صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام گندم تحت شرایط نرمال
Table 2. Analysis of variance of phenological, physiological and biochemical traits in wheat cultivars under optimal conditions

میانگین مربعات Mean squares															
عملکرد دانه Grain yield	غلظت پروتئین دانه Grain protein concentration	غلظت روی اندام هوایی Shoot zinc concentration	محتوای نسبی آب Relative water content	وزن خشک Dry weight	وزن تر Fresh weight	شاخص سطح برگ leaf area index	کلروفیل کل Total chlorophyll	دمای کانوپی Canopy temperature	طول دوره پرشدن دانه Grain filling period	روز تا رسیدگی فیزیولوژیک Days to physiological maturity	روز تا گردهافشایی Days to pollination	روز تا سنبله‌دهی Days to booting	روز تا جوانه‌زنی Days to germination	درجه آزادی Df	منابع تغییرات S.O.V.
0.09	0.1	0.004	209.3	0.000006	0.0009	0.001	34.03	74.4	6.57	0.0007	7.03	11.28	59.1	1	تکرار Rep
1.14**	18.07**	0.06**	119.9 ^{ns}	0.0006**	0.01*	7.42**	81.1 ^{ns}	2.50 ^{ns}	11.53**	3.35**	9.77**	31.27**	23.6*	63	ژنوتیپ Genotype
0.12	1.2	0.02	102.1	0.0003	0.005	4.03	63.12	2.25	4.77	0.27	4.20	10.01	13.86	63	خطا Error
18.1	21.7	25.6	13.1	38.4	48.1	21.1	19.3	5.2	9.5	0.2	1.05	1.7	17.7	-	C.V

ns, *, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively.

ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively.

جدول ۳- تجزیه واریانس صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام گندم تحت شرایط تنش کمبود روی
Table 3. Analysis of variance of phenological, physiological and biochemical traits in wheat cultivars under Zinc deficiency stress conditions

میانگین مربعات Mean squares															
عملکرد دانه Grain yield	غلظت پروتئین دانه Grain protein concentration	غلظت روی اندام هوایی Shoot zinc concentration	محتوای نسبی آب Relative water content	وزن خشک Dry weight	وزن تر Fresh weight	شاخص سطح برگ leaf area index	کلروفیل کل Total chlorophyll	دمای کانوپی Canopy temperature	طول دوره پرشدن دانه Grain filling period	روز تا رسیدگی فیزیولوژیک Days to physiological maturity	روز تا گردهافشایی Days to pollination	روز تا سنبله‌دهی Days to booting	روز تا جوانه‌زنی Days to germination	درجه آزادی df	منابع تغییرات S.O.V.
0.01	0.7	0.04	3331.7	0.0004	0.0004	91.8	0.82	25.8	1.53	0.63	4.13	4.1	39.3	1	تکرار Rep
0.75*	0.06*	0.06*	132.6 ^{ns}	0.0007	0.01*	11.4*	93.8*	4.41 ^{ns}	10.4*	3.008	6.4 ^{ns}	15.4	24.2	63	ژنوتیپ Genotype
0.08	0.01	0.01	115.4	0.0003	0.005	7.43	33.4	3.12	5.83	0.6	5.5	4.5	13.97	63	خطا Error
22.2	16.6	33.4	14.4	45.6	51.1	27.2	14.6	6.4	10.7	0.3	1.2	1.1	17.7	-	C.V

ns, *, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively.

ns, *, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively.

جدول ۴- آماره‌های توصیفی، برای صفات مورد بررسی تحت شرایط نرمال و تنش کمبود روی در ارقام گندم

Table 4. Descriptive statistics of investigated traits under optimal and zinc deficiency stress conditions in wheat cultivars

صفات Trait	میانگین Mean		حداقل Min		حداکثر Max		دامنه تغییرات Range		واریانس Variance		ضریب تنوع C.V.		آزمون t T test
	نرمال	تنش	نرمال	تنش	نرمال	تنش	نرمال	تنش	نرمال	تنش	نرمال	تنش	
روز تا جوانه‌زنی Days to germination	21.08	20.9	13	15	29	28	16	12	11.8	12.1	17.7	17.7	-0.23 ^{ns}
روز تا سنبله‌دهی Days to booting	183.1	177.6	171	175.5	185	187	14	11	15.6	7.7	1.7	1.1	-9.24 ^{**}
روز تا گرده‌افشانی Days to pollination	194.4	194.01	190	190	198	197	7.5	7	4.88	3.21	1.05	1.2	-1.12 ^{ns}
روز تا رسیدگی فیزیولوژیک Days to physiological maturity	216.9	216.8	215	215	219	219	4	4	1.6	1.5	0.2	0.3	-0.42 ^{ns}
طول دوره پر شدن دانه Grain filling period	22.5	22.8	18	18.5	27	27	9.5	9	5.7	5.21	9.5	10.7	0.73 ^{ns}
دمای کانوپی Canopy temperature	27.4	28.6	26	25.3	31.6	33.2	5.4	7.9	1.2	2.20	5.2	6.4	5.17 ^{**}
کلروفیل کل Total chlorophyll	39.4	40.9	27.6	24.5	59.5	57.5	31.8	33	40.5	46.9	19.3	14.6	1.34 ^{ns}
شاخص سطح برگ Leaf area index	10	9.49	6.96	5.1	18.23	16.9	11.8	11.27	3.71	5.74	21.1	27.2	-1.30 ^{ns}
وزن تر Fresh weight	0.148	0.15	0.03	0.03	0.49	0.41	0.46	0.37	0.005	0.005	48.1	51.1	0.69 ^{ns}
وزن خشک Dry weight	0.043	0.04	0.01	0.01	0.1	0.1	0.08	0.09	0.0004	0.0003	38.4	45.6	0.55 ^{ns}
محتوای نسبی آب Relative water content	74.14	76.62	40.75	34.71	87.8	85.38	47.12	50.67	59.9	66.32	13.1	14.4	1.76 ^{ns}
غلظت روی اندام هوایی Shoot zinc concentration	0.39	0.56	0.09	0.02	1.08	0.87	0.99	0.85	0.03	0.03	25.6	33.4	5.21 ^{**}
غلظت پروتئین دانه Grain protein concentration	3.95	5.11	1.17	0.88	11.4	9.92	10.32	9.04	6.22	6.22	21.7	16.6	2.36 [*]
عملکرد دانه Grain yield	1.3	1.9	0.55	0.3	3.3	2.5	2.7	2.27	0.57	0.37	18.1	22.2	5.001 ^{**}

ns, *, ** به ترتیب غیرمعنی‌دار و معنی‌دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.

ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively.

جدول ۵- ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل تنش در ارقام گندم

Table 5. Correlation coefficients between grain yield and stress tolerance indices in wheat cultivars

K2STI	kiSTI,K1S	HM	DI	SSI	ATI	STI	GMP	MP	TOL	Ys	Yp		
											1	عملکرد در شرایط نرمال Yp	
											0.85 ^{**}	عملکرد در شرایط تنش Ys	
									1	0.08 ^{ns}	0.58 ^{**}	شاخص تحمل TOL	
								1	0.37 ^{**}	0.95 ^{**}	0.97 ^{**}	میانگین بهره‌وری MP	
							1	0.99 ^{**}	0.31 ^{**}	0.97 ^{**}	0.95 ^{**}	میانگین هندسی بهره‌وری GMP	
							0.98 ^{**}	0.97 ^{**}	0.26 [*]	0.96 ^{**}	0.92 ^{**}	شاخص تحمل تنش STI	
						1	0.60 ^{**}	0.63 ^{**}	0.67 ^{**}	0.89 ^{**}	0.44 ^{**}	0.82 ^{**}	شاخص تحمل غیرزیستی ATI
				1	0.38 ^{**}	-0.32 ^{**}	-0.31 ^{**}	0.26 [*]	0.71 ^{**}	-0.50 ^{**}	0.04 ^{ns}	0.04 ^{ns}	شاخص حساسیت به تنش SSI
			1	0.71 ^{**}	0.16 ^{ns}	0.86 ^{**}	0.85 ^{**}	0.82 ^{**}	-0.20 ^{ns}	0.95 ^{**}	0.66 ^{**}	0.66 ^{**}	شاخص مقاوم به تنش DI
		1	0.87 ^{**}	-0.35 ^{**}	0.59 ^{**}	0.98 ^{**}	0.99 ^{**}	0.99 ^{**}	0.26 [*]	0.98 ^{**}	0.93 ^{**}	0.93 ^{**}	میانگین هارمونیک HM
	1	0.91 ^{**}	0.64 ^{**}	-0.04 ^{ns}	0.84 ^{**}	0.93 ^{**}	0.93 ^{**}	0.95 ^{**}	0.58 ^{**}	0.83 ^{**}	0.98 ^{**}	0.98 ^{**}	شاخص اصلاح شده در شرایط نرمال kiSTI,K1S
1	0.81 ^{**}	0.95 ^{**}	0.95 ^{**}	-0.49 ^{**}	0.37 ^{**}	0.96 ^{**}	0.93 ^{**}	0.91 ^{**}	0.02 ^{ns}	0.97 ^{**}	0.80 ^{**}	0.80 ^{**}	شاخص اصلاح شده در شرایط تنش K2STI

ns, *, ** به ترتیب غیرمعنی‌دار و معنی‌دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.

ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively.

بود. با توجه به سهم بیشتر صفات فیزیولوژیک در عامل اول می‌توان این مؤلفه را عامل فیزیولوژیک نامید. عامل دوم در شرایط نرمال ۱۳/۶۷ درصد از کل تغییرات را توجیه نمود. عامل دوم شامل صفات تعداد روز تا سنبله‌دهی، تعداد روز تا گرده‌افشانی، طول دوره پر شدن دانه و غلظت پروتئین دانه با بار عاملی مثبت بودند که می‌توان این عامل را عامل دوره رشد نامید. عامل سوم صفت تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک با بار عاملی مثبت را شامل و ۹/۶۹ درصد از تنوع کل داده‌ها را توجیه نمود. عامل چهارم ۸/۱۹ درصد از تغییرات داده‌ها را توجیه نمود و صفات تعداد روز تا جوانه‌زنی، کلروفیل کل، محتوای نسبی آب و عملکرد دانه با بار عاملی مثبت در این عامل گروه‌بندی شدند. عامل پنجم که شامل صفت دمای کانوپی بود ۷/۰۳ درصد از تغییرات را توجیه نمود. تحت شرایط تنش کمبود روی، عامل اول ۲۹/۹ درصد از تنوع داده‌ها را توجیه نمود و صفات

نتایج تجزیه به عامل‌ها، چهارده صفت مورد بررسی در ۶۴ رقم گندم را تحت شرایط نرمال در پنج عامل و تحت شرایط تنش کمبود روی در شش عامل که مقادیر ویژه بالای یک داشتند، گروه‌بندی کرد. میزان واریانس هر عامل به‌صورت درصد بیان شد که نمایانگر اهمیت آن عامل در توجیه بخشی از تغییرات کل داده‌ها در نمونه‌های مورد مطالعه است. میزان اشتراک نیز بخشی از واریانس یک متغیر می‌باشد که به عامل‌های مشترک مربوط است. هرچه میزان آن بالا باشد نشان‌دهنده دقت بیشتر در برآورد واریانس متغیر مربوطه است (Jackson, 1991). عامل‌ها در شرایط نرمال و تنش کمبود روی به ترتیب ۷۱/۶۴ و ۷۴/۹ درصد از تغییرات کل داده‌ها را توجیه نمودند (جدول ۶ و ۷). تحت شرایط نرمال عامل اول با تبیین ۳۳/۰۴ درصد از تغییرات کل عمدتاً شامل صفات شاخص سطح برگ، وزن تر، وزن خشک و غلظت روی در اندام هوایی

صفات دلالت دارد. از این رو بیشترین همبستگی منفی بین صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه مشاهده شد. از آنجایی که وجود زاویه ۹۰ درجه بین بردار صفات نشان دهنده عدم همبستگی بین صفات است، لذا بین تعداد روز تا جوانه زنی، تعداد روز تا گرده افشانی، تعداد روز تا سنبله دهی و غلظت پروتئین دانه با عملکرد دانه همبستگی مشاهده نشد. از طرفی کمتر بودن زاویه بین بردار صفات نشان دهنده همبستگی مثبت بین صفات است. بنابراین بین دمای کانوپی، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و طول دوره پر شدن دانه با عملکرد دانه همبستگی مثبتی مشاهده شد. از این رو برای دستیابی به ارقامی با عملکرد بالا بایستی به دنبال ارقامی با مقادیر بالای صفات مذکور بود. براساس دو عامل اصلی در شرایط بهینه ارقام ریحانی، مروارید، مغان ۲، مارون، بهار، آرتا، البرز و شیراز (شکل ۱B) و در شرایط تنش کمبود روی ارقام اروند، ریحانی، شیراز، سیروند و قدس (شکل ۲B) که بالاترین مقادیر عامل اول و دوم و همچنین عملکرد دانه بیشتری داشتند، انتخاب شدند.

همبستگی مثبت بین عملکرد دانه با طول دوره پر شدن دانه نشان داد که در شرایط تنش بعد از گرده افشانی به علت کاهش شدید فتوسنتز گیاه انباشت مواد حاصل از این فرایند در دانه محدود می گردد. در شرایطی که به دلیل کاهش فتوسنتز در اثر فشار عوامل محیطی، سرعت و مقدار ماده خشک انباشته شده در دانه از فرایند مذکور نقصان یابد، سایر فرایندهای جبران کننده کمبود فتوسنتز یعنی حرکت و انتقال مجدد مواد از اندام های رویشی به دانه تحریک شده و تا حدودی وزن دانه جبران می گردد. در هر صورت سرعت انباشت مواد و دوره پر شدن دانه تعیین کننده وزن نهایی به عنوان یکی از اجزای عملکرد گندم بوده و هر دو خصوصیت تحت تاثیر ژنوتیپ و محیط قرار می گیرند (Dastur et al., 2013). به نظر می رسد ارقامی که تحمل بیشتری در مقابل تنش داشته باشند، چنانچه دوره پر شدن دانه طولانی تری داشته باشند زمان بیشتری برای ذخیره مواد غذایی جذب شده از ریشه و انتقال مواد فتوسنتزی به دانه های در حال رشد در اختیار دارند و می توانند عملکرد بیشتری را تولید نمایند. اما موضوع بدان معنا نیست که ارقامی با دوره پر شدن طولانی تر در شرایط نامساعد عملکرد مطلوبی خواهند داشت، زیرا می توان ارقامی را با ارزش یکسان از نظر صفات مورد بررسی پیدا نمود که از نظر عملکرد در شرایط نامساعد متفاوت باشند و این امر نشان می دهد که برای هر یک از صفات موثر در عملکرد در شرایط نامناسب، سایر صفات نیز بایستی مدنظر قرار گیرند. همچنین اثر متقابل بین صفات در تعیین تفاوت های موجود در محصول نهایی بیش از اثر هر یک از آن صفات به تنهایی موثر است. بنابراین اگرچه در شرایط بهینه سرعت پر شدن دانه با طول دوره پر شدن دانه طولانی تر ممکن است از نظر تئوری برآیند مطلوب تری داشته باشد اما با توجه به اهداف به نژادی و گزینش ارقام زودرس و متحمل به تنش سرعت بیشتر پر شدن دانه با توجه به شرایط محیطی یک مزیت تلقی می شود (Hossein-pour et al., 2006).

بررسی بای پلات مربوط به شاخص های تحمل و زوایای بین خطوط شاخص ها در هر دو شرایط (شکل ۳) نشان می دهد که در شرایط بهینه (Yp) بین عملکرد دانه و شاخص

شاخص سطح برگ، وزن تر و خشک در این عامل گروه بندی شدند. با توجه به سهم بیشتر صفات فیزیولوژیک در عامل اول می توان این عامل را عامل فیزیولوژیک نامید. عامل دوم ۱۶/۶۸ درصد از کل تغییرات را توجیه نمود و صفات تعداد روز تا گرده افشانی، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، طول دوره پر شدن دانه و غلظت پروتئین دانه بیشترین بار عاملی مثبت را در عامل دوم داشتند، به نحوی که می توان آن را عامل دوره رشد نامید. در عامل سوم، صفات تعداد روز تا جوانه زنی، تعداد روز تا سنبله دهی و عملکرد با بار عاملی مثبت گروه بندی شدند و ۸/۴۸ درصد از تنوع کل داده ها را توجیه نمودند. عامل چهارم، پنجم و ششم به ترتیب ۷/۴۵ و ۶/۹۳ و ۶/۴۴ درصد از تغییرات داده ها را توجیه نمودند که شامل صفات غلظت روی در اندام هوایی، دمای کانوپی، محتوای نسبی آب و کلروفیل کل بود.

در نتیجه تجزیه به عامل ها براساس شاخص های تحمل تنش، دو عامل اول و دوم در مجموع ۹۶/۷۵ درصد از تغییرات مربوط به عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش کمبود روی و شاخص های تحمل را توجیه نمودند (جدول ۸). به طوری که سهم عامل اول در تبیین تغییرات کل داده ها ۷۲/۰۳ درصد بود. این عامل همبستگی مثبتی با عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش کمبود روی و شاخص های DI، MP، GMP، HMP، STI، kiSTI، K1S، K2STI داشت و از این رو می توان عامل اول را عامل پتانسیل عملکرد و تحمل به تنش در نظر گرفت. عامل دوم ۲۴/۷۲ درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه نمود. در این عامل شاخص های SSI، TOL و ATI سهم بیشتری داشتند. همچنین این عامل همبستگی مثبت و بالایی با شاخص های TOL و SSI نشان داد و بنابراین می توان این عامل را عامل حساسیت به تنش نامید. انتخاب ارقامی با مقادیر بالای عامل اول و مقادیر کم عامل دوم منجر به شناسایی ارقام مناسب برای هر دو شرایط نرمال و تنش کمبود روی می شود (Shahryari and Mollasadeghi, 2011). بدین ترتیب صفات موثر در هر عامل شناسایی و عوامل نیز براساس موثرترین صفات نامگذاری شدند. این روش بهبود ژنتیکی عوامل را به واسطه صفات مرتبط با آن ها امکان پذیر می سازد (Tadesse and Bekele, 2001). با توجه به اهمیت هر کدام از این عوامل که به صورت درصد تغییرات بیان می شود توجه به نژادگران به ویژگی هایی که در حوزه عامل اول قرار دارند تاثیر جدی تری بر افزایش عملکرد گیاه خواهد داشت، زیرا ضرایب بزرگ و مثبت صفات در این عامل نشان دهنده ارتباط قوی و مثبت بین آن ها در شرایط تنش کمبود روی بوده و حاکی از آن است که گزینش براساس افزایش عامل اول منجر به افزایش عملکرد در ارقام خواهد شد.

نمایش برداری بای پلات در شرایط نرمال و تنش کمبود روی (اشکال ۱A و ۲A) نشان داد که بیشترین تنوع توجیه شده ناشی از تعداد روز تا سنبله دهی، طول دوره پر شدن دانه، وزن تر و شاخص سطح برگ بود. تحت شرایط نرمال همبستگی منفی بین صفات وزن تر، وزن خشک، شاخص سطح برگ، کلروفیل کل، غلظت روی در اندام هوایی و محتوای نسبی آب با عملکرد دانه مشاهده شد (شکل ۱A). به طور کلی زاویه بیشتر بین بردارهای صفات، بر همبستگی منفی بیشتر

شرایط نرمال و تنش کمبود روی و همچنین شاخص‌های تحمل مورد بررسی ارقام دریا، اروند، سیروند، روشن، کویر و افلاک بهترین ارقام با پتانسیل عملکرد مطلوب در هر دو شرایط بودند. در حالی که ویناک، تجن، پارسی و پنجامو حساس‌ترین ارقام بودند. این نتیجه با تحقیقات بسیاری از محققان مطابقت داشت (Hossein-pour et al., 2006; Ahmadi et al., 1992; Barma et al., 2005). بنابراین با توجه به مثبت بودن همبستگی عملکرد دانه با طول دوره پرشدن دانه می‌توان ارقامی رو انتخاب کرد که با وجود داشتن طول دوره پر شدن دانه بیشتر و همچنین با در نظر داشتن سایر صفات مورد بررسی عملکرد بالایی نیز دارند از جمله این ارقام می‌توان افلاک، سیروند، دریا، اروند، روشن را نام برد.

kiSTI, K1S و در شرایط تنش (Ys) از بین عملکرد دانه و شاخص K2STI همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود دارد که نشان می‌دهد این شاخص‌ها برای انتخاب ارقام به ترتیب در شرایط بهینه و تنش کمبود روی مفید هستند. شاخص‌های MP, GMP, STI و HM با عملکرد دانه در هر دو شرایط بهینه و تنش کمبود روی همبستگی مثبت نشان دادند و بهترین شاخص‌های مورد مطالعه بودند. در ضمن بر طبق نمودار بای‌پلات همبستگی منفی بین شاخص SSI با DI مشاهده شد. نمودار پراکنش ارقام براساس دو مولفه اصلی بر مبنای شاخص‌های تحمل بررسی و ارقام افلاک، دریا، گهار، مغان ۳ و سیروند با بالاترین مقدار از لحاظ دو مولفه انتخاب شدند (شکل ۳B). با توجه به رابطه مؤلفه‌ها و بای‌پلات‌های مربوطه در

جدول ۶- نتایج تجزیه به عامل‌های صفات مورد مطالعه در ارقام گندم تحت شرایط نرمال

Table 6. Factor analysis of investigated traits in wheat cultivars under optimal conditions

ضرایب عامل‌های مشترک Coefficients of the common factor						صفات Traits
میزان اشتراک Communality	عامل پنجم Factor5	عامل چهارم Factor4	عامل سوم Factor3	عامل دوم Factor2	عامل اول Factor1	
0.642	-0.275	-0.541	0.126	0.390	0.320	روز تا جوانه‌زنی Days to germination
0.671	0.114	0.016	0.274	0.658	0.388	روز تا سنبله‌دهی Days to booting
0.836	0.150	0.061	0.159	0.755	0.484	روز تا گرده‌افشانی Days to pollination
0.751	0.324	-0.057	0.772	0.181	-0.123	روز تا رسیدگی فیزیولوژیک Days to physiological maturity
0.925	0.037	-0.087	-0.563	-0.597	-0.493	طول دوره پر شدن دانه Grain filling period
0.630	0.745	-0.089	-0.234	-0.078	-0.083	دمای کانوپی Canopy temperature
0.622	0.099	0.574	0.016	-0.066	0.528	کلروفیل کل Total chlorophyll
0.900	0.014	-0.153	0.107	-0.186	0.911	شاخص سطح برگ Leaf area index
0.935	0.004	0.057	0.118	-0.247	0.926	وزن تر Fresh weight
0.871	0.026	0.025	0.099	-0.223	0.900	وزن خشک Dry weight
0.635	-0.436	0.491	0.449	0.060	0.008	محتوای نسبی آب Relative water content
0.426	-0.229	0.264	-0.387	0.047	0.390	غلظت روی اندام هوایی Shoot zinc concentration
0.432	0.042	0.041	0.258	0.598	0.069	غلظت پروتئین دانه Grain protein concentration
0.399	0.287	0.547	0.060	0.035	-0.113	عملکرد دانه Grain yield
-	1.125	1.311	1.551	2.188	5.287	مقادیر ویژه Eigen values
-	7.033	8.195	9.697	13.677	33.045	واریانس نسبی Relative variance
-	71.646	64.613	56.418	46.721	33.045	واریانس تجمعی Cumulative variance

جدول ۷- نتایج تجزیه به عامل‌های صفات مورد مطالعه در ارقام گندم تحت شرایط تنش کمبود روی

Table 7. Factor analysis of investigated traits in wheat cultivars under zinc deficiency stress conditions


ضرایب عامل‌های مشترک Coefficients of the common factor							صفات Traits
میزان اشتراک Communality	عامل ششم Factor6	عامل پنجم Factor5	عامل چهارم Factor4	عامل سوم Factor3	عامل دوم Factor2	عامل اول Factor1	
0.481	-0.290	-0.090	-0.204	-0.407	0.164	-0.392	روز تا جوانه‌زنی Days to germination
0.796	-0.023	-0.373	0.282	0.709	-0.287	-0.044	روز تا سنبله‌دهی Days to booting
0.753	-0.048	0.039	0.021	-0.159	-0.844	-0.106	روز تا گرده‌افشانی Days to pollination
0.534	-0.228	0.057	0.185	-0.049	0.491	-0.449	روز تا رسیدگی فیزیولوژیک Days to physiological maturity
0.912	-0.085	0.00	0.116	0.098	0.926	-0.158	طول دوره پر شدن دانه Grain filling period
0.603	0.419	0.543	-0.321	-0.051	-0.166	0.025	دمای کانوپی Canopy temperature
0.551	0.414	0.207	0.090	-0.033	0.410	0.400	کلروفیل کل Total chlorophyll
0.879	-0.022	-0.067	0.178	0.077	0.007	0.915	شاخص سطح برگ Leaf area index
0.883	-0.192	-0.026	0.155	-0.160	0.099	0.886	وزن تر Fresh weight
0.915	-0.114	-0.009	-0.065	-0.050	0.122	0.938	وزن خشک Dry weight
0.844	0.502	-0.597	-0.021	-0.354	0.045	0.329	محتوای نسبی آب Relative water content
0.926	0.304	0.338	0.838	0.002	-0.110	0.067	غلظت روی اندام هوایی Shoot zinc concentration
0.471	0.231	-0.159	-0.155	-0.060	0.570	-0.200	غلظت پروتئین دانه Grain protein concentration
0.646	0.145	0.156	-0.297	0.689	0.182	-0.068	عملکرد دانه Grain yield
-	1.030	1.110	1.193	1.357	2.509	4.788	مقادیر ویژه Eigen values
-	6.440	6.938	7.456	8.481	15.683	29.924	واریانس نسبی Relative variance
-	74.922	68.482	61.544	54.088	45.607	29.924	واریانس تجمعی Cumulative variance

جدول ۸- نتایج تجزیه به مؤلفه‌های اصلی برای شاخص‌های تحمل به تنش در ارقام گندم


Table 8. Principals components analysis for stress tolerance indices in wheat cultivars

میزان اشتراک Communality	عامل دوم Factor2	عامل اول Factor1	شاخص‌ها Indices
0.995	0.281	0.957	عملکرد در شرایط نرمال (Yp)
0.996	-0.256	0.965	عملکرد در شرایط تنش (Ys)
0.829	-0.890	0.193	شاخص حساسیت به تنش (SSI)
0.992	-0.071	0.994	شاخص میانگین هارمونیک (HAM)
0.992	0.928	0.361	شاخص تحمل (TOL)
0.994	-0.016	0.997	شاخص میانگین هندسی بهره‌وری (GMP)
0.996	0.045	0.997	شاخص میانگین تولید بهره‌وری (MP)
0.893	0.827	0.457	شاخص تحمل غیرزیستی (ATI)
0.990	-0.554	0.827	شاخص مقاوم به تنش (DI)
0.981	-0.057	0.989	شاخص تحمل تنش (STI)
0.984	0.283	0.951	شاخص اصلاح شده در شرایط بدون تنش (kiSTI, K1S)
0.968	-0.295	0.939	شاخص اصلاح شده در شرایط تنش (K2STI)
-	2.967	8.644	مقادیر ویژه Eigen values
-	24.721	72.032	واریانس نسبی Relative variance
-	96.753	72.032	واریانس تجمعی Cumulative variance


ارزیابی تنوع ژنتیکی و تحمل تنش کمبود روی در ارقام گندم بهاره ۱۰



شکل ۱- نمودار بای پلات (الف) صفات و (ب) پراکنش ۶۴ رقم زراعی گندم در شرایط نرمال
Figure 1. Biplot diagram of (A) traits and (B) distribution of 64 wheat cultivars under optimal conditions



شکل ۲- نمودار بای پلات (الف) صفات و (ب) پراکنش ۶۴ رقم زراعی گندم در شرایط تنش کمبود روی
Figure 2. Biplot diagram of (A) traits and (B) distribution of 64 wheat cultivars under zinc deficiency stress conditions



شکل ۳- نمودار بای پلات (الف) صفات عملکرد در شرایط نرمال و تنش کمبود روی و شاخص‌های تحمل تنش و (ب) پراکنش ۶۴ رقم زراعی گندم
Figure 3. Biplot diagram (A) yield under optimal and zinc deficiency stress conditions and stress tolerance indices and (B) distribution of 64 wheat cultivars


پنجامو، پارسی، چمران ۲، کریم، کوهدشت، DN11، مارون، بهار، آرتا، مهدوی، زاگرس و خزر و گروه دوم شامل چمران ۱، نیک نژاد، مغان ۱، بیات، نیشابور، ریحانی، سیوند، اینیا، مروارید، الوند، دیهیم، شانگهای، افق و فلات و گروه سوم شامل ارقام دریا، گهار، دستجردی، مغان ۲، پیشگام، مغان ۳، داراب ۲، سیروان، افلاک، کاوه، روشن، اروند، کویر، البرز، فونگ، ۴۸۲۰، بیستون، قدس، پشتاز، اکبری، هامون، شیراز، توباری، داراب ۱، عدل و ناز قرار گرفتند. ارقام گروه اول براساس تمام شاخص‌ها بیشترین مقدار را دارا بودند و ارقام موجود در این گروه مطلوب‌ترین ارقام از لحاظ شاخص‌های تحمل تنش بودند.

برطبق مطالعات نقوی و همکاران (Naghavi et al., 2014) ارقام دریا، کویر، روشن، مهدوی، سیستان عملکرد بالا و رقم پارسی عملکرد کمی داشتند. رجیبی و همکاران (Rajabi et al., 2005) نیز بالا بودن عملکرد ارقام کویر، روشن، اینیا را تایید کردند. براساس گزارش پوستینی و همکاران (Poustini et al., 2007) ارقام کویر، روشن، اینیا جز ارقام متحمل و شیراز، تجن و قدس به‌عنوان ارقام حساس شناسایی شدند. حلیم و همکاران (Halim et al., 2017) و حسین علی پور و همکاران (Hosseinalipour et al., 2019) در تحقیقی گزارش کردند رقم سیروان و روشن بیشترین و تجن و قدس کمترین عملکرد را به خود اختصاص دادند. در آزمایشی کریمی و رخزادی (Karimi and Rokhzadi, 2010) ارقام کویر و روشن متحمل، ارقام چمران و فلات حدواسط و ارقام شیراز، گلستان و تجن جز ارقام حساس شناسایی کردند که این گزارشات همگی با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشتند.

نتیجه‌گیری کلی

به‌طور کلی در بین ارقام مورد بررسی از نظر اکثر صفات تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود داشت که این خود نشان از وجود تنوع بالا در میان ارقام بهار برای اهداف اصلاحی است. در نهایت براساس صفات مهم، شاخص‌های تحمل و نتایج تجزیه به عامل‌ها و تجزیه خوشه‌ای ارقام افلاک، دریا، اروند، روشن، کویر و سیروند به‌عنوان مطلوب‌ترین ارقام و ویناک، تجن، پارسی و پنجامو به‌عنوان ارقام حساس معرفی شدند. بنابراین انتخاب ارقام متحمل به محیط‌های تحت تنش کمبود روی و استفاده در برنامه‌های به‌نژادی جهت تولید ارقامی با عملکرد بالا توصیه می‌شوند.

به‌منظور تعیین تنوع بین ارقام مختلف و تعیین قرابت ارقام و گروه‌بندی آن‌ها بر مبنای صفات مورد بررسی تجزیه خوشه‌ای به روش Ward انجام شد. با توجه به دندروگرام تجزیه خوشه‌ای در شرایط بهینه روی (شکل ۴A)، ارقام مورد بررسی در سه گروه طبقه‌بندی شدند. ارقام گروه اول شامل ناز، قابوس، دی ان ۱۱، کویر، داراب ۲، روشن، پشتاز، تجن، شیروودی، مهدوی، داراب ۱، ویناک، فوتانا، مغان ۳، الوند، دستجردی، بیات، اکبری، سیروند و گهار از لحاظ صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی و عملکرد دارای کمترین میزان بودند. ارقام گروه دوم شامل دریا، توباری، مروارید، ریحانی (ارقام دیررس) کمترین میزان صفات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد و بیشترین میزان صفات فنولوژیک را داشتند. ارقام طبقه‌بندی شده در گروه سوم شامل ۴۸۲۰، البرز، مغان ۲، چمران ۱، مارون، آرتا، بم، دز، نیشابور، سیوند، کوهدشت، شیراز، هامون و اینیا با وجود داشتن کمترین مقدار صفات فنولوژیک، دارای بالاترین میزان از نظر صفات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد بودند. براساس دندروگرام تجزیه خوشه‌ای در شرایط تنش کمبود روی (شکل ۴B)، ارقام در سه گروه طبقه‌بندی شدند که گروه اول شامل ویناک، پارسی، دیهیم، عدل، دی ان ۱۱، پنجامو، تجن، توباری، مغان ۱، گلستان، ناز، خزر، گهار، ریحانی، قدس، شیراز، پشتاز، داراب ۲، مغان ۳، زاگرس، اکبری، شانگهای، البرز، داراب ۱، بم، بیستون (ارقام دیررس) کمترین میزان را از لحاظ صفات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد و بالاترین میزان را از نظر صفات فنولوژیک دارا بودند. ارقام گروه دوم شامل کویر، بیات، مغان ۲، سیروان، روشن، مهدوی، افلاک، دریا، سیستان، اروند، سیوند، کوهدشت، فوتانا، دز، شیروودی، قابوس، سپاهان، اینیا، بیات دارای بالاترین میزان صفات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد و کمترین میزان صفات فنولوژیک و از ارقام زودرس بودند. گروه سوم شامل کاوه، هامون، فونگ، نیشابور، آرتا، پیشگام، نیک نژاد، افق، ۴۸۲۰، بهار، کریم، دستجردی، الوند، چمران ۲، اترک، فلات، مارون، چمران ۱ با داشتن متوسط میزان از نظر صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد بودند. نهایتاً ارقام مورد بررسی براساس شاخص‌های تنش به سه گروه تقسیم شدند (شکل ۴C) که گروه اول شامل ارقام بم، قابوس، فوتانا، شیروودی، تجن، ویناک، سپاهان، سیستان، اترک، مروودشت، دز، گلستان،



شکل ۴- دندروگرام تجزیه خوشه‌ای ارقام گندم تحت (الف) شرایط نرمال، (ب) تنش کمبود روی و (ج) شاخص‌های تحمل تنش
 Figure 4. Cluster analysis dendrogram in wheat cultivars under (A) optimal conditions, (B) zinc deficiency stress and (C) stress tolerance indices

منابع

- Abdoli, M., & Esfandiari, E. (2014). Effect of zinc foliar application on the quantitative and qualitative yield and seedlings growth characteristics of bread wheat (cv. Kohdasht). *Iranian Journal of Dryland Agriculture*, 3, 77-90 (In Persian).
- Abdoli, M., Esfandiari, E., Sadeghzadeh, B., & Mousavi, S.Á. (2016). Zinc application methods affect agronomy traits and grain micronutrients in bread and durum wheat under zinc-deficient calcareous soil. *Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences*, 26, 202-214 (In Persian).
- Ahmadi, A., Saeidi, M., & Jahansoz, M. (2005). Distribution patterns of photosynthesis and grain filling in bread wheat genotypes under stress and non-stress. *Journal of Agriculture and Natural Resources* 36, 1333-1343 (In Persian).
- Alloway, B.J. (2009). Soil factors associated with zinc deficiency in crops and humans. *Environmental Geochemistry and Health*, 31, 537-548.
- Amiri, F.R., & Aasad, M. (2005). Evaluation of three physiological traits for selecting drought resistant wheat genotypes. *Journal of Agricultural Science and Technology (JAST)*, 7, 81-87 (In Persian).
- Amiri, R., Bahraminejad, S., Sasani, S., & Ghobadi, M. (2014). Genetic evaluation of 80 irrigated bread wheat genotypes for drought tolerance indices. *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 20, 101-111 (In Persian).
- Arzani, A. (2006). *Crops breeding*, 2nd edition, Sharif University Publication Center. (In Persian).
- Barma, N.D., Amin, M.R., & Sarker, Z.I. (1992). Variability and association of grain yield with vegetative and grain filling period in spring wheat. *Annals of Bangladesh Agriculture*, 2, 63-66.
- Bavandpouri, F., Farshadfar, E., & Farshadfar, M. (2022). Investigation of genetic diversity of bread wheat accessions in terms of agronomic traits and SSR molecular markers. *Journal of Crop Breeding*, 14, 156-173 (In Persian).
- Cakmak, I., Pfeiffer, W.H. & McClafferty, B. (2010). Biofortification of durum wheat with zinc and iron. *Cereal Chemistry*, 87, 10-20.
- Cakmak, I., & Kutman, U.Á. (2018). Agronomic biofortification of cereals with zinc: a review. *European Journal of Soil Science*, 69, 172-180.

- Dastur, A.R., Asghari, R., & Shahbazi, H. (2013). In two conditions (Triticum aestivum L.), evaluation of yield and grain filling speed of wheat lines without stress and drought stress after pollination. *Journal of Agroecology*, 6, 561-570 (In Persian).
- Ebadzadeh, H., Ahmadi, K., Mohammadnia Afrouzi, S.H., Taghani, R.A., Abbasi, M., & Yari, S.H. (2017). *Agricultural Statistics*. Ministry of Agriculture-Jahad. 401 (In Persian).
- Esfandiari, E., & Abdoli, M. (2017). Improvement of agronomic and qualitative characters of durum wheat (*Triticum turgidum* L. var. durum) genotypes by application of zinc sulfate under zinc deficiency stress. *Journal of Crop Ecophysiology*, 3, 619-636 (In Persian).
- Farshadfar, E., Poursiahbidi, M.M., & Safavi, S.M. (2018). Assessment of drought tolerance in land races of bread wheat based on resistance/tolerance indices. *International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research*, 1, 143-158 (In Persian).
- Fernandez, G.C. (1992). Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In *Proceeding of the International Symposium on Adaptation of Vegetables and other Food Crops in Temperature and Water Stress*, Aug. 13-16, Shanhua, Taiwan, 1992 257-270.
- Fischer, R., & Maurer, R. (1978). Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. *Australian Journal of Agricultural Research*, 29, 897-912.
- Halim, G.H., Emam, Y., & Shakeri, E. (2017). Evaluation of yield, yield components and stress tolerance indices in bread wheat cultivars at post-anthesis irrigation cut-off. *Journal of Crop Production and Processing*, 4, 121-134 (In Persian).
- Hosseinalipour, B., Rahnama, A., & Farrokhan Firouzi, A. (2019). Effect of drought stress on wheat root growth and architecture at vegetative growth stage. *Iranian Journal of Field Crop Science*, 1, 63-75 (In Persian).
- Hosseinpour, T., Siadat, A., Mamghani, R., Fathee, G.h., & Rafiee, M. (2006). Study of rate and duration of grain filling of wheat genotypes under rainfed Koozdasht of Lorestan. *Journal of Agriculture and Natural Resources*, 13, 66-77 (In Persian).
- Jackson, J. E. (2005). *A user's guide to principal components*. John Wiley & Sons.
- Kamrani, M., Ebadi, A., & Mehreban, A. (2016). Evaluation of grain yield-based drought tolerance indices for screening durum wheat genotypes. *Jordan Journal of Agricultural Sciences*, 12, 649-665 (In Persian).
- Karimi, E., & Rokhzadi, A. (2010). An identification of drought tolerant genotypes in wheat using analysis of drought resistance indices. *Agronomy Journal*, 96, 78-83 (In Persian).
- McCauley, A., Jones, C., & Jacobsen, J. (2009). *Plant nutrient functions and deficiency and toxicity symptoms*. Nutrient management module, 9, 1-16.
- Mohammadi, S.A., & Prasanna, B.M. (2003). Analysis of genetic diversity in crop plants-salient statistical tools and considerations. *Crop Science*, 43, 1235-1248 (In Persian).
- Mohammadi, R., & Abdulahi, A. (2017). Evaluation of durum wheat genotypes based on drought tolerance indices under different levels of drought stress. *Journal of Agricultural Sciences, Belgrade*, 62, 1-14 (In Persian).
- Naderi, A., Magidi Heravan, A., Hashemi Dezfuli, A., Rezaei, A., & Noor Mohammadi, G. (2008). Envelopment analysis of indices for evaluating crop tolerance to environmental deficiencies and introduction of a new index. *Seed and plant Improvement Journal*, 15, 390-402 (In Persian).
- Naghavi, M.R., Moghaddam, M., Toorchi, M., & Shakiba, M.R. (2014). Evaluation of Spring Wheat Cultivars Based on Drought Resistance Indices. *Journal of Crop Breeding*, 17, 192-207 (In Persian).
- Pataco, I.M., Lidon, F.C., Ramos, I., Oliveira, K., Guerra, M., Pessoa, M.F., Carvalho, M.L., Ramalho, J.C., Leitão, A.E., Santos, J.P., & Ramos, P.S. (2017). Biofortification of durum wheat (*Triticum turgidum* L. ssp. durum (Desf.) Husnot) grains with nutrients. *Journal of Plant Interactions*, 12, 39-50.
- Patel, J., Patel, A., Patel, C., Mamrutha, H., Pradeep, S., & Pachchigar, K.P. (2019). Evaluation of selection indices in screening durum wheat genotypes combining drought tolerance and high yield potential. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 8, 1165-1178.
- Poustini, K., & Sio-Semardeh, A. (2004). Ion distribution in wheat cultivars in response to salinity stress. *Field Crops Research*, 85, 125-133.
- Poustini, K., Sio-Semardeh, A., & Ranjbar, M. (2007). Proline accumulation as a response to salt stress in 30 wheat (*Triticum aestivum* L.) cultivars differing in salt tolerance. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 54, 925-934.
- Rafique, E., Rashid, A., Ryan, J., & Bhatti, A.U. (2006). Zinc deficiency in rainfed wheat in Pakistan: magnitude, spatial variability, management, and plant analysis diagnostic norms. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 37, 181-197.
- Rasoulzadeh Aghdam, M., Darvishzadeh, R., Sepehr, E., & Alipour, H. (2021). Evaluation of phosphorus deficiency stress tolerance in oilseed sunflower pure lines (*Helianthus annuus* L.). *Applied Research in Field Crops*, 34, 120-139 (In Persian).
- Rajabi, R., Poustini, K., Jahanipour, P., & Ahmadi, A. (2005). Effects of salinity on yield and some physiological characteristics of 30 wheat varieties. *Journal of Agricultural Science*, 2, 153-163 (In Persian).
- Rosielle, A., & Hamblin, J. (1981). Theoretical aspects of selection for yield in stress and nonstress environment. *Crop Science*, 21, 943- 946.
- Sangi, S.A., Najafi, A., Cheghamirza, K., & Mohammadi, R. (2020). Evaluation of drought tolerance indices in durum wheat genotypes (*Lathyrus sativus* L.). *Environmental Stresses in Crop Sciences*, 14, 901-911 (In Persian).
- Shahryari, R., & Mollasadeghi, V. (2011). Introduction of two principle components for screening of wheat genotypes under end seasonal drought. *Advances in Environmental Biology*, 5, 519-523.
- Tadesse, W., & Bekele, E. (2001). Factor analysis of components of yield in grasspea (*Lathyrus sativus* L.). *Lathyrus Lathyrism Newsletter*, 2, 91-93.
- White, P.J., & Broadley, M.R. (2009). Biofortification of crops with seven mineral elements often lacking in human diets—iron, zinc, copper, calcium, magnesium, selenium and iodine. *New Phytologist*, 182, 49-84.