

Research Paper

Selection of Superior Tomato Lines using Multivariate Statistical Methods in the Jiroft Region

Seid Mohammad Alavi-Siney¹ and Mahyar Abedi²

1- Faculty Member, Crop and Horticultural Science Research Department, Southern Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Jiroft, Iran, (Corresponding author: m.alavis@areeo.ac.ir)

2- Researcher, Institute of Seed and Plant Improvement, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

Received: 22 October, 2024

Revised: 2 December, 2024

Accepted: 5 February, 2025

Extended Abstract

Background: Tomato (*Solanum lycopersicum* L.) is one of the most important crops in the world. The cultivated area of this plant in Iran is 103,000 hectares, and its production amount is more than 5 million tons, which indicates the importance of this plant. In plant breeding, different methods are used in genotype selection. To select the best genotypes, a method is needed that can consider all traits based on desirability and undesirability in selections. The ideal genotype selection index (SIIG) is one of the methods that can determine the distance between genotypes in addition to selecting ideal genotypes. In this method, it is possible to identify genotypes with special characteristics. For example, genotypes with high yield and early maturity can be identified and selected with the SIIG method. This study aimed to evaluate tomato genotypes through quantitative and qualitative traits and to select the best ones for climatic conditions in southern Kerman.

Methods: To evaluate and select the best tomato lines in the Jiroft region, an experiment with 11 genotypes (10 promising lines and the Karoon variety) based on a randomized complete blocks design with three replications was carried out in the research farm of the Southern Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center during two crop years (2021-2022 and 2022-2023). Cultivation was carried out under plastic on 20 February. Following drip irrigation, weeds were controlled by hand. During the growing season and after harvesting (May), qualitative traits, including uniformity, growth crack, green shoulders, type of inflorescence, and having an abscission layer, were recorded for each genotype. Brix, pH, tissue firmness, the number of locules, fruit length, fruit width, fruit weight, and the yield of each plant were measured in the laboratory. The days to flowering, days to ripening, and the number of inflorescences were also the traits recorded in each plot. Statistical analyses were performed using SAS software (9.4), and calculations related to the SIIG method were performed using the relevant matrices.

Results: A compound variance analysis during the two years of the experiment showed that the effect of the year was significant on all studied traits, except for the number of locules trait. This shows the different conditions during the two experimental years and the influence of the studied traits on the experimental conditions. The effect of the genotype and the interaction of the genotype in the year were significant on all studied traits, except for the number of inflorescences, showing the diversity between the tested genotypes in terms of the studied traits. The mean comparison results of genotype effect showed that lines 14 and 6-33 were able to reach maturity earlier due to early flowering. Genotypes 8 and 32 produced the highest fruit yield, and the lowest amount of this trait belonged to lines 33-6 and 22-7. Since the traits were compared separately, a mean comparison among the genotypes showed that it was not possible to select the best based on all traits. If the selection was based only on yield, they would be placed in the top group 2 lines 8 and 32. Grouping based on cluster analysis placed four lines (8, 7-22, 11, and the Karoon variety) in the top group. Grouping tomato lines based on the SIIG index placed six lines in the top group. The superiority of the SIIG method compared to other methods is the grouping of lines based on the desirability of the traits (for example, low-average genotypes in the days to flowering



and days to ripening are desirable traits). Therefore, the lines selected through the SIIG index are introduced as superior lines considering all traits in the south of Kerman. The SIIG method considers only quantitative traits, and non-parametric traits are not involved in this selection. Therefore, the Karoon cultivar, due to the fruit growth crack and line 7, due to the lack of uniformity and lack of the abscission layer, are not suitable for selection in the south of Kerman.

Conclusions: By using the SIIG method and using all the traits, lines 33-4, 11, 13, and 8 were selected as the best lines in Jiroft conditions.

Keywords: Brix, Cluster analysis, Fruit yield, SIIG index

How to Cite This Article: Alavi-Siney, S. M., & Abedi, M. (2025). Selection of Superior Tomato Lines using Multivariate Statistical Methods in the Jiroft Region. *J Crop Breed*, 17(2), 1-11. DOI: 10.61882/jcb.2024.1568

مقاله پژوهشی

گزینش لاین‌های برتر گوجه‌فرنگی با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره در منطقه جیرفت

سید محمد علوی سینی^۱ و ماهیار عابدی^۲

۱- عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران، (نویسنده مسوول: m.Alavis@areco.ac.ir)

۲- محقق، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۱/۱۷

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۳/۰۹/۰۲
صفحه: ۱ تا ۱۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

چکیده مبسوط

مقدمه و هدف: گوجه‌فرنگی (*Solanum lycopersicum* L.) یکی از مهم‌ترین محصولات زراعی در سراسر جهان است، و سطح زیر کشت این گیاه در ایران (۱۰۳ هزار هکتار) و میزان تولید آن (بیش از ۵ میلیون تن) بر اهمیت این گیاه دلالت دارند. در اصلاح نباتات از روش‌های مختلفی در گزینش ژنوتیپ‌ها استفاده می‌شود. برای گزینش برترین ژنوتیپ‌ها نیاز به روشی است که بتواند همه صفات را براساس مطلوبیت و عدم مطلوبیت در گزینش‌ها مدنظر قرار دهد. شاخص انتخاب ژنوتیپ برتر (SIIG) یکی از روش‌هایی است که می‌تواند علاوه بر انتخاب ژنوتیپ‌های برتر، فاصله بین ژنوتیپ‌ها را هم مشخص کند. در این روش، امکان شناسایی ژنوتیپ‌هایی با خصوصیات خاص وجود دارد. به‌عنوان مثال، با روش SIIG می‌توان ژنوتیپ‌هایی با عملکرد بالا و زودرس را شناسایی و گزینش کرد. هدف این مطالعه، ارزیابی ژنوتیپ‌های گوجه‌فرنگی از طریق صفات کمی و کیفی و گزینش برترین‌ها برای شرایط آب و هوایی منطقه جیرفت بود.

مواد و روش‌ها: به‌منظور ارزیابی و گزینش لاین‌های برتر گوجه‌فرنگی در منطقه جیرفت، آزمایشی با ۱۱ ژنوتیپ (۱۰ لاین امیدبخش به‌همراه رقم کارون) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در طی دو سال زراعی (۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۱-۱۴۰۲) در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان (جیرفت) انجام شد. لاین‌ها به‌صورت نشاء و در تاریخ اول بهمن زیر پلاستیک کشت گردیدند. آبیاری به‌صورت قطره‌ای و علف‌های هرز به‌صورت دستی وجین شدند. در طی فصل رشد و پس از برداشت (اردیبهشت)، صفات کیفی شامل یکنواختی، ترک‌خوردگی، شانه سبزی، نوع گل‌آذین و داشتن لایه سواگر برای هر ژنوتیپ ثبت شدند. صفات میزان بریکس، pH، سفتی بافت، تعداد حفره، طول میوه، عرض میوه، وزن میوه و عملکرد هر بوته در آزمایشگاه اندازه‌گیری شدند. صفات روز تا گلدهی، روز تا رسیدگی و تعداد گل‌آذین نیز در هر کرت ثبت گردیدند. تجزیه‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SAS (9.4) انجام شدند و محاسبات مربوط به روش SIIG با استفاده از ماتریس‌های مربوطه انجام شدند.

یافته‌ها: تجزیه واریانس مرکب داده‌ها در طی دو سال آزمایش نشان داد که اثر سال بر تمامی صفات مورد مطالعه، به‌جز صفت تعداد حفره، معنی‌دار بود. این موضوع نشان دهنده شرایط متفاوت در طی دو سال آزمایش و تأثیرپذیری صفات مورد مطالعه از شرایط آزمایشی است. اثر ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در سال بر تمامی صفات مورد مطالعه، به‌جز تعداد گل‌آذین، معنی‌دار بود. این نتیجه بیانگر تنوع موجود بین لاین‌های مورد آزمایش از لحاظ صفات مورد مطالعه است. نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ نشان داد که لاین‌های شماره ۱۴ و ۶-۳۳ توانستند با توجه به گلدهی زود هنگام، زودتر به مرحله برداشت برسند. ژنوتیپ‌های شماره ۸ و ۳۲ بیشترین عملکرد میوه را داشتند و کمترین مقدار از لحاظ این صفت به لاین‌های ۶-۳۳ و ۷-۲۲ اختصاص داشت. مقایسه میانگین میان ژنوتیپ‌ها نشان داد که گزینش برترین‌ها بر مبنای همه صفات ممکن نبود چون صفات به‌صورت منفرد مقایسه شدند. چنانچه گزینش تنها بر مبنای عملکرد صورت گیرد در گروه برتر ۲ لاین شماره ۸ و ۳۲ قرار می‌گیرند. گروه‌بندی بر اساس تجزیه کلاستر در گروه برتر، چهار لاین با شماره ۸، ۷-۲۲، ۱۱ و رقم کارون را قرار داد. گروه‌بندی لاین‌های گوجه‌فرنگی بر مبنای شاخص SIIG، شش لاین را در گروه برتر قرار داد. برتری روش SIIG نسبت به سایر روش‌ها، گروه‌بندی لاین‌ها براساس مطلوبیت صفات است (به‌طور مثال، میانگین کم ژنوتیپ‌ها در صفات روز تا گل‌دهی و روز تا رسیدگی مطلوب هستند). بنا بر این، لاین‌های گزینش شده از طریق شاخص SIIG به‌عنوان لاین‌های برتر با در نظر گرفتن تمامی صفات در منطقه جنوب کرمان معرفی می‌گردند. با توجه به این‌که روش SIIG تنها صفات کمی را در نظر می‌گیرد و صفات غیرپارامتری در این گزینش دخیل نیستند، اشاره می‌گردد که رقم کارون به‌دلیل ترک‌خوردگی میوه‌ها و لاین شماره ۷ به‌دلیل عدم وجود یکنواختی و نداشتن لایه سواگر، برای گزینش در شرایط جنوب کرمان مطلوب نیستند.

نتیجه‌گیری: در نهایت، با استفاده از روش SIIG و با در نظر گرفتن همه صفات، لاین‌های شماره ۴-۳۳، ۱۱، ۱۳ و ۸ به‌عنوان لاین‌های برتر در شرایط جیرفت گزینش شدند.

واژه‌های کلیدی: بریکس، تجزیه کلاستر، شاخص SIIG، عملکرد میوه

مقدمه

به‌عنوان سالاد، فرآوری شده به‌صورت پوره، سس کچاپ، آب‌میوه یا پودر، و پخته به‌عنوان سس یا سوپ گوجه‌فرنگی مصرف کرد که درمان مؤثری برای مبتلایان به یبوست گزارش شده است (Alda et al., 2009; Rehman et al., 2019). گوجه‌فرنگی حاوی بتاکاروتن، فلاونوئیدها، لیکوپن، ویتامین‌ها و مواد معدنی حیاتی است که تا حد زیادی به کاهش بیماری‌های ناشی از کمبود در انسان کمک می‌کنند. همچنین، این گیاه به‌خاطر دوره رشدی نسبتاً کوتاه و عملکرد بالا، در تأمین معیشت کشاورزان خرده مالک نقش مهمی دارد (Marti et al., 2018). افزایش تقاضا برای میوه‌های تازه

گوجه‌فرنگی (*Solanum lycopersicum* L.) از خانواده سولاناسه با سطح زیر کشت ۴/۹ میلیون هکتار و میزان تولید بالغ بر ۱۸۶ میلیون تن (FAO, 2022)، یکی از مهم‌ترین محصولات زراعی در سراسر جهان است (Siddiqui et al., 2020; El-Mansy et al., 2021). سطح زیر کشت این گیاه در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در کشورمان ۱۰۳ هزار هکتار و میزان تولید آن بیش از ۵ میلیون تن گزارش شده‌اند (MAJ, 2022) که بر اهمیت این گیاه دلالت دارد. میوه گوجه‌فرنگی یک سبزی با ارزش است که می‌توان آن را به‌صورت خام

روش SIIG برای بار نخست توسط زالی و همکاران (Zali et al., 2015) برای ترکیب روش‌های مختلف تجزیه پایداری معرفی گردید. از روش SIIG می‌توان به‌منظور رتبه‌بندی و انتخاب بهترین ژنوتیپ‌ها و تعیین فواصل بین ژنوتیپ‌ها و گروه‌بندی آن‌ها استفاده کرد. یکی از ویژگی‌های روش SIIG استفاده از شاخص‌های مختلف از قبیل صفات مورفولوژیک، صفات فیزیولوژیک و ... برای محاسبه آن است و به این ترتیب می‌توان کارایی گزینش را افزایش داد. از آنجائی که هر ژنوتیپی ممکن است از نظر یک شاخص یا صفتی برتر باشد، ولی با افزایش تعداد صفات یا شاخص‌ها، گزینش ژنوتیپ‌های مناسب سخت می‌شود. در روش SIIG، تمام شاخص‌ها و صفات به‌صورت یک شاخص بدون واحد درآمده، رتبه‌بندی و تعیین ژنوتیپ‌های برتر تسهیل می‌گردد. از جمله مزیت‌های این روش آن است که معیارها یا شاخص‌های به‌کاررفته برای مقایسه می‌توانند دارای واحدهای سنجش متفاوتی باشند و طبیعت منفی و مثبت داشته باشند (Zali et al., 2015; Zali et al., 2017). از شاخص SIIG به‌منظور انتخاب بهترین ژنوتیپ‌ها با استفاده از ادغام شاخص‌های مختلف تحمل به خشکی (Zali et al., 2017)، ادغام پارامترهای تجزیه پایداری (Najafi Mirak et al., 2018; Zali et al., 2015) و ادغام صفات مختلف مورفو-فونولوژیک (Abdollahi et al., 2020; Hesar et al., 2020; Zali & Barati, 2020) استفاده شده است. هدف این مطالعه، ارزیابی ژنوتیپ‌های گوجه‌فرنگی از طریق صفات کمی و کیفی و گزینش برترین لاین‌ها جهت معرفی رقم برای مصرف تازه‌خوری در شرایط آب و هوایی منطقه جیرفت بود.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در طی سال‌های زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان با طول جغرافیایی ۲۹° ۵۱' ۵۷" عرض جغرافیایی ۱۱° ۳۳' ۲۸" و ۶۳۵ متر ارتفاع از سطح دریا انجام گرفت. حداقل دما در زمستان در این منطقه تا ۴- درجه سانتی‌گراد و حداکثر دما در تابستان به ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسند. میانگین بارندگی سالانه در این منطقه حدود ۲۰۰ میلی‌متر است. در طی دو سال آزمایش، ده لاین امیدبخش (۷، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۳-۴، ۳۳-۶) به‌همراه رقم کارون (شماره ۵۲) به‌عنوان شاهد با یکدیگر مقایسه شدند. رقم کارون یک رقم آزاد گرده‌افشان است و سطح زیرکشت بالایی در بین کشاورزان دارد. بذره‌های لاین‌های مورد بررسی از بخش تحقیقات سبزی، صیفی و حبوبات آبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تهیه شدند (جدول ۱).

گوجه‌فرنگی و محصولات مرتبط با آن، جستجو برای ارقام پرمحصول گوجه‌فرنگی را در بین کشاورزان ضروری کرده است (Asfaw, 2021). اقلیم در شناسایی ژنوتیپ‌های برتر گوجه‌فرنگی بسیار مهم است، زیرا گونه‌های مختلف گوجه‌فرنگی سطوح متفاوتی از تحمل را به شرایط اقلیمی خاص نشان می‌دهند. به این معنی که ژنوتیپی که در یک اقلیم خوب عمل می‌کند ممکن است در اقلیمی دیگر رشد مطلوب نداشته باشد، که این موضوع ارزیابی عملکرد ارقام گوجه‌فرنگی را در محیط‌های کشت هدف (به‌خاطر شرایط متفاوت دمایی و رطوبتی) ضروری می‌کند (Gonzalo et al., 2021). در دو دهه گذشته، مطالعات مختلفی در زمینه بررسی تنوع مورفولوژیکی، ژنتیکی، برآورد قابلیت ترکیب‌پذیری و هتروزیس لاین‌ها برای بهبود ارقام گوجه‌فرنگی صورت گرفته است (Hannan et al., 2007; Mirshamsi-Kakhki et al., 2008; Sekhar et al., 2010; Mohsenifard et al., 2021; Hassan et al., 2011). پیش‌شرط اساسی برای نیل به موفقیت در زمینه بهبود صفات مختلف، آگاهی از تنوع ژنتیکی موجود در جمعیت است (Alavi-Siney & Saba, 2021). برای گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها و شناسایی ژنوتیپ‌های برتر، از روش‌های مختلف آماری استفاده می‌شود. تجزیه‌های چندمتغیره، از قبیل تجزیه خوشه‌ای، ابزار مفیدی برای گزینش در برنامه‌های اصلاحی و دورگ‌گیری هستند. این تجزیه به‌طور موفقیت‌آمیزی در برنامه‌های اصلاحی برای سنجش تنوع در گیاهان زراعی به‌کار گرفته شده است (Alam et al., 2020). پژوهش‌گران مختلف برای گروه‌بندی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گوجه‌فرنگی و گزینش ژنوتیپ‌های برتر از این روش استفاده کرده‌اند (Ghorbanpour, 2018; Golcheshmeh et al., 2022). در روش‌های آماری چندمتغیره از قبیل تجزیه کلاستر، افراد برمبنای تمامی صفات گزینش می‌گردند و در این تجزیه‌ها مطلوبیت صفات مدنظر قرار نمی‌گیرد که این موضوع باعث گمراهی اصلاح‌گران در انتخاب ژنوتیپ‌های برتر خواهد شد. بنا بر این، نیاز به روشی است که بتواند این نقیصه را برطرف کند و در گزینش برترین‌ها به اصلاح‌گران کمک نماید. شاخص انتخاب ژنوتیپ برتر (SIIG) یکی از این روش‌ها است که می‌تواند علاوه بر انتخاب ژنوتیپ‌های برتر، فاصله بین ژنوتیپ‌ها را هم مشخص کند. در این روش، امکان شناسایی ژنوتیپ‌هایی با خصوصیات خاص وجود دارد (Zali et al., 2017; Zali et al., 2015). به‌عنوان مثال، با روش SIIG می‌توان ژنوتیپ‌هایی با عملکرد بالا و زودرس را شناسایی و گزینش کرد (Zali & Barati, 2020).

جدول ۱- اطلاعات ژنوتیپ‌های مورد استفاده در آزمایش

Table 1. Information of the genotypes used in the experiment

| شماره No | لاین Line | منشأ / رقم Source/Variety | کشور Country |
|-------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | T7 | 03-14 | TAIWAN |
| 2 | T8 | SD0030051 | US |
| 3 | T11 | SD0030051 | US |
| 4 | T13 | Zhongza 8 | CHINA |
| 5 | T14 | 1-484 | US |
| 6 | T15 | SONIA | INDIA |
| 7 | T19 | CH | IRAN |
| 8 | T32 | SONIA | INDIA |
| 9 | T52 | KARON | IRAN |
| 10 | T22-7 | 22-7 | US |
| 11 | T33-4 | 303 | US |
| 12 | T33-6 | 303 | US |

۲- تبدیل ماتریس داده‌های اولیه (ماتریس D) به یک ماتریس نرمال (ماتریس R): از رابطه زیر برای نرمال کردن داده‌ها (بدون واحد کردن داده‌ها) استفاده شد:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_{ij}^2}} \quad \text{رابطه (۲)}$$

در رابطه ۲، برای نرمال نمودن داده‌ها، مقدار صفات در همه ژنوتیپ‌ها برای هر صفت به توان ۲ رسانده شد، سپس جمع و جذر گرفته شد (مخرج کسر) و در نهایت تک تک ژنوتیپ‌ها به مخرج کسر تقسیم شدند. بنابراین، بعد از نرمال نمودن داده‌های اولیه (ماتریس D)، ماتریس R به صورت رابطه ۳ تعریف می‌شود:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1m} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \dots & r_{nm} \end{bmatrix} \quad \text{رابطه (۳)}$$

۳- پیدا کردن ژنوتیپ برتر و ژنوتیپ غیر برتر (ضعیف) برای هر صفت (شاخص): در این مرحله، با توجه به نوع صفت و نظر محقق برای هر صفت به‌طور جداگانه، بهترین (برتر) و ضعیف‌ترین (غیر برتر) ژنوتیپ‌ها انتخاب شدند. به‌عنوان مثال در مورد عملکرد، حداکثر مقدار عملکرد یک ژنوتیپ مقدار برتر و پایین‌ترین مقدار عملکرد به‌عنوان ژنوتیپ غیر برتر (ضعیف) در نظر گرفته شدند. همچنین، در مورد تعداد روز تا رسیدگی (DMA)، چنانچه زودرسی ژنوتیپ‌ها مهم باشد، مقدار برتر برابر با کم‌ترین مقدار DMA و مقدار ضعیف برابر با حداکثر مقدار DMA برای ژنوتیپ‌ها هستند.

۴- محاسبه فاصله از ژنوتیپ‌های برتر (d_i^+) و ژنوتیپ‌های ضعیف (d_i^-): در این مرحله برای هر ژنوتیپ، فاصله از ژنوتیپ‌های برتر (d_i^+) و ژنوتیپ‌های ضعیف (d_i^-) به ترتیب با استفاده از روابط ۴ و ۵ محاسبه شد. به‌عبارت دیگر، برای محاسبه فاصله از ژنوتیپ‌های برتر (d_i^+)، با توجه به رابطه ۴، ابتدا مقادیر تمام صفات (نرمال شده) در یک لاین (ژنوتیپ) از مقادیر برتر برای هر صفت (که در مرحله قبل مشخص شد) کم گردیدند، سپس به توان ۲ رسانده شدند و در نهایت با هم جمع و جذر گرفته شدند. همین کار برای محاسبه فاصله از ژنوتیپ ضعیف (d_i^-) برای هر لاین انجام شد (رابطه ۵).

رابطه (۴)

$$d_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (r_{ij} - r_j^+)^2} \quad i = 1, \dots, n$$

خزانه لاین‌های مورد استفاده در آزمایش در اواسط آذر در سینی‌های نشاء تهیه شد. پس از آماده‌شدن، نشاءها از خزانه به زمین اصلی در اول بهمن انتقال یافتند. کشت در زمین اصلی زیر تونل‌های پلاستیکی تا اوایل اسفند صورت گرفت. بعد از اطمینان از رفع خطر سرما، پلاستیک‌ها برداشته شد و ادامه رشد در فضای آزاد صورت پذیرفت. کشت در دو طرف جوی با فاصله ۵۰ سانتی‌متر و با فاصله ۲ متر بین ردیف‌ها انجام شد. آبیاری به‌صورت قطره‌ای و کنترل علف‌های هرز مزرعه به‌صورت وجین دستی انجام گرفت. گیاهان طی چند مرحله از طریق آب آبیاری با کودهای کامل تغذیه شدند. صفات مختلف در طول دوره رشد تا برداشت محصول در مزرعه اندازه‌گیری شدند. صفات کیفی شامل یکناختی، ترک خوردگی، شانه سبزی، داشتن لایه سواگر و نوع گل آذین نیز ثبت شدند. صفات تعداد گل آذین (از ابتدای گل‌دهی تا پایان گل‌دهی)، میزان بریکس، pH، سفتی بافت، وزن میوه، تعداد حفره، طول میوه و عرض میوه پس از برداشت در آزمایشگاه اندازه‌گیری شدند. صفات روز تا گلدهی و روز تا رسیدگی از زمان نشاء برای هر کرت ثبت شدند. برداشت در طی چهار مرحله انجام شد و عملکرد کل بوته از مجموع وزن میوه‌های برداشت شده در طی چهار مرحله محاسبه شد.

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین مشاهدات با استفاده از نرم‌افزار SAS نسخه ۹/۴ انجام شدند. محاسبه شاخص SIIG با استفاده از نرم‌افزار اکسل و به‌روش ذیل انجام شد.

به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ادغام صفات مورفولوژیک از روش SIIG استفاده شد که نحوه محاسبه این شاخص به‌شرح ذیل است (Zali et al., 2015):

۱- تشکیل ماتریس داده‌ها: با توجه به تعداد ژنوتیپ‌ها و صفات مختلف مورد بررسی، ماتریس داده‌ها به‌صورت رابطه ۱ تشکیل شد (ماتریس D).

$$D = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nm} \end{bmatrix} \quad \text{رابطه (۱)}$$

در این ماتریس، x_{ij} مقدار ژنوتیپ i ام ($i = 1, 2, \dots, n$) در رابطه با صفت j ام ($j = 1, 2, \dots, m$) بود. به‌عبارت دیگر، ردیف‌ها را ژنوتیپ‌ها و ستون‌ها را صفات تشکیل دادند.

رابطه (۵)

$$d_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (r_{ij} - r_j^-)^2} \quad i = 1, \dots, n$$

در روابط فوق، r_{ij} مقدار نرمال‌شده ژنوتیپ i ام در رابطه با شاخص (صفت) j ام ($i = 1, 2, \dots, n$) در رابطه با شاخص (صفت) j ام ($j = 1, 2, \dots, m$) است. r_j^+ و r_j^- به ترتیب مقادیر نرمال شده ژنوتیپ‌های برتر و ژنوتیپ‌های ضعیف برای هر شاخص (صفت) j ام ($j = 1, 2, \dots, m$) هستند.

۵- محاسبه شاخص انتخاب ژنوتیپ برتر (SIIG): در آخرین مرحله، برای محاسبه شاخص انتخاب ژنوتیپ برتر برای هر لاین یا ژنوتیپ از رابطه ۶ استفاده شد:

رابطه (۶)

$$SIIG_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-} \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad 0 \leq SIIG_i \leq 1$$

مقدار $SIIG_i$ بین صفر تا یک تغییر می‌کند و هرچه گزینه مورد نظر به ژنوتیپ برتر نزدیک‌تر باشد مقدار $SIIG_i$ آن به یک نزدیک‌تر خواهد بود. بر اساس این روش، بهترین ژنوتیپ، نزدیک‌ترین ژنوتیپ به ژنوتیپ‌های برتر و دورترین آن از ژنوتیپ‌های ضعیف است (Zali et al., 2015).

نتایج و بحث

تجزیه واریانس مرکب داده‌ها در طی دو سال آزمایش نشان داد که اثر سال بر تمامی صفات مورد مطالعه، به جز صفات تعداد حفره و وزن میوه، معنی‌دار بود. این موضوع نشان‌دهنده شرایط متفاوت در طی دو سال آزمایش و تأثیرپذیری صفات مورد مطالعه از شرایط آزمایشی است. اثر ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در سال بر تمامی صفات مورد مطالعه، به جز تعداد گل‌آذین، معنی‌دار بود (جدول ۲). این نتیجه بیانگر تنوع موجود بین لاین‌های مورد آزمایش از لحاظ صفات مورد مطالعه است. پژوهشگران دیگر نیز اختلافات معنی‌داری را بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه گزارش کردند (Henareh et al., 2015; Golcheshmeh et al., 2022). تنوع بین لاین‌ها می‌تواند باعث بهبود صفات در برنامه‌های اصلاحی شود و در سودمندی انتخاب مؤثر باشد (Abedini et al., 2016).

نتایج مقایسه میانگین صفت روز تا گلدهی آشکار کردند که لاین‌های شماره ۷، ۱۱ و ۳۲ دیرتر از همه لاین‌ها به گل رفتند و لاین‌های ۸، ۱۴، ۳۳-۴، ۳۳-۶ و ۲۲-۷ گلدهی سریعتری نسبت به سایر لاین‌ها و شاهد (رقم کارون) داشتند. مقایسه میانگین صفت روز تا رسیدگی نشان داد که میوه‌های لاین ۳۳-۶ بعد از ۹۱ روز به مرحله برداشت رسیدند که از این حیث لاین‌های شماره ۱۴، ۱۹، ۷ و ۱۳ با آن‌ها اختلافات معنی‌داری ندارند (جدول ۳). هر چند که لاین شماره ۷ گلدهی دیرتری داشت ولی از لحاظ رسیدگی در گروه ارقام زودرس قرار گرفت. از دو صفت بالا نتیجه‌گیری می‌گردد که تنها گلدهی زود هنگام مهم نیست، بلکه مهم این است که یک گیاه تا چه اندازه بتواند از ظرفیت موجود استفاده کند و میوه را به مرحله بلوغ برساند. لاین‌های شماره ۱۴ و ۳۳-۶ توانستند با توجه به گلدهی زود هنگام، زودتر به مرحله برداشت برسند.

مقایسه میانگین طول میوه نشان داد که لاین‌های شماره ۷، ۳۲ و ۳۳-۴ بیشترین طول میوه را داشتند و کمترین طول میوه به لاین ۳۳-۶ با ۳۶ میلی‌متر اختصاص داشت. رقم کارون و لاین‌های شماره ۱۴ و ۸ تفاوت معنی‌داری با آن نداشتند. بیشترین عرض میوه مربوط به لاین‌های شماره ۸، ۱۱، رقم کارون و ۷-۲۲ بود که لاین‌های با بیشترین طول فرم شکل کشیده داشتند و میوه‌های لاین‌های با بیشترین عرض غالباً به شکل گرد بودند. لاین شماره ۳۳-۶ دارای کمترین طول و کمترین عرض در بین ژنوتیپ‌های مورد آزمایش بود (جدول ۳). هر چند که لاین‌های دارای کمترین طول، بیشترین عرض را داشتند ولی لاین ۳۳-۶ کمترین عرض را نیز به خود اختصاص داد که این موضوع به‌خاطر شکل کشیده و ریز بودن میوه‌های آن است.

تعداد حفره در لاین‌های شماره ۸، ۷-۲۲، ۱۴، ۱۹ بیشترین مقدار بود و با رقم شاهد کارون اختلافی نداشتند (جدول ۳). نتایج نشان دادند که لاین‌های با عرض میوه بیشتر تعداد حفره بیشتری نسبت به لاین‌های با عرض میوه کمتر داشتند. بین ژنوتیپ‌ها از لحاظ تعداد حفره اختلاف معنی‌دار وجود داشت و مکان نیز این صفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد (Vakili et al., 2023).

متوسط وزن میوه رقم کارون با ۱۳۱/۲۷ گرم بیشترین مقدار بود که از این حیث لاین‌های ۸ و ۱۱ به ترتیب با ۱۲۵/۷۸ و ۱۲۷/۷۳ گرم اختلاف معنی‌داری با آن نداشتند. کمترین وزن میوه به لاین ۳۳-۶ با مقدار ۵۵/۳۸ گرم اختصاص داشت (جدول ۳). وزن میوه یکی از اجزای اصلی تعیین عملکرد در واحد سطح در گیاه گوجه‌فرنگی است و در گزینش ژنوتیپ‌های برتر در برنامه‌های اصلاحی نقش مهمی را ایفا می‌کند (Henareh et al., 2015; Golcheshmeh et al., 2022). از ویژگی‌های مهم دیگر در انتخاب لاین‌های برتر، سفتی میوه و قدرت ماندگاری در زمان حمل و نقل است که در این آزمایش لاین شماره ۳۳-۴ از این لحاظ برترین لاین بود و لاین ۷-۲۲ کمترین مقدار را به خود اختصاص داد. لاین‌های ۳۳-۶، ۳۲، ۱۴ و ۷ در رتبه دوم از لحاظ سفتی میوه قرار گرفتند (جدول ۳). بنابراین، اگر این لاین‌ها سایر ویژگی‌های لاین‌های برتر را داشته باشند گزینه مناسبی برای صادرات محسوب می‌شوند. پژوهشگران دیگر نیز اختلاف معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها از لحاظ این صفت را گزارش کرده‌اند و از این صفت به‌عنوان یک شاخص مهم برای گزینش استفاده نموده‌اند (Rahaii et al., 2016; Nezami et al., 2022). میزان pH لاین ۱۱ کمترین مقدار را به خود اختصاص داد (۴/۲) و لاین‌های ۳۲، ۱۹، ۱۴، ۳۳-۴ بیشترین مقادیر pH را داشتند (جدول ۳). از لحاظ میزان کل مواد جامد محلول در آب، لاین‌های شماره ۳۲، ۳۳-۴، ۷، ۱۴ بیشترین مقدار را داشتند و اختلافات معنی‌داری با رقم کارون نداشتند. کمترین مقدار بریکس به لاین ۷-۲۲ اختصاص داشت (جدول ۳). لاین‌های دارای بالاترین بریکس امتیاز بالایی در گزینش برترین‌ها دارند (Henareh et al., 2015).

در نهایت، نتایج نشان دادند که عملکرد لاین شماره ۸ با متوسط ۳/۲۹ کیلوگرم در هر بوته بیشترین مقدار بود و

آنچائی که عملکرد یک صفت کمی است و بسیار تحت تأثیر محیط قرار می‌گیرد، بنابراین در گزینش‌ها باید از صفاتی استفاده کرد که کمتر تحت تأثیر محیط باشند و همبستگی بالایی با عملکرد داشته باشند (Henareh *et al.*, 2015; Rahaii *et al.*, 2016).

کمترین مقدار از لحاظ این صفت به لاین‌های ۶-۳۳ و ۷-۲۲ اختصاص داشت (جدول ۳). علت پایین بودن عملکرد لاین ۶-۳۳ اندازه کوچک میوه‌های آن است و برخلاف این لاین، لاین شماره ۸ به علت داشتن میوه‌های درشت بالاترین مقدار را به خود اختصاص داد. بنابراین، اندازه میوه در گوجه‌فرنگی در عملکرد نهایی در واحد سطح تأثیر بسیار بالایی دارد. از

جدول ۲- تجزیه واریانس مرکب صفات مورد مطالعه در طی دو سال آزمایش در منطقه جیرفت

Table 2. Compound variance analysis of the studied traits during two experimental years in the Jiroft region

| عملکرد Yield | بریکس Brix | pH | سفتی بافت Firmness | وزن میوه FWE | تعداد حفره NL | عرض میوه FWI | طول میوه FL | تعداد گل آذین NI | روز تا رسیدگی DMA | روز تا گلدهی DFL | درجه آزادی df | منابع تغییر SOV |
|-----------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 85.92** | 9.23** | 0.06** | 1.45** | 277.49ns | 0.02ns | 13763.63** | 17031.95** | 6264.38** | 12191.05** | 17672.72** | 1 | سال Year |
| 0.22 | 0.22 | 0.001 | 0.02 | 53.52 | 0.42 | 1.08 | 1.59 | 236.06 | 2.89 | 1.62 | 4 | تکرارهای داخل سال Year (R) |
| 0.91** | 0.43** | 0.04** | 0.11** | 2637.64** | 4.67** | 123.60** | 171.12** | 136.73 ^{ns} | 18.04** | 101.31** | 10 | ژنوتیپ Genotyp |
| 1.45** | 0.50** | 0.02** | 0.03** | 561.95** | 1.95** | 49.49** | 22.98** | 135.15 ^{ns} | 10.81** | 54.43** | 10 | ژنوتیپ در سال Genotyp × Year |
| 0.18 | 0.06 | 0.005 | 0.004 | 92.17 | 0.24 | 3.82 | 7.61 | 93.83 | 2.06 | 8.14 | 40 | خطا Error |
| 16.84 | 5.16 | 1.66 | 7.97 | 8.94 | 14.53 | 4.77 | 6.23 | 33.18 | 1.53 | 7.03 | - | ضریب تغییرات CV% |

^{ns} و ^{**}: به ترتیب عدم معنی‌داری و معنی‌دار در سطوح احتمال ۰/۰۵ و ۰/۰۱.
DFL: Days to flowering; DMA: Days to maturity; NI: Number of inflorescence; FL: Fruit length; FWI: Fruit width; NL: Number of locules; FWE: Fruit weight

جدول ۳- مقایسه میانگین لاین‌های گوجه‌فرنگی برای صفات مورد مطالعه در منطقه جیرفت بر اساس میانگین دو سال آزمایش
Table 3. Mean comparisons of tomato lines for studied traits in Jiroft based on the average of two experimental years

| تعداد حفره NL | عرض میوه (میلی‌متر) FWI (mm) | طول میوه (میلی‌متر) FL (mm) | تعداد گل آذین NI | روز تا رسیدگی DMA | روز تا گلدهی DFL | ژنوتیپ Genotype |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 2d | 37.68c | 53.05a | 29.33a | 92.17cd | 46.17a | 7 |
| 4.33a | 46a | 39.47cd | 28.17a | 93.5bc | 35.17f | 8 |
| 3.67bc | 45.85a | 40.08cd | 31.17a | 97.5a | 45.67ab | 11 |
| 3.17c | 39.77bc | 46.12bc | 28.83a | 93.17bcd | 42.5bc | 13 |
| 4ab | 41.83b | 41.98cd | 24.5a | 92.5cd | 36.67ef | 14 |
| 4.17ab | 38.17c | 45.9bc | 21.33a | 92.5cd | 41.67cd | 19 |
| 3.17c | 38.5c | 50.07a | 24.33a | 92.5cd | 46.17a | 32 |
| 4.33a | 46.78a | 41.27cd | 37.17a | 94.83b | 40cde | کارون Karoon |
| 3.83ab | 45.2a | 41.75cd | 33.5a | 94.83b | 38.33def | 22-7 |
| 2.5d | 37.62c | 51.07a | 28.00a | 94.83b | 37.17ef | 33-4 |
| 2d | 32.78d | 36.46d | 34.83a | 91.5d | 36.83ef | 33-6 |

میانگین‌های دارای حروف مشترک در هر ستون اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.
The means with common letters in each column are not significantly different from each other.
DFL: Days to flowering; DMA: Days to maturity; NI: Number of inflorescence; FL: Fruit length; FWI: Fruit width; NL: Number of locules

ادامه جدول ۳- مقایسه میانگین لاین‌های گوجه‌فرنگی برای صفات مورد مطالعه در منطقه جیرفت بر اساس میانگین دو سال آزمایش
Continued Table 3. Mean comparisons of tomato lines for studied traits in Jiroft based on the average of two experimental years

| عملکرد (کیلوگرم/بوته) Yield (kg/plant) | بریکس Brix | pH | سفتی بافت Firmness | وزن میوه (گرم) FEW (g) | ژنوتیپ Genotype |
|---|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| 2.32cd | 4.85abc | 4.32b | 0.9b | 106.21cde | 7 |
| 3.29a | 4.61bcd | 4.23bc | 0.65ef | 125.78ab | 8 |
| 2.66bc | 4.45de | 4.2c | 0.77d | 127.73ab | 11 |
| 2.67bc | 4.59cd | 4.3b | 0.68e | 109.42cd | 13 |
| 2.56bc | 4.92abc | 4.41a | 0.92b | 110.61cd | 14 |
| 2.41bcd | 4.5de | 4.43a | 0.79cd | 99.29de | 19 |
| 2.9ab | 5.05a | 4.43a | 0.86bc | 103.9de | 32 |
| 2.48bcd | 5.03a | 4.27bc | 0.77d | 131.27a | کارون Karoon |
| 1.95d | 4.26e | 4.25bc | 0.58f | 117.53bc | 22-7 |
| 2.67bc | 4.92ab | 4.41a | 1.05a | 94.25e | 33-4 |
| 1.95d | 4.48de | 4.29bc | 0.92b | 55.38f | 33-6 |

میانگین‌های دارای حروف مشترک در هر ستون اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.
The means with common letters in each column are not significantly different from each other.
FWE: Fruit weight

سواگر و عدم وجود یکنواختی مناسب گزینش نیستند. لاین‌های شماره ۳۲ و ۴-۳۳ دارای گل آذین از نوع مرکب بودند که یک ویژگی مثبت برای این ارقام محسوب می‌گردد.


صفات کیفی نیز در گزینش لاین‌ها تأثیرگذار هستند. همان طور که نتایج جدول ۴ نشان می‌دهند، رقم کارون به دلیل ترک خوردگی در میوه‌ها، و لاین شماره ۷ به دلیل نداشتن لایه

جدول ۴- اطلاعات توصیفی ژنوتیپ‌های گوجه‌فرنگی مورد استفاده

| ژنوتیپ Genotype | نوع گل‌آذین Type of inflorescence | شانه سبزی Green shoulders | ترک خوردگی Growth crack | لایه سواگر Abscission layer | یکنواختی Uniformity |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 7 | ساده Simple | ندارد No | ندارد No | ندارد No | ندارد No |
| 8 | ساده Simple | ندارد No | ندارد No | دارد Yes | دارد Yes |
| 11 | ساده Simple | ندارد No | ندارد No | دارد Yes | دارد Yes |
| 13 | ساده Simple | ندارد No | ندارد No | دارد Yes | دارد Yes |
| 14 | ساده Simple | ندارد No | ندارد No | دارد Yes | دارد Yes |
| 19 | ساده Simple | ندارد No | ندارد No | دارد Yes | ندارد No |
| 32 | مرکب Compound | ندارد No | ندارد No | دارد Yes | دارد Yes |
| کارون Karooon | ساده Simple | ندارد No | دارد Yes | دارد Yes | دارد Yes |
| 22-7 | ساده Simple | ندارد No | ندارد No | ندارد No | دارد Yes |
| 33-4 | مرکب Compound | ندارد No | ندارد No | ندارد No | دارد Yes |
| 33-6 | ساده Simple | ندارد No | ندارد No | ندارد No | دارد Yes |

گروه یک شامل لاین‌های شماره ۷، ۳۲، ۱۳ و ۱۴ گروه دو شامل لاین‌های شماره ۱۹ و ۴-۳۳، گروه سه شامل لاین‌های ۸، ۱۱، ۲۲-۷ و رقم کارون هستند و لاین شماره ۶-۳۳ به‌تنهایی در گروه چهار قرار گرفته است (شکل ۱).

تجزیه کلاستر
روش تجزیه کلاستر برای گروه‌بندی صفات از طریق کلیه صفات مورد مطالعه به کار گرفته شد. نتایج تجزیه کلاستر به‌روش وارد نشان دادند که لاین‌ها در چهار گروه قرار گرفتند.



شکل ۱- دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر به روش وارد بر اساس صفات مورد مطالعه
Figure 1. The cluster analysis Dendrogram through the Ward method based on the studied traits

جدول ۵- تجزیه واریانس چندمتغیره صفات مورد مطالعه برای تأیید نتایج گروه‌بندی

| P value | F | مقدار Value | درجه آزادی اشتباه Error df | درجه آزادی تیمار Treatment df | آزمون Test |
|---------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 0.011 | 4.62 | 2.75 | 9 | 3 | Pillai |
| 0.001 | 94.11 | 0.00 | 3 | 3 | Wilks lambda |
| 0.000 | 111095.99 | 259223.97 | 318 | 3 | Roy's largest root |

جدول ۶- مقایسه میانگین گروه‌های حاصل از تجزیه خوشه‌ای بر اساس میانگین صفات در هر گروه

Table 6. The comparison of the mean of groups obtained from cluster analysis based on the average of traits in each group

| میانگین گروه‌ها Average of groups | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|--------------------|------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| عملکرد (کیلوگرم/پلنت) Yield (kg/plant) | بریکس Brix | pH | سفتی بافت Firmness | وزن میوه (گرم) FEW (g) | تعداد حفره NL | عرض میوه (میلی‌متر) FWI (mm) | طول میوه (میلی‌متر) FL (mm) | تعداد گل آذین NI | روز تا رسیدگی DMA | روز تا گلدهی DFL | تعداد لاین‌ها Number of Lines | گروه Cluster |
| 2.49a | 4.86a | 4.35a | 0.85ab | 108.13 _b | 3.00ab | 39.55b | 47.37a | 29.54a | 92.96a | 42.92a | 4 | 1 |
| 2.54a | 4.71a | 4.42a | 0.93a | 96.77c | 3.33ab | 37.89b | 48.48a | 24.67a | 93.67a | 39.42a | 2 | 2 |
| 2.72a | 4.58a | 4.25a | 0.68b | 124.98 _a | 4.13a | 45.85a | 41.08b | 29.71a | 94.79a | 39.75a | 4 | 3 |
| 1.95a | 4.48a | 4.29a | 0.91ab | 55.38d | 2.00b | 32.78c | 36.46b | 34.83a | 91.50a | 36.83a | 1 | 4 |

میانگین‌های دارای حروف مشترک در هر ستون اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.

The means with common letters in each column are not significantly different from each other.

DFL: Days to flowering; DMA: Days to maturity; NI: Number of inflorescence; FL: Fruit length; FWI: Fruit width; NL: Number of locules; FWE: Fruit weight

جدول ۷- گروه‌بندی ژنوتیپ‌های گوجه‌فرنگی بر اساس شاخص SIIG

Table 7. Tomato genotype grouping based on the SIIG index

| SIIG | 0.8≤SIIG<0.9 | 0.7≤SIIG<0.8 | 0.6≤SIIG<0.7 | 0.5≤SIIG<0.6 | 0.4≤SIIG<0.5 | 0.3≤SIIG<0.4 | 0.2≤SIIG<0.3 | 0.1≤SIIG<0.2 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| گروه Group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| تعداد ژنوتیپ‌ها Number of genotypes | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |

گروه‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ را به علت داشتن شاخص SIIG بالای ۰/۵ می‌توان به عنوان لاین‌های برتر انتخاب نمود. لاین‌های ۳۳-۴، ۷، ۵۲، ۱۱، ۱۳ و ۸ به خاطر شاخص بالای SIIG (مقدار شاخص بین ۰/۵ تا ۰/۹) در گروه ۳ و ۴ قرار گرفتند (جدول ۶) و به عنوان برترین لاین‌ها گزینش می‌گردند.

نتیجه‌گیری کلی

نتایج تجزیه واریانس مرکب اختلافات معنی‌داری را بین ژنوتیپ‌ها نشان دادند که نشان‌دهنده تنوع لازم برای گزینش برترین لاین‌ها است. با توجه به تجزیه‌های انجام شده و مقایسه آن‌ها، می‌توان بیان کرد که در روش مقایسه میانگین چون صفات به صورت تک تک مقایسه می‌گردند نمی‌توان بر مبنای همه صفات اقدام به گزینش برترین‌ها نمود. چنانچه گزینش تنها بر مبنای عملکرد صورت گیرد در گروه برتر دو لاین شماره ۸ و ۳۲ قرار می‌گیرند. گروه‌بندی بر اساس تجزیه کلاستر در گروه برتر، چهار لاین با شماره ۸، ۲۲-۷، ۱۱ و رقم کارون را قرار داد. گروه‌بندی لاین‌های گوجه‌فرنگی بر مبنای شاخص SIIG، شش لاین را در گروه برتر قرار داد. برتری روش SIIG نسبت به سایر روش‌ها، گروه‌بندی لاین‌ها بر اساس مطلوبیت صفات است (به‌طور مثال، میانگین‌های کم ژنوتیپ‌ها در صفات روز تا گل‌دهی و روز تا رسیدگی مطلوب هستند). بنابراین، لاین‌های گزینش شده از طریق شاخص SIIG به عنوان لاین‌های برتر با در نظر گرفتن تمامی صفات در منطقه جنوب کرمان معرفی می‌گردند. با توجه به این که روش SIIG تنها صفات کمی را در نظر می‌گیرد و صفات غیرپارامتری در این گزینش دخیل نیستند، اشاره می‌گردد که رقم کارون به دلیل ترک‌خوردگی میوه‌ها و لاین شماره ۷ به دلیل عدم وجود یکنواختی و نداشتن لایه سواگر، برای گزینش در شرایط جنوب کرمان مطلوب نیستند. بنابراین، با توجه به جمیع جهات، لاین‌های شماره ۳۳-۴، ۱۱، ۱۳ و ۸ به عنوان لاین‌های برتر در شرایط جیرفت گزینش می‌گردند.

برای تأیید نتایج تجزیه کلاستر و بررسی این که آیا نقطه برش به درستی انتخاب شده است، تجزیه واریانس چندمتغیره انجام شد. به این منظور، هر گروه به عنوان یک تیمار و ژنوتیپ‌های داخل هر گروه به عنوان تکرار برای آن تیمار در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس چندمتغیره اختلاف معنی‌داری را بین گروه‌ها نشان دادند (جدول ۵) و ژنوتیپ‌های موجود در گروه‌های جداگانه از لحاظ صفات طول میوه، عرض میوه، تعداد حفره، وزن میوه و سفتی بافت اختلافات کاملاً معنی‌داری با یکدیگر داشتند (جدول ۶). بنابراین، با توجه به نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای و مقایسه میانگین گروه‌های حاصل از تجزیه خوشه‌ای، می‌توان این گونه بیان کرد که ژنوتیپ‌های گروه سه (لاین‌های شماره ۸، ۲۲-۷، ۱۱ و رقم شاهد کارون) به عنوان برترین ژنوتیپ‌ها گزینش گردند. چنانچه بخواهیم والدینی از این جمعیت برای تلاقی‌ها گزینش کنیم از گروه سه و چهار که بیشترین فاصله را دارند انتخاب می‌کنیم تا امکان حصول حداکثر واریانس ژنتیکی و صفات مطلوب مخصوصاً عملکرد فراهم شود (Alavi-Siney & Saba, 2015).

به منظور انتخاب برترین ژنوتیپ‌ها از لحاظ صفات مورد مطالعه به‌طور همزمان، از شاخص SIIG استفاده شد (Zali et al., 2015). از آنجایی که میزان تغییرات این شاخص بین صفر تا یک متغیر است، هر چه مقدار SIIG برای ژنوتیپی به یک نزدیک‌تر باشد، آن ژنوتیپ از مطلوبیت بالاتری از لحاظ صفات مورد مطالعه برخوردار است و هر چه مقدار SIIG برای لاینی به صفر نزدیکتر باشد، از نظر صفات مورد بررسی از مطلوبیت کمتری برخوردار خواهد بود (Zali et al., 2017; Nazari et al., 2023). طبق گرومبندی لاین‌های مورد بررسی گوجه‌فرنگی بر اساس شاخص SIIG، تعداد لاین‌های قرارگرفته از گروه ۱ تا ۸ به ترتیب ۰، ۰، ۳، ۳، ۴، ۱، ۰ و ۰ لاین هستند (جدول ۶). با توجه به گروه‌بندی انجام‌شده و کاهش مقدار شاخص SIIG از گروه ۱ به گروه ۸، لاین‌های

References

- Abdollahi Hesar, A., Sofalian, O., Alizadeh, B., Asghari, A., & Zali, H. (2020). Evaluation of some autumn canola genotypes based on agronomy traits and SIIG index. *Journal of Crop Breeding*, 12(34), 93-104. [In Persian]
- Abedini S., MohammadiNejad G., & Nakhoda, B. (2016). Evaluation of agronomics traits and yield potential diversity inbred wheat inbred lines *Triticum aestivum* L. derived from Roshan×Falat cultivar. *Journal of Crop Breeding*, 8(20), 1-10. [In Persian]
- Alam, M. S., Hossain, S., Ali, M. A., Hossain, M. G., & Islam, M. F. (2020). Assessment of genetic divergence in tomato (*Solanum lycopersicum* L.) through clustering and principal component analysis. *Journal of Agricultural Science & Engineering Innovation*, 1(1), 10-14.
- Alavi-Siney, S. M. & Saba, J. (2015). Analysis of yield and yield components traits in twenty bread wheat genotypes under dryland conditions. *Philippine Journal of Crop Science*, 40(2), 78-87.
- Alavi-Siney, S. M., & Saba, J. (2021). Investigation of the relationship between SSR markers and agronomic traits in saffron (*Crocus sativus* L.). *Journal of Horticulture and Postharvest Research*, 4(Special Issue - Recent Advances in Saffron), 79-88.
- Alda, L. M., Gogoasa, I., Bordean, D. M., Gergen, I., Alda, S., Moldovan, C., & Nita, L. (2009). Lycopene content of tomatoes and tomato products. *Journal of Agroalimentary Processes and Technologies*, 15(4), 540-542.
- Asfaw, D. W. (2021). Analysis of technical efficiency of smallholder tomato producers in Asaita district, Afar National Regional State, Ethiopia. *PLoS One*, 16(9), e0257366.
- EL-Mansy, A. B., Abd El-Moneim, D., ALshamrani, S. M., Safhi, F.A., Abdein, M. A., & Ibrahim, A. A. (2021). Genetic Diversity Analysis of Tomato (*Solanum lycopersicum* L.) with Morphological, Cytological, and Molecular Markers under Heat Stress. *Horticulturae*, 7(4), 65.
- F.A.O. (2023). Available at <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>.
- Ghorbanpour, A., Salimi, A., Tajick Ghanbary, M. A., Pirdashti, H., Dehestani, A. (2018). Relationship between Fruit Yield and its Components in Tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.) Cultivars using Multivariate Statistical Methods. *Journal of Crop Breeding*, 9(24), 22-29. [In Persian]
- GolCheshmeh, S., Kiani, G., KazemiTabar, S.K., & Navabpour, S. (2022). Investigation of Morphological Diversity and Evaluation of Tomato Lines Yield Using Multivariate Statistical Analysis. *Journal of Horticultural Science*, 6(2), 415-427. [In Persian]
- Gonzalo, M. J., Nájera, I., Baixauli, C., Gil, D., Montoro, T., Soriano, V., ... & Monforte, A. J. (2021). Identification of tomato accessions as source of new genes for improving heat tolerance: From controlled experiments to field. *BMC Plant Biology*, 21(1), 345.
- Hannan, M. M., Ahmed, M. B., Roy, U. K., Razvy, M. A., Haydar, A., Rahman, M. A., Islam, M. A., & Islam, R. (2007). Heterosis, combining ability and genetics for Brix%, days to first fruit ripening and yield in tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.). *Middle-East Journal of Scientific Research*, 2(3), 128-131.
- Hassan, Z., Ul-Allah, S., Khan, A. A., Shahzad, U., Khurshid, M., Bakhsh, A., Amin, H., Jahan, M.S., Rehim, A., & Manzoor Z. (2021). Phenotypic characterization of exotic tomato germplasm: An excellent breeding resource. *PLoS One*, 16(6), 1-12.
- Henareh, M., Dursun, A., & Abdollahi Mandoulakani, B. (2015). The Correlation between traits and path analysis of yield in tomato. *Journal of Applied Crop Breeding*, 3(2), 163-176.
- Martí, R., Leiva-Brondo, M., Lahoz, I., Campillo, C., Cebolla-Cornejo, J., & Roselló, S. (2018). Polyphenol and L-ascorbic acid content in tomato as influenced by high lycopene genotypes and organic farming at different environments. *Food Chemistry*, 239, 148-156.
- Ministry of Agricultural-Jihad (MAJ). (2022). Communications and information technology center. Available at Web site <http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=117564e0-507c-4565-9659-fbabfb4acb9b>. [In Persian]
- Mirshamsi-Kakhki, A., Farsi, M., Shahriari Ahmadi, F., & Nemati, H. (2008). Use of random amplified polymorphic DNA markers to estimate heterosis and combining ability in tomato hybrids. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 11(4), 499-507.
- Mohsenifard, E., Farsi, M., Nemati, H. & Malekzade, K. (2011). An SSR-based assessment of genetic diversity in 16 Tomato (*Lycopersicon esculentum*) lines and it's correlation with heterosis. *Iranian Journal of Horticultural Science*, 42(2), 185-192. [In Persian]
- Najafi Mirak, T., Dastfal, M., Andarzian, B., Farzadi, H., Bahari, M., & Zali, H. (2018). Stability analysis of grain yield of durum wheat promising lines in warm and dry areas using parametric and non-parametric methods. *Journal of Crop Production and Processing*, 8(2), 79-96. [In Persian]
- Nezami, S., Nemati, S. H., Aroiee, H., & Kafi, M. (2022). Half diallel analysis of related traits to yield and fruit quality in tomato lines. *Iranian Journal of Horticultural Science*, 52(4), 1011-1025. [In Persian]
- Nazary, H., Rostaii, M., & Alavi Siney, S. M. (2023). Selection of superior bread wheat lines under rainfed condition of Zanjan based on moroho-phenological traits. *Environmental Stresses in Crop Sciences*, 16(2), 547-560. [In Persian]

- Rahaii, J., Hassanpour Asil, M., Samizadeh Lahiji, H., & Onsinejad, R. (2016). Investigation the relationship between fruit morphologic characteristics and quality in tomato lines via correlation coefficients and path analysis. *Iranian Journal of Horticultural Science*, 47(2), 233-245. [In Persian]
- Rehman, F., Saeed, A., Yaseen, M., Shakeel, A., Ziaf, K., Munir, H., Tariq, S. A., Raza, M. A., & Riaz, A. (2019). Genetic evaluation and characterization using cluster heat map to assess NaCl tolerance in tomato germplasm at the seedling stage. *Chilean Journal of Agricultural Research*, 79(1), 56-65.
- Sekhar L., Prakash, B.G., Salimath, P.M., Hiremath, P., Sridevi, O., & Patil, A. A. 2010. Implications of heterosis and combining ability among productive single cross hybrids in tomato. *Electronic Journal of Plant Breeding*, 1(4), 706-711.
- Siddiqui, M. H., Alamri, S., Alsubaie, Q. D., Ali, H. M., Khan, M. N., Al-Ghamdi, A., Ibrahim, A. A., & Alsadon, A. (2020). Exogenous nitric oxide alleviates sulfur deficiency-induced oxidative damage in tomato seedlings. *Nitric Oxide*, 94, 95-107.
- Vakili Bastam, S., Ahmadi Och Tappe, H., Bohlul, H., Shameli, S., Mohammadnia, K., & Ghasemi, J. (2023). Adaptation Evaluation and Quantitative and Qualitative Comparison of New Hybrid Tomato (*Solanum lycopersicum*) Genotypes in the Farms of Golestan Province. *Journal of Crop Production and Processing*, 13(2), 57-72. [In Persian]
- Zali, H. & Barati, A. (2020). Evaluation of selection index of ideal genotype (SIIG) in other to selection of barley promising lines with high yield and desirable agronomy traits. *Jouranal of Crop Breeding*, 12(34), 93-104. [In Persian]
- Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T., Asghari, A. & Zeinalabedini, M. (2017). Appropriate strategies for selection of drought tolerant genotypes in canola. *Jouranal of Crop Breeding*, 78(20), 77-90. [In Persian]
- Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T., Asghari, A. & Hoseini, S. M. (2015). Appraising of drought tolerance relying on stability analysis indices in canola genotypes simultaneously, using selection index of ideal genotype (SIIG) technique: Introduction of new method. *Biological Forum - An International Journal*, 7(2), 703-711.