



بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های کلزا با استفاده از تجزیه بای پلات

سیده زهرا حسینی

عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان،

(نویسنده مسوول: hosseini@bkatu.ac.ir)

تاریخ دریافت: ۹۳/۸/۱۷ تاریخ پذیرش: ۹۴/۵/۳

چکیده

خشک‌سالی یکی از مهم‌ترین تنش‌های زیست‌محیطی است که اثر مخربی بر رشد گیاهان و بهره‌وری محصولات زراعی در سرتاسر جهان دارد. به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد و بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی، ۲۰ ژنوتیپ کلزا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ژنوتیپ‌ها از نظر همه صفات با یکدیگر اختلاف معنی‌داری داشتند. همچنین عملکرد دانه، وزن هزار دانه و کارایی مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی بیشتر از سایر صفات کاهش یافت. شاخص میانگین هندسی بهره‌وری (GMP)، شاخص بهره‌وری متوسط (MP) و شاخص میانگین هارمونیک (HAM) بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش به خود اختصاص دادند. در این مطالعه از روش GT-biplot برای گروه‌بندی و تشخیص ارقام متحمل به خشکی استفاده شد. نمودار بای پلات مبتنی بر اثر متقابل ژنوتیپ × صفت (شاخص تحمل) نشان داد که ژنوتیپ Zarfam پایدارترین ژنوتیپ برای هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی می‌باشد و ژنوتیپ‌های Talent و Talye به‌عنوان حساس‌ترین ژنوتیپ‌ها به تنش خشکی شناسایی شدند. لذا می‌توان گفت استفاده از روش آماری GT-biplot اطلاعات بسیار مفیدی در بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های کلزا در شرایط تنش رطوبتی فراهم می‌نماید.

واژه‌های کلیدی: اثر متقابل ژنوتیپ × صفت، خشک‌سالی، شاخص تحمل، GT-biplot

مقدمه

گیاهان در مراحل مختلف رشد و نمو خود با تنش‌های زیستی و غیرزیستی مواجه می‌شوند. در این بین تنش خشکی مهم‌ترین عامل غیرزیستی است که با گرم شدن کره زمین و بیشتر شدن احتمال رخداد خشک‌سالی، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ عملکرد محصولات کشاورزی در ۵۰ درصد زمین‌های کشاورزی جهان را با خطر جدی مواجه سازد که این امر موجب کاهش چشمگیر تولید محصولات غذایی خواهد شد (۱). با این حال جمعیت جهان به‌طور پیوسته در حال افزایش است به طوری که بر اساس پیش‌بینی‌ها جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۹ میلیارد نفر خواهد رسید که نیازمند تأمین غذایی می‌باشند (۶). به این ترتیب اصلاح ارقام متحمل به تنش خشکی با کارایی مصرف آب بیشتر و شناسایی واریته‌های گیاهی مقاوم به تنش خشکی که عملکرد آن‌ها کمتر تحت تأثیر خشکی باشد، برای مناطقی از جهان که در معرض خشک‌سالی هستند، از جمله ایران، یک ضرورت به شمار می‌رود (۱۹).

در سال‌های اخیر میزان نیاز به تولید روغن نباتی کشور به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. از این رو لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت و منسجم، برای تأمین روغن مصرفی کشور غیرقابل انکار خواهد بود (۷). کلزا (*Brassica napus* L.) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دانه‌های روغنی بوده و در میان گیاهان دانه روغنی در جایگاه سوم قرار دارد (۱۰) و بعد از سویا

مهم‌ترین منبع تولید روغن خوراکی جهان به حساب می‌آید. این گیاه با ویژگی‌های خاص زراعی از جمله دامنه گسترده سازگاری به انواع شرایط آب و هوایی و دارا بودن دو تیپ پاییزه و بهاره می‌تواند در برنامه تناوب زراعی در مناطق مختلف کشت شود و امکان استفاده حداکثر از منابع آبی و خاکی را فراهم نماید (۱۵،۹). اگرچه کمبود آب در بسیاری از مراحل نمو، عملکرد کلزا را کاهش می‌دهد ولی اثرات منفی تنش در طی مرحله گلدهی و رسیدگی گیاه بسیار بارزتر است (۲۱). با توجه به حادث شدن تنش خشکی در طی مراحل گلدهی تا رسیدگی کلزا و متفاوت بودن زمان وقوع و شدت تنش طی سال‌های مختلف در ایران، شناسایی ارقام کلزا که در شرایط محدودیت آب، بتوانند عملکرد قابل قبولی تولید کنند، از اهمیت خاصی برخوردار است (۵،۴). شاخص‌های متفاوتی جهت گزینش ژنوتیپ‌ها بر اساس تظاهر آن‌ها در محیط‌های با شرایط دشوار و عادی ارائه شده است (۲).

شاخص حساسیت (SSI)^۱ به تنش بیشتر برای تعیین تحمل نسبی تنش مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چه مقدار این شاخص کوچک‌تر باشد، میزان مقاومت به خشکی بیشتر است (۳). روزلی و هامبلین (۱۷) شاخص تحمل (TOL)^۲ و میانگین بهره‌وری متوسط (MP)^۳ را ارائه کردند. مقادیر بالای شاخص تحمل نمایانگر حساسیت بیشتر لاین‌ها به خشکی می‌باشد (۱۷). جهت شناسایی ژنوتیپ‌هایی با عملکرد بالا تحت هر دو شرایط تنش و

تنش خشکی کاهش معنی‌دار تعداد خورجین در گیاه، تعداد دانه در خورجین، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، درصد روغن دانه و عملکرد روغن پنج رقم کلزا را سبب شد (۱۲).

هدف از انجام این آزمایش علاوه بر بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه کلزا و اجزای عملکرد آن، محاسبه شاخص کارایی مصرف آب و ارزیابی شاخص‌های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ‌های کلزا به‌منظور توسعه ارقام متحمل این محصول برای منطقه مورد مطالعه و مناطق با اقلیم مشابه بود.

مواد و روش‌ها

تعداد ۲۰ ژنوتیپ کلزا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به‌طور جداگانه در دو محیط تنش کم‌آب یاری و بدون تنش کم‌آبیاری کشت گردیدند و برای جلوگیری از تداخل رطوبت بین دو محیط، فاصله ۱۰ متری لحاظ شده بود. هر کرت آزمایشی شامل ۵ ردیف به طول ۵ متر با فواصل ردیف ۳۰ سانتی‌متر و فاصله بین کرت‌ها ۶۰ سانتی‌متر بود. فاصله بین بلوک‌ها ۱/۵ متر در نظر گرفته شد. عملیات کاشت در اواخر شهریور ماه انجام شد. وجین علف‌های هرز به‌صورت دستی طی دوره رشد در چند مرحله در درون و بین کرت‌ها، بین بلوک‌ها و بین دو سایت صورت گرفت. عمل تنک کردن در مرحله روزت کامل صورت گرفت به‌طوری‌که در نهایت تراکم ۸۰ بوته در مترمربع به‌دست آمد. بعد از کشت به‌منظور رسیدن به سطح سبز یکنواخت در هر دو قطعه آبیاری انجام شد. در مراحل بعدی متناسب با مراحل رشدی گیاه و نیاز آبی، آبیاری در هر دو سایت به‌طور یکسان صورت گرفت و فقط در مرحله آخر آبیاری که گیاهان در مراحل انتهایی گلدهی و شروع غلاف‌دهی بودند (حدود مرحله ۹۰ درصد گلدهی)، در قطعه تحت تنش آبیاری صورت نگرفت، ولی در قطعه‌ی دیگر آبیاری صورت گرفت. قابل‌ذکر است که جهت اطمینان از وضعیت رطوبت خاک و تعیین زمان نیاز به آبیاری، در طی فصل رشد به‌طور مداوم از خاک هر دو محیط تحت تنش و بدون تنش نمونه‌برداری صورت می‌گرفت و رطوبت خاک به روش وزنی محاسبه می‌شد.

ژنوتیپ‌های مورد بررسی در این تحقیق عبارت بودند از: Licord, Geronimo, Dante, Celecious, ARC5, ARC2, Shiralee, Sahra, Rainbow, Opera, Milena, Okapi, Zarfam, Talent, Talaye, Sunday, SLM-046, Hyola420, Hyola330 و RGS. به‌منظور ارزیابی ژنوتیپ‌ها، صفات گیاهی شامل تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزاردانه، درصد روغن دانه، درصد پروتئین دانه، تعداد روز تا رسیدگی و عملکرد کل یادداشت‌برداری شد. جهت نمونه‌برداری از پنج ردیف، دو ردیف به‌عنوان اثر حاشیه‌ای حذف و از سه ردیف باقیمانده، ۱۰ بوته به‌تصادف انتخاب و یادداشت‌برداری از صفات انجام شد. شاخص‌های مختلف تحمل و حساسیت به

مطلوب، شاخص میانگین هندسی بهره‌وری (GMP)^۱ و شاخص تحمل به تنش (STI)^۲ استفاده می‌شود. مقدار بالای شاخص تحمل به تنش برای یک ژنوتیپ، بیانگر تحمل به خشکی بالاتر و عملکرد بالقوه بیشتر آن ژنوتیپ می‌باشد (۲). از میانگین همساز عملکرد (Harm)^۳ در شرایط تنش و نرمال نیز در ارزیابی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش استفاده می‌گردد (۱۸). مطالعاتی که باهدف بررسی کارایی انواع معیارهای تحمل به خشکی صورت گرفت، نشان داد که هنگامی که هدف اصلاح‌گر افزایش عملکرد در شرایط تنش باشد، شاخص TOL و هنگامی که افزایش عملکرد در هر دو محیط عادی و تنش موردنظر باشد، گزینش بر اساس شاخص MP بهتر می‌باشد. شاخص میانگین هندسی عملکرد (GMP) حساسیت کمتری به مقادیر مختلف عملکرد در شرایط بدون تنش (YP) و شرایط تنش (YS) دارد، در صورتی که شاخص میانگین بهره‌وری (MP) چون بر اساس میانگین حسابی است، زمانی که اختلاف نسبی زیادی بین عملکرد در دو شرایط وجود داشته باشد، اریب زیادی به‌طرف عملکرد در شرایط بدون تنش خواهد داشت (۲). همچنین شاخص SSI برای اصلاح تحت تنش‌هایی با شدت کم مناسب می‌باشد، در صورتی که شاخص‌های STI، GMP و MP برای تنش‌هایی با شدت بالا پیشنهاد می‌شوند (۲۲). به‌طور کلی می‌توان گفت انتخاب معیار گزینش، به هدف اصلاح‌گر و شدت تنش بستگی دارد (۱۷).

در مطالعه‌ای که باهدف بررسی تغییرات محتوای دانه کلزا در خاک‌های خشک صورت گرفت، چنین نتیجه‌گیری شد که تنش کمبود آب عملکرد دانه در کلزا را به‌طور معنی‌داری کاهش می‌دهد (۸). در مطالعه دیگری که باهدف بررسی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد صورت گرفت، رقم Lillian با بیشترین تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و همچنین بالاترین میزان شاخص‌های GMP و STI به‌عنوان رقم متحمل به خشکی با پتانسیل عملکرد بالا در هر دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی شناسایی شد (۱۹). نتایج تحقیق دیگری که بر روی رابطه بین تحمل به تنش خشکی با تعدادی از صفات فیزیولوژی در ۲۲ ژنوتیپ کلزا صورت گرفت، نشان داد که میزان عملکرد دانه و روغن در شرایط تنش کاهش یافت، همچنین بین ژنوتیپ‌های کلزا در این صفات نیز تفاوت معنی‌داری وجود داشت (۱۶). نتایج مطالعه‌ای که باهدف بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و نیز انتخاب بهترین شاخص تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های کلزا صورت گرفته بود، نشان داد که ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه با شاخص‌ها در شرایط تنش خشکی و آبیاری مطلوب معنی‌دار بود، به‌طوری‌که تحت تنش خشکی شاخص‌های GMP، HARM و STI و در شرایط مطلوب شاخص‌های SSI، MP و TOL بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه دارا بودند. به‌طور کلی در هر دو محیط آبیاری و تنش خشکی شاخص MP و TOL به‌عنوان بهترین شاخص‌ها شناخته شدند (۱۳). در بررسی دیگری اعمال

خشکی برای ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌ها با استفاده از روابط ۶-۱

<p>محاسبه شد:</p> $SSI = \frac{1 - \frac{Y_s}{Y_p}}{1 - \frac{\bar{Y}_s}{\bar{Y}_p}}$ $STI = \frac{Y_p \cdot Y_s}{(\bar{Y}_p)^2}$ $TOL = Y_p - Y_s$ $MP = \frac{Y_p + Y_s}{2}$ $GMP = \sqrt{Y_p \cdot Y_s}$ $Harm = \frac{2}{\frac{1}{Y_p} + \frac{1}{Y_s}}$	<p>شاخص حساسیت به تنش</p> <p>شاخص تحمل تنش</p> <p>شاخص تحمل</p> <p>شاخص بهره‌وری متوسط</p> <p>شاخص میانگین هندسی بهره‌وری</p> <p>شاخص میانگین هارمونیک</p>
--	--

نشان می‌دهد. تصویر چندضلعی بای‌پلات کوتاه‌ترین راه برای خلاصه کردن الگوی داده‌های ژنوتیپ × صفت در یک مجموعه از داده‌هاست. چندضلعی با پیوستن ژنوتیپ‌هایی که دورترین فاصله را از مبدأ بای‌پلات داشتند ترسیم شد. به این ترتیب تعدادی از ژنوتیپ‌ها در رئوس چندضلعی و مابقی ژنوتیپ‌ها درون چندضلعی واقع شدند. همچنین خطوط عمودی از مبدأ بای‌پلات بر هر ضلع چندضلعی کشیده و چندضلعی به چند قسمت تقسیم شد. این تصویر به شناسایی ژنوتیپ‌های برخوردار از بالاترین ارزش‌ها برای یک یا چند صفت کمک می‌کند. به عنوان یک قاعده کلی، ژنوتیپ‌هایی که در رأس‌های چندضلعی قرار می‌گیرند از بالاترین مقدار برای صفاتی که در کنار ژنوتیپ در یک بخش قرار می‌گیرند برخوردار هستند. در این روش کسینوس زاویه بین دو صفت، برآوردی از ضریب همبستگی بین صفات را نشان می‌دهد، به طوری که هر چه قدر زاویه بین بردار دو صفت بسته‌تر باشد همبستگی بین آن‌ها بیشتر است و بالعکس (۲۵).

کارایی مصرف آب (WUE)^۱ نیز با تعیین نسبت عملکرد دانه در واحد سطح به مقدار کل آب مصرفی محاسبه شد (۲۳). کل آب مصرفی با در نظر گرفتن بارندگی مؤثر طی فصل رشد و تعداد دفعات آبیاری محاسبه شد. میزان کل آب مصرفی در شرایط تنش، مشابه شرایط غیر تنش بود، به جز اینکه در شرایط تنش یک آب کمتر داده شد، لذا مقدار کل آب مصرفی در شرایط تنش حدود ۷۰ میلی‌متر (۷۰۰ مترمکعب در هکتار) کمتر از شرایط غیرتنش بود.

رابطه بین شاخص‌های تحمل و صفات مورد مطالعه مخصوصاً عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس آن شاخص‌ها متحمل‌ترین و حساس‌ترین ژنوتیپ‌ها مشخص شد. برای تجزیه و تحلیل‌های آماری و رسم نمودارها از نرم‌افزارهای Excel 2013، GGE Biplot v6.3 و SAS v9.2 استفاده شد.

در روابط بالا Y_s : عملکرد بالقوه هر ژنوتیپ تحت شرایط تنش، Y_p : عملکرد بالقوه هر ژنوتیپ تحت شرایط بدون تنش، \bar{Y}_s : میانگین عملکرد تمامی ژنوتیپ‌ها تحت شرایط تنش، \bar{Y}_p : میانگین عملکرد تمامی ژنوتیپ‌ها تحت شرایط بدون تنش می‌باشد.

مقایسات میانگین صفات با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنی‌دار (LSD) صورت گرفت. برای اینکه تفاوت معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها به طور دقیق‌تر محاسبه و به اثر متقابل ژنوتیپ × محیط نسبت داده نشود، تجزیه مرکب انجام شد تا بر اساس آن اثر متقابل ژنوتیپ × محیط محاسبه و از اثر واقعی ژنوتیپ‌ها جدا شده و واریانس حقیقی ژنوتیپ‌ها مورد آزمون قرار گیرد. در این تجزیه، ژنوتیپ به عنوان فاکتور ثابت و محیط به عنوان فاکتور تصادفی آزمایشی در نظر گرفته شد و آزمون فرض معنی‌دار بودن تفاوت حقیقی بین ژنوتیپ‌ها بر مبنای امید ریاضی میانگین مربعات منابع تغییر مختلف انجام شد. از تجزیه بای‌پلات ژنوتیپ × صفت (GT) برای تشخیص الگوها و روابط بین ژنوتیپ‌ها و صفات مورد مطالعه استفاده شد. مدل آماری این روش بر اساس رابطه زیر است:

$$\frac{T_{ij} - \bar{T}_j}{S_j} = \{1 < i_1 \dagger j_1 + \} 2 < i_2 \dagger j_2 + v_{ij}$$

که در این رابطه T_{ij} : میانگین صفت i برای صفت j ; \bar{T}_j : میانگین صفت j روی همه میانگین‌ها، S_j : انحراف معیار صفت j ; $\{1$ و $\} 2$: به ترتیب مقادیر منفرد مؤلفه‌های اصلی اول و دوم، $< i_1$ و $< i_2$: به ترتیب مقادیر PC1 و PC2 برای ژنوتیپ i ، $\dagger j_1$ و $\dagger j_2$: به ترتیب مقادیر PC1 و PC2 برای صفت j و v_{ij} : باقی‌مانده مربوط به مدل ژنوتیپ i و صفت j را

نتایج و بحث

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات مورفولوژیکی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در شرایط عادی و تنش رطوبتی، تفاوت بین ژنوتیپ‌ها برای کلیه صفات در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار بود (جداول ۱ و ۲). نتایج تجزیه مرکب داده‌ها در جدول ۳ ارائه شده است. اثر متقابل ژنوتیپ × محیط برای تمامی صفات به جزء ارتفاع بوته معنی‌دار بود، این بدین مفهوم است که ژنوتیپ‌های مختلف در شرایط محیطی مختلف واکنش متفاوتی نشان داده‌اند. به عبارت دیگر پاسخ ژنوتیپ‌ها به دو محیط یکسان نیست. به دلیل اثرات متقابل شدید ژنوتیپ × محیط، اصلاح گیاهان زراعی برای سازگاری به دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی، اگرچه غیرممکن نیست، اما بسیار دشوار است. در برنامه‌های به‌نژادی به‌طور معمول، ژنوتیپ‌هایی به‌عنوان سازگار شناخته می‌شوند که واریانس اثر متقابل آن‌ها با محیط اندک باشد (۲۶).

نتایج آزمون مقایسه میانگین به روش حداقل تفاوت معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها برای کلیه صفات اندازه‌گیری شده در شرایط تنش و بدون تنش به ترتیب در جداول ۴ و ۵ ارائه شده است. در شرایط بدون تنش رقم Geronimo با ۳۶۶۸ کیلوگرم در هکتار و رقم Sunday با ۱۷۱۴ کیلوگرم در هکتار، به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد را در واحد سطح به خود اختصاص دادند و ارقام Shirale، Dante و Licord به ترتیب با ۳۵۰۵/۳، ۳۵۳۴/۷ و ۳۴۸۶/۳ کیلوگرم در هکتار، در رتبه‌های دوم تا چهارم میزان عملکرد قرار گرفتند. در شرایط تنش خشکی، بیشترین عملکرد مربوط به رقم Zarfam با ۲۹۴۸ کیلوگرم در هکتار بود و کمترین آن به رقم Talent با ۸۷۶/۳ کیلوگرم در هکتار تعلق داشت. تنش رطوبتی باعث شد تا میانگین عملکرد به میزان ۳۳/۸ درصد در مقایسه با شرایط عادی کاهش یابد. در مجموع رقم Zarfam با میانگین کلی (شرایط عادی و تنش) ۳۱۵۶

کیلوگرم در هکتار و رقم Ddante با میانگین ۳۱۸۲/۶ کیلوگرم در هکتار از بیشترین عملکرد برخوردار بودند و ارقام Milena و Sunday با میانگین کلی ۱۳۲۳/۵ و ۱۳۱۲/۵ کیلوگرم در هکتار، از کمترین عملکرد در هکتار برخوردار بودند. در بررسی عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف کلزا تحت دو شرایط تنش رطوبتی و بدون تنش، عملکرد دانه در تیمار تنش خشکی حدود ۳۰ درصد کمتر از شرایط بدون تنش بود که ریزش خورجین‌ها در شرایط تنش عامل آن معرفی شد (۱۱).

بر اساس جدول مقایسه میانگین ارقام Geronimo و Milena به ترتیب دارای بیشترین و کمترین وزن هزاردانه در شرایط بدون تنش بودند. در محیط تنش رطوبتی رقم Zarfam بیشترین و ارقام Milena و Sunday دارای کمترین وزن هزاردانه بودند. وزن هزاردانه در شرایط بدون تنش بین ۲/۷۴ تا ۴/۴۶ گرم و در شرایط تنش بین ۲/۰۱ تا ۳/۷۳ گرم متغیر بود و در مجموع وزن هزار دانه در اثر تنش رطوبتی ۲۴/۴ درصد کاهش نشان داد. در هر دو محیط تنش و بدون تنش، ارقام Dante و SLM-046 از نظر وزن هزار دانه، در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند. تشابه رتبه‌بندی ژنوتیپ‌ها بر اساس وزن هزار دانه و عملکرد دانه در هر دو محیط نشان از همبستگی بالای این دو صفت دارد. ژنوتیپ‌های Milena و Sunday کم‌ترین تغییر رتبه از نظر صفات وزن هزار دانه و عملکرد دانه در هر دو محیط داشتند، که نشان از سهم پایین این دو ژنوتیپ در اثر متقابل ایجاد شده و پایداری مناسب این دو ژنوتیپ برای هر دو محیط می‌باشد. اما به علت پایین بودن عملکرد دانه به عنوان مهم‌ترین صفت از انتخاب آن‌ها چشم‌پوشی شد، ولی می‌توان با وارد نمودن این دو ژنوتیپ در برنامه‌های اصلاحی به‌منظور افزایش عملکرد از این پایداری مشاهده‌شده استفاده بهینه نمود.

جدول ۱- تجزیه واریانس صفات مختلف در شرایط بدون تنش

Table 1. Analysis of variance for different traits under non-stress condition

میانگین مربعات											
منابع تغییرات	درجه آزادی	عملکرد دانه (kg/ha)	وزن هزار دانه (g)	تعداد دانه در خورجین	تعداد خورجین در بوته	طول خورجین (cm)	درصد روغن دانه (%)	روز تا رسیدگی	درصد پروتئین دانه (%)	ارتفاع بوته (cm)	کارایی مصرف آب (WUE)
بلوک	۲	۱۳۷۷۲/۰۷	۰/۰۰	۰/۰۰	۶۳/۰۵	۰/۰۱	۰/۴۱	۱/۶۲	۰/۶۲	۱/۲۲	۰/۰۴
ژنوتیپ	۱۹	۱۱۸۱۴۴۲/۲۲**	۰/۶۸**	۳۳/۱۴**	۴۶۷۲/۰۵**	۰/۵۳**	۱۵/۹۹**	۲۲/۲۷**	۱/۳۷**	۶۵/۴۷**	۳/۲۸**
خطای آزمایشی	۳۸	۲۴۴۶۸/۱۹	۰/۰۰	۰/۳۹	۲۵/۲۸	۰/۰۱	۰/۱۵	۰/۳۰	۰/۵۹	۴/۷۶	۰/۰۷
ضریب تغییرات		۵/۳۸	۱/۱۹	۲/۴۵	۲/۳۰	۱/۰۹	۰/۹۵	۰/۲۲	۳/۱۰	۱/۲۴	۵/۳۹

*: معنی‌دار در سطح ۵ درصد، **: معنی‌دار در سطح ۱ درصد و NS: غیر معنی‌دار

جدول ۲- تجزیه واریانس صفات مختلف در شرایط تنش خشکی

Table 2. Analysis of variance for different traits under drought stress condition

میانگین مربعات											
منابع تغییرات	درجه آزادی	عملکرد دانه (kg/ha)	وزن هزار دانه (g)	تعداد دانه در خورجین	تعداد خورجین در بوته	طول خورجین (cm)	درصد روغن دانه (%)	روز تا رسیدگی	درصد پروتئین دانه (%)	ارتفاع بوته (cm)	کارایی مصرف آب (WUE)
بلوک	۲	۱۱۴۶/۶۰	۰/۰۰	۰/۹۵	۱۹۳/۸۵	۰/۰۰	۰/۰۵	۰/۳۲	۰/۵۵	۱/۴۳	۰/۰۱
ژنوتیپ	۱۹	۱۵۰۹۹۹۳/۱۰**	۰/۷۷**	۲۴/۱۹**	۴۲۲۲/۳۳**	۰/۹۵**	۱۶/۰۷**	۱/۴۰**	۶/۰۲**	۷۷/۱۰**	۵/۳۸**
خطای آزمایشی	۳۸	۴۱۵۹/۶۷	۰/۰۰	۰/۳۰	۲۰/۵۷	۰/۰۰	۰/۱۰	۰/۴۰	۰/۵۵	۱/۵۳	۰/۰۲
ضریب تغییرات		۳/۱۲	۱/۲۲	۲/۳۳	۲/۱۶	۰/۶۹	۰/۸۲	۰/۲۷	۳/۲۰	۰/۷۱	۳/۳۱

*: معنی‌دار در سطح ۵ درصد، **: معنی‌دار در سطح ۱ درصد و NS: غیر معنی‌دار

جدول ۳- نتایج آزمایش تجزیه مرکب برای صفات مورد بررسی در ژنوتیپ‌های کلزا

Table 3. Results of combined analysis for different traits of canola genotypes

میانگین مربعات											
منابع تغییرات	درجه آزادی	عملکرد دانه (kg/ha)	وزن هزار دانه (g)	تعداد دانه در خورجین	تعداد خورجین در بوته	طول خورجین (cm)	درصد روغن دانه (%)	روز تا رسیدگی	درصد پروتئین دانه (%)	ارتفاع بوته (cm)	کارایی مصرف آب (WUE)
محیط	۱	۲۱۱۶۲۱۲/۴۱*	۱۸/۱۵**	۱۰۸/۳۰**	۱۹۲/۰۰**	۴/۸۹**	۲۲۴/۱۳**	۳۲۱۳/۶۸**	۶۴/۸۳**	۱۱۱/۵۵**	۲۶/۸۵**
تکرار داخل محیط	۴	۷۴۵۹/۲۳	۰/۰۰	۰/۴۸	۱۲۸/۴۵	۰/۰۱	۰/۲۳	۰/۹۷	۰/۵۸	۱/۳۳	۰/۰۲
ژنوتیپ	۱۹	۲۶۱۹۵۸۰/۸۱**	۱/۳۸**	۵۵/۲۳**	۸۹۳۶/۳۳**	۱/۴۳**	۳۰/۴۳**	۱۵/۲۴**	۱۱/۹۶**	۱۳۹/۴۳**	۸/۳۴**
ژنوتیپ × محیط	۱۹	۷۱۸۵۵/۵۱**	۰/۰۸**	۲/۱۱**	۵۸/۰۵**	۰/۰۵**	۱/۶۳**	۸/۴۳**	۱/۴۴**	۳/۱۴ ^{NS}	۰/۳۳**
اشتباه آزمایشی	۷۶	۱۴۳۱۳/۹۳	۰/۰۰	۰/۳۴	۲۲/۹۲	۰/۰۰	۰/۱۳	۰/۲۵	۰/۵۷	۳/۱۴	۰/۰۴
ضریب تغییرات		۴/۸۱	۱/۲۱	۲/۴۰	۲/۲۴	۰/۹۲	۰/۸۹	۰/۲۴	۳/۱۵	۱/۰۲	۴/۷۱

*: معنی‌دار در سطح ۱ درصد و NS: غیر معنی‌دار

جدول ۴- مقایسه میانگین صفات اندازه‌گیری شده در ۲۰ ژنوتیپ کلزا در شرایط محیطی بدون تنش


Table 4. Mean comparison of measured traits under non-stress condition in 20 canola genotypes

ژنوتیپ	ارتفاع بوته (cm)	درصد پروتئین دانه (%)	روز تا رسیدگی	درصد روغن دانه (%)	طول خورجین (cm)	تعداد خورجین در بوته	تعداد دانه در خورجین	وزن هزار دانه (g)	عملکرد دانه (kg/ha)
ARC2	۱۷۵/۸	۲۴/۸۶	۲۵۳/۷	۴۱/۳۷	۷/۸۲	۲۴۱/۳	۲۸/۳	۳/۸۱	۳۱۸۳/۳
ARC5	۱۷۶/۵	۲۳/۲۰	۲۵۴/۳	۴۰/۴۷	۷/۸۶	۲۳۵/۳	۲۹/۳	۳/۳۹	۳۲۹۲/۰
Celecious	۱۶۷/۸	۲۵/۰۳	۲۴۸/۷	۳۷/۶۳	۶/۶۵	۱۹۶/۰	۲۰/۷	۳/۰۴	۱۹۷۸/۰
Dante	۱۸۰/۵	۲۵/۶۰	۲۴۹/۷	۴۳/۲۷	۷/۹۹	۲۴۹/۷	۲۹/۷	۴/۲۱	۳۵۰۵/۳
Geronimo	۱۷۷/۹	۲۵/۲۶	۲۵۴/۳	۴۱/۴۰	۷/۸۰	۲۵۴/۰	۲۵/۷	۴/۴۶	۳۶۶۸/۰
Licord	۱۸۰/۲	۲۷/۲۰	۲۵۳/۷	۴۴/۵۳	۷/۸۴	۲۷۷/۰	۲۸/۷	۳/۷۸	۳۴۸۶/۳
Milena	۱۷۲/۰	۲۳/۰۳	۲۵۰/۷	۴۰/۶۷	۶/۸۵	۱۷۵/۳	۲۳/۳	۲/۷۴	۱۷۶۵/۰
Opera	۱۷۷/۰	۲۳/۹۶	۲۴۷/۳	۴۳/۳۳	۷/۲۱	۱۹۳/۳	۲۳/۷	۳/۰۹	۲۱۹۷/۳
Rainbow	۱۷۱/۶	۲۵/۸۳	۲۴۶/۳	۴۰/۲۳	۶/۸۸	۱۹۳/۰	۲۰/۳	۳/۱۷	۲۱۷۷/۷
Sahra	۱۷۳/۷	۲۴/۰۳	۲۴۶/۳	۳۸/۹۰	۷/۴۷	۲۳۵/۳	۲۳/۷	۳/۷۹	۲۸۸۱/۰
Shiralee	۱۷۵/۰	۲۶/۱۰	۲۴۷/۷	۴۰/۹۷	۷/۵۰	۲۲۸/۷	۲۵/۳	۳/۶۲	۳۵۳۴/۷
SLM046	۱۸۲/۳	۲۷/۸۶	۲۴۹/۳	۴۳/۲۳	۷/۹۹	۲۵۱/۳	۲۹/۷	۴/۱۶	۳۴۵۳/۳
Sunday	۱۷۲/۶	۲۲/۹۶	۲۵۱/۰	۳۷/۲۰	۶/۹۴	۱۴۱/۳	۲۱/۷	۲/۹۶	۱۷۱۴/۰
Talaye	۱۸۴/۰	۲۰/۹۶	۲۵۲/۳	۴۲/۹۰	۷/۷۰	۲۲۶/۷	۲۷/۷	۳/۷۲	۳۰۸۹/۰
Talent	۱۷۶/۴	۲۴/۷۶	۲۴۷/۷	۳۶/۱۰	۶/۹۸	۱۲۱/۷	۱۹/۳	۳/۴۱	۲۰۱۴/۷
Zarfam	۱۷۷/۷	۲۵/۷	۲۴۵/۷	۴۲/۳۷	۷/۸۱	۲۵۹/۳	۲۸/۷	۳/۹۲	۳۳۶۴/۳
Okapi	۱۷۸/۳	۲۴/۵۷	۲۵۱/۷	۴۳/۲۰	۷/۸۰	۲۴۷/۰	۲۸/۳	۳/۶۶	۳۱۷۴/۷
Hyola420	۱۷۱/۳	۲۵/۵۳	۲۴۹/۳	۴۳/۳۰	۷/۳۸	۲۱۴/۷	۲۴/۷	۳/۰۹	۲۹۳۲/۳
Hyola330	۱۶۹/۳	۲۳/۶	۲۴۹/۳	۴۲/۶۷	۷/۴۰	۲۰۸/۰	۲۵/۳	۳/۱۲	۳۰۲۴/۷
RGS	۱۶۷/۰	۲۴/۵	۲۴۹/۷	۴۰/۲۳	۷/۲۸	۲۱۵/۰	۲۵/۰	۳/۱۷	۳۰۸۶/۳
مقدار %۵ LSD	۳/۶۰	۱/۲۶	۰/۹۰	۰/۶۴	۰/۱۳	۸/۳۱	۱/۰۲	۰/۰۶	۲۵۸/۵۵
مقدار %۱ LSD	۴/۸۲	۱/۶۹	۱/۲۱	۰/۸۶	۰/۱۷	۱۱/۱۳	۱/۳۷	۰/۰۹	۳۴۶/۳۲

جدول ۵- مقایسه میانگین صفات اندازه‌گیری شده در ۲۰ ژنوتیپ کلزا در شرایط محیطی تنش

Table 5. Mean comparison of measured traits under stress condition in 20 canola genotypes

ژنوتیپ	ارتفاع بوته (cm)	درصد پروتئین دانه (%)	روز تا رسیدگی	درصد روغن دانه (%)	طول خورجین (cm)	تعداد خورجین در بوته	تعداد دانه در خورجین	وزن هزار دانه (g)	عملکرد دانه (kg/ha)
ARC2	۱۷۴/۵	۲۳/۲۶	۲۴۰/۰	۳۹/۴۰	۷/۳۸	۲۳۴/۰	۲۴/۷	۲/۹۱	۲۴۰۵/۳
ARC5	۱۷۵/۶	۲۴/۰۳	۲۴۰/۳	۳۸/۳۳	۷/۳۶	۲۳۳/۰	۲۴/۳	۳/۰۴	۲۴۴۰/۳
Celecious	۱۶۵/۱	۲۳/۰۰	۲۳۹/۷	۳۶/۳۳	۵/۹۰	۱۹۱/۳	۱۹/۷	۲/۲۷	۱۰۴۳/۰
Dante	۱۷۸/۵	۲۵/۳۰	۲۳۸/۷	۴۰/۹۰	۷/۸۷	۲۳۷/۳	۲۷/۷	۳/۶۸	۲۸۶۰/۰
Geronimo	۱۷۸/۱	۲۲/۹۰	۲۴۰/۰	۳۷/۸۳	۷/۳۲	۲۴۷/۳	۲۳/۷	۳/۳۸	۲۵۵۸/۰
Licord	۱۷۸/۹	۲۴/۴۳	۲۳۹/۷	۴۱/۱۷	۷/۴۲	۲۴۷/۳	۲۵/۳	۲/۸۸	۲۴۳۹/۰
Milena	۱۷۰/۳	۲۰/۸۳	۲۳۹/۷	۳۶/۷۰	۶/۴۰	۱۶۰/۷	۲۱/۳	۲/۰۱	۸۷۹/۰
Opera	۱۷۵/۳	۲۳/۰۳	۲۳۹/۳	۴۰/۶۰	۶/۸۳	۱۸۸/۷	۲۱/۳	۲/۳۹	۲۱۰۷/۰
Rainbow	۱۶۹/۳	۲۳/۰۶	۲۳۸/۷	۳۶/۸۰	۶/۳۴	۱۸۲/۰	۱۹/۷	۲/۲۱	۱۰۷۵/۰
Sahra	۱۷۱/۷	۲۳/۵۰	۲۳۹/۳	۳۷/۸۷	۷/۲۷	۲۳۴/۷	۲۲/۳	۲/۹۳	۲۰۶۳/۳
Shiralee	۱۷۳/۵	۲۴/۸۳	۲۳۹/۷	۳۷/۷۸	۷/۳۳	۲۲۱/۳	۲۴/۷	۲/۷۴	۲۶۴۳/۳
SLM046	۱۸۰/۱	۲۵/۳۳	۲۳۸/۳	۳۹/۷۳	۷/۸۲	۲۴۱/۳	۲۴/۳	۲/۵۸	۲۸۳۳/۳
Sunday	۱۶۸/۸	۲۱/۸۰	۲۴۱/۰	۳۳/۵۷	۶/۳۳	۱۳۵/۰	۱۹/۳	۲/۱۸	۹۱۲/۰
Talaye	۱۸۰/۹	۲۰/۲۰	۲۴۰/۳	۳۸/۳۷	۷/۳۳	۲۱۷/۰	۲۴/۷	۲/۶۰	۱۸۷۷/۰
Talent	۱۷۳/۸	۲۱/۷۶	۲۳۹/۰	۳۲/۹۷	۶/۲۸	۱۱۸/۰	۱۸/۳	۲/۴۰	۸۷۶/۳
Zarfam	۱۷۹/۲	۲۴/۶۶	۲۳۸/۷	۳۹/۹۳	۷/۸۱	۲۵۵/۷	۲۸/۳	۳/۷۳	۲۹۴۸/۰
Okapi	۱۷۴/۱	۲۲/۸۶	۲۴۰/۰	۳۹/۸۷	۷/۴۱	۲۳۶/۳	۲۵/۷	۲/۷۷	۲۱۵۷/۷
Hyola420	۱۶۶/۸	۲۴/۸۹	۲۴۰/۳	۴۰/۳۰	۶/۹۶	۲۱۰/۳	۲۳/۷	۲/۶۶	۲۲۷۳/۷
Hyola330	۱۶۹/۱	۲۲/۶۶	۲۳۹/۳	۴۱/۰	۶/۹۱	۲۰۲/۷	۲۴/۳	۲/۴۳	۲۴۲۶/۰
RGS	۱۶۴/۳	۲۲/۸۳	۲۳۹/۷	۳۹/۷۳	۶/۹۰	۲۰۹/۷	۲۳/۷	۲/۵۳	۲۵۰۶/۳
مقدار %۵ LSD	۲/۰۴	۱/۲۲	۱/۰۵	۰/۵۲	۰/۰۸	۷/۴۹	۰/۹۰	۰/۰۵	۱۰۶/۶۱
مقدار %۱ LSD	۲/۷۴	۱/۶۴	۱/۴۰	۰/۷۰	۰/۱۰	۱۰/۰۴	۱/۲۱	۰/۰۷	۱۴۲/۷۹



شکل ۱- مقایسه کارایی مصرف آب (WUE) در ۲۰ ژنوتیپ کلزا مورد مطالعه
Figure 1. Comparison of water use efficiency in studied 20 canola genotypes

دارای بیشترین تحمل و کمترین حساسیت به تنش رطوبتی بودند و ارقام Sunday، Talent و Milena با کمترین مقدار GMP و MP و بیشترین مقادیر SSI و TOL از حساس‌ترین ارقام مورد بررسی بود.

تجزیه بای پلات

نتایج تجزیه بای پلات برای پنج شاخص تحمل به تنش در ژنوتیپ‌های مورد مطالعه نشان داد که مؤلفه اصلی اول، $87/6$ درصد و مؤلفه اصلی دوم $12/1$ درصد از تنوع داده‌های اولیه را توجیه نمودند (شکل ۲)، لذا استفاده از این دو مؤلفه و چشم‌پوشی از سایر مؤلفه‌ها تنها موجب از دست رفتن بخش بسیار ناچیزی از تغییرات داده‌ها شد (در حدود $0/3$ درصد از تنوع داده‌های اولیه). شکل ۲ روابط بین شاخص‌ها را نشان می‌دهد. با توجه به زوایای بردارهای هر شاخص می‌توان گفت شاخص‌های MP، GMP، STI، HAMT، Y_s و Y_p همبستگی مثبت و بالایی با یکدیگر و با بردار مؤلفه اول داشتند. درحالی‌که SSI و TOL در این مؤلفه نقش منفی داشتند. بنابراین مؤلفه اول را می‌توان مؤلفه پتانسیل یا ظرفیت عملکرد نامید که ارقام با عملکرد بالا در هر دو محیط را از سایر ارقام جدا می‌سازد. از این رو ژنوتیپ‌هایی که بیشترین مقدار را روی محور PC1 داشته باشند عملکردی بالا در هر دو شرایط دارند. با این تفاسیر ژنوتیپ‌های Zarfam، Dante و SLM046 مطلوب‌ترین ژنوتیپ‌ها از نظر عملکرد در هر دو شرایط شناخته شدند. مؤلفه دوم همبستگی بالایی با شاخص‌های SSI و TOL

شاخص‌های تحمل به خشکی


نتایج حاصل از مقایسه شاخص‌های تحمل به خشکی نشان داد (جدول ۶) که در بین ژنوتیپ‌ها، رقم Talent با $SSI=1/96$ و رقم Zarfam با $SSI=0/43$ به ترتیب حساس‌ترین و متحمل‌ترین ژنوتیپ‌ها به تنش بودند. از نظر شاخص تحمل به خشکی (TOL) در بین ارقام مورد بررسی ارقام RGS، Zarfam و Hyola330 بیشترین و ارقام Talaye، Talent و Geronimo کمترین تحمل به خشکی را نشان دادند. دامنه این شاخص در بین ارقام بین $416/3$ تا $1212/0$ کیلوگرم در هکتار بود. ارقام از نظر میانگین عملکرد در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی Zarfam بیشترین و ارقام Milena و Sunday کمترین مقدار را داشتند. از نظر شاخص میانگین هارمونیک (HAM) نیز وضعیت مشابهی با شاخص میانگین هندسی عملکرد و شاخص میانگین عملکرد مشاهده شد و ارقام Dante، Zarfam و SLM-046 دارای بیشترین و ارقام Milena و Sunday کمترین مقدار را از نظر شاخص میانگین هارمونیک داشتند. تفاوت ارقام از نظر شاخص تحمل به تنش (STI) نیز قابل ملاحظه بود. ارقام Dante و Zarfam به ترتیب با STI معادل $1/19$ ، $1/17$ و $1/16$ متحمل‌ترین و ارقام Milena و Sunday هر دو با $STI=0/18$ حساس‌ترین ارقام بودند. بر اساس اطلاعات جدول ۶ رقم Zarfam از نظر کلیه شاخص‌ها در وضعیت بهتری نسبت به سایر ارقام قرار داشت و بعد از آن به ترتیب رقم Dante و رقم SLM-046 در رتبه بعدی بود. به عبارت دیگر این ارقام

شاخص SSI را به خود اختصاص داد. ژنوتیپ‌های حاضر در نواحی ۳ را می‌توان در زمره ژنوتیپ‌های حساس به خشکی گروه‌بندی نمود. هیچ شاخصی در ناحیه ۴ وجود ندارد، بنابراین ژنوتیپ‌های محصور در این ناحیه دارای کم‌ترین مقادیر برای یک یا چند شاخص هستند. ژنوتیپ‌های ناحیه ۵ بیشترین مقادیر را برای شاخص‌های GMP، MP، Harm، STI و YS داشتند که در این ناحیه ژنوتیپ Zarfam بیشترین مقدار برای شاخص‌های مذکور را داشت و به‌عنوان مقاوم‌ترین ژنوتیپ به شرایط خشکی شناخته شد. نتایج محققان دیگر در سایر گیاهان نیز موفقیت این روش در تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × صفت را تأیید می‌نماید (۲۶، ۲۵، ۲۴). البته قابل ذکر است که اثر متقابل ژنوتیپ × محیط نیز مهم است به‌طوری که برخی محققین در بررسی ژنوتیپ‌های مختلف کلزا گزارش کرده‌اند که محیط بیشترین تأثیر را در ایجاد تنوع (واریانس) داشته است (۱۴). در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که ژنوتیپ‌های کلزا مورد مطالعه از نظر صفات اندازه‌گیری شده در هر دو محیط تنش و بدون تنش خشکی تنوع دارند. از نظر کارایی مصرف آب ارقام Dante، SLM-046 و Zarfam بهترین کارایی را به خود اختصاص دادند. روش بای‌پلات GT در گروه‌بندی و تعیین ژنوتیپ‌ها مورد مطالعه بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی نشان داد که ژنوتیپ Zarfam بیشترین میزان تحمل به خشکی را شامل می‌شود. علت کارایی بالا روش تجزیه بای‌پلات را می‌توان در نمایش رابطه بین صفات مختلف به‌صورت گرافیکی و قدرت مقایسه بصری بین ژنوتیپ‌ها دانست. درنهایت با توجه به مقایسه نتایج کارایی مصرف آب و روش تجزیه بای‌پلات، ژنوتیپ Zarfam به‌عنوان متحمل‌ترین ژنوتیپ به تنش خشکی در مطالعه حاضر معرفی شد.


داشت؛ بنابراین این مؤلفه را می‌توان مؤلفه حساسیت به تنش دانست. این مؤلفه باعث تفکیک ژنوتیپ‌های حساس و متحمل به تنش می‌گردد، به‌طوری که ژنوتیپ Zarfam که کمترین میزان PC2 را به خود اختصاص داد بیشترین مطلوبیت از نظر تحمل به خشکی را دارا می‌باشد. روابط بین شاخص‌ها نشان داد که با توجه به تغییر رتبه ژنوتیپ‌ها از نظر شاخص‌های تحمل به خشکی اندازه‌گیری شده، استفاده از تجزیه بای‌پلات مبتنی بر اثر متقابل ژنوتیپ × صفت راه‌حل مناسب و قدرتمندی جهت بررسی روابط بین ژنوتیپ‌ها، شاخص‌ها و ارزیابی ژنوتیپ‌ها از نظر تحمل به خشکی به شمار می‌آید و ترسیم بای‌پلات بر اساس دو مؤلفه اصلی اول و دوم راه‌حل مناسبی برای تفسیر این‌گونه داده‌ها می‌باشد (۲۵، ۲۰). با استفاده از همین روش نمودار چندضلعی اثر متقابل ژنوتیپ × صفت رسم شد (شکل ۳). ژنوتیپ‌های رئوس چندضلعی در این آزمایش ژنوتیپ‌های Zarfam، Talaye، Geronimo، Talent و Sunday بودند که بالاترین پاسخ را به شاخص‌ها نشان دادند. بدین معنی که بهترین یا بدترین ژنوتیپ‌ها از لحاظ مقدار در تعدادی یا همه شاخص‌ها بودند. خطوط عمودی در اطراف چندضلعی ترسیم شده‌اند که از مبدأ بای‌پلات شروع شده و بای‌پلات را به ۵ ناحیه تقسیم کرده‌اند. ژنوتیپ برتر برای ۵ ناحیه، ژنوتیپی است که بیشترین مقادیر شاخص‌های که در آن ناحیه قرار گرفته‌اند را دارا است. در ناحیه ۱ ژنوتیپ‌ها برای YP بیشترین مقادیر را دارا بودند و پر عملکردترین ژنوتیپ‌ها برای شرایط بدون تنش به شمار می‌روند. ژنوتیپ Talaye به‌دلیل قرار گرفتن در ناحیه ۲ برای شاخص TOL بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده حساسیت بالای این ژنوتیپ به شرایط خشکی می‌باشد. در ناحیه ۳ ژنوتیپ Talent بیشترین مقدار برای

جدول ۶- شاخص‌های تحمل به خشکی برای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه

HAM	STI	GMP	MP	TOL	SSI	YP	YS	کد ژنوتیپ	ژنوتیپ
۲۷۴۰/۲	-/۹۰	۲۷۶۷/۲	۲۷۹۴/۳	۷۷۸/۰	-/۸۴	۳۱۸۳/۳	۲۴۰۵/۳	G1	ARC2
۲۸۰۲/۹	-/۹۵	۲۸۳۴/۶	۲۸۶۶/۷	۸۵۱/۷	-/۸۹	۳۲۹۲/۰	۲۴۴۰/۳	G2	ARC5
۱۳۶۶/۱	-/۲۴	۱۴۳۶/۶	۱۵۱۰/۷	۹۳۴/۷	۱/۶۳	۱۹۷۷/۰	۱۰۴۳/۳	G3	Celecious
۳۱۴۹/۹	۱/۱۸	۳۱۶۶/۷	۳۱۸۲/۷	۶۴۵/۳	-/۶۳	۳۵۰۵/۳	۲۸۶۰/۰	G4	Dante
۳۰۱۴/۰	۱/۱۱	۳۰۶۳/۳	۳۱۱۳/۰	۱۱۱۰/۰	۱/۰۴	۳۶۶۸/۰	۲۵۵۸/۰	G5	Geronimo
۲۸۷۰/۱	۱/۰۰	۲۹۱۶/۲	۲۹۶۲/۷	۱۰۴۷/۳	۱/۰۳	۳۴۸۶/۳	۲۴۳۹/۰	G6	Licord
۱۱۷۳/۵	-/۱۸	۱۲۴۵/۷	۱۳۲۲/۰	۸۸۶/۰	۱/۷۳	۱۲۶۵/۰	۸۷۹/۰	G7	Milena
۲۴۰۳/۶	-/۶۹	۲۴۲۷/۵	۲۴۵۲/۷	۶۹۰/۳	-/۸۵	۲۷۹۷/۳	۲۱۰۷/۰	G8	Opera
۱۴۳۹/۴	-/۲۷	۱۵۳۰/۳	۱۶۲۶/۳	۱۱۰۲/۷	۱/۷۵	۲۱۷۷/۷	۱۰۷۵/۰	G9	Rainbow
۲۴۰۴/۶	-/۷۰	۲۴۳۸/۳	۲۴۷۲/۷	۸۱۷/۷	-/۹۸	۲۸۸۱/۰	۲۰۶۳/۳	G10	Sahra
۳۰۲۴/۷	۱/۱۰	۳۰۵۶/۸	۳۰۸۹/۰	۸۹۱/۳	-/۸۷	۳۵۳۴/۷	۲۶۴۳/۳	G11	Shiralee
۳۱۱۲/۷	۱/۱۵	۳۱۲۸/۱	۳۱۴۳/۳	۶۲۰/۰	-/۶۲	۳۴۵۳/۳	۲۸۳۳/۳	G12	SLM046
۱۱۹۰/۵	-/۱۸	۱۲۵۰/۵	۱۳۱۲/۳	۸۰۱/۷	۱/۶۱	۱۷۱۳/۷	۹۱۲/۰	G13	Sunday
۲۳۳۵/۱	-/۶۸	۲۴۰۷/۲	۲۴۸۳/۰	۱۲۱۲/۰	۱/۳۵	۳۰۸۹/۰	۱۸۷۷/۰	G14	Talaye
۱۳۲۱/۴	-/۲۰	۱۳۲۸/۳	۱۴۴۵/۰	۱۱۳۸/۳	۱/۹۵	۲۰۱۴/۷	۸۷۶/۳	G15	Talent
۳۱۴۲/۴	۱/۱۷	۳۱۴۶/۳	۳۱۵۶/۳	۴۱۶/۳	-/۴۲	۳۳۶۴/۳	۲۹۴۸/۰	G16	Zarfam
۲۵۶۹/۲	-/۸۱	۲۶۱۷/۲	۲۶۶۶/۷	۱۰۱۷/۰	۱/۱۰	۳۱۷۴/۷	۲۱۵۷/۷	G17	Okapi
۲۶۰۳/۴	-/۸۱	۲۶۴۲/۷	۲۶۴۲/۵	۶۴۱/۰	-/۷۴	۲۹۶۲/۵	۲۳۲۱/۵	G18	Hyola420
۲۶۷۴/۳	-/۸۵	۲۶۹۱/۱	۲۷۰۸/۰	۶۰۴/۰	-/۶۹	۳۰۱۰/۰	۲۴۰۶/۰	G19	Hyola330
۲۷۶۶/۳	-/۹۱	۲۷۸۱/۲	۲۷۹۶/۳	۵۸۰/۰	-/۶۵	۳۰۸۶/۳	۲۵۰۶/۳	G20	RGS



شکل ۲- بای پلات روابط بین شاخص‌های اندازه‌گیری شده
Figure 2. Biplot of relation among measured indices



شکل ۳- بای پلات چندضلعی ژنوتیپ و شاخص‌های تحمل به خشکی
Figure 3. Polygonal biplot of genotype and drought tolerance indice

منابع

1. Ahmad, P., S. Jamsheed, A. Hameed, R. Saima, S. Sharma, M.M. Azooz and M. Hasanuzzaman. 2014. Drought Stress Induced. In: Ahmad, P. (Ed.) Oxidative Damage and Antioxidants in Plants Oxidative Damage to Plants: Antioxidant Networks and Signaling, Drought Stress Induced Oxidative Damage and Antioxidants in Plants. Academic Press, Massachusetts, USA, pp: 345-367.
2. Fernandez, G.C.J. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In: kuo, C.G. (Ed.) Adaptaion of Food Crops to Temperature and Water Stress. AVRDC, shanhaue, Taiwan, pp: 257-270.
3. Fischer, R.A and R. Maurer. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. Australian Journal Agricultural Research, 29: 897-912.
4. Ghodrati, G. 2012. Response of grain yield and yield components of promising genotypes of rapeseed (*Brassica napus* L.) under non-stress and moisture stress conditions. Crop Breeding Journal, 2: 49-56.
5. Golipoor, A., N. Latifi, K. Ghasemi-Golezani, H. Aliary and M. Moghaddam. 2004. Comparison of growth and grain yield of rapeseed cultivars under rainfed conditions. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 11: 5-13 (In Persian).

6. IPCC. 2007. Climate change 2007. The physical science basis. In: (Eds.) Contribution of working group I to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp: 996-1015.
7. Javidfar, F., B. Alizadeh, H. Amiri-Oghan N. Sabaghnia. 2011. A study of genotype by environment interaction in oilseed rape genotypes, using GGE biplot method. Iranian Journal of Field Crop Science, 41: 771-779 (In Persian).
8. Jensen, C.R., V.O. Morgenstern, J.K. Fieldsend, G.F.J. Milford, M.N. Andersen, A. Kumar and D.P. Singh. 1998. Use of physiological indices as a screening technique for drought tolerance in oilseed Brassica species. Annals of Botany, 81: 413-420.
9. Kimber, D.S. and D.I. McGregor. 1995. The species and their origin, cultivation and world production. In: Kimber, D. and D.I. McGregor (Eds.) Brassica oilseeds, production and utilization. CAB International, USA, pp: 178-295.
10. Nadaletti, W.C., R.A. Bariccatti, R.F. Santos, S. Souza, J.D.C. Siqueira, J. Antonelli, P. Cremonez, E. Rossi and A. Mari. 2014. Response of canola (*Brassica napus* L. var. oleifera Moench.) to the use of biofertilizer from swine farming at different groundwater levels. Journal of Food, Agriculture & Environment, 12: 415-417.
11. Naeemi, M., Gh. Aliakbari, A.H. Shirani-Rad, S.A. Modares-Sanavi and S.A. Sadat-Noori. 2010. Evaluation of drought stress effect at terminal growth stage on quantitative and qualitative yield of rapeseed (*Brassica napus* L.) cultivars. Journal of Crops Improvement, 12: 63-71.
12. Nasri, M., M. Khalatbari, H. Zahedi, F. Paknejad and H.R. Tohidi Moghadam. 2008. Evaluation of micro and macro elements in drought stress conditions in cultivars of rapeseed (*Brassica napus* L.). Journal of Agricultural and Biological Science, 3: 579-583.
13. Omid, H., L. Jafarzadeh-Chime and M. Rahimzadeh. 2012. Evaluation of drought stress on yield of rapeseed genotypes (*Brassica napus* L.) by drought resistance indices. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 96: 57-66 (In Persian).
14. Pourdad, S.S. and M. Jamshid Moghaddam. 2013. Study on genotype environment interaction through GGE biplot for seed yield in spring rapeseed (*Brassica napus* L.) in rain-fed condition. Journal of Crop Breeding, 5: 1-14 (In Persian).
15. Rameeh, V.O. 2009. Estimation of heritability and heterosis for agronomic traits and oil content in rapeseed spring varieties. Journal of Crop Breeding, 1: 1-13 (In Persian).
16. Rashidi, S., A.H. Shirani-Rad, A. Ayene-Band, F. Javidfar and S.H. Lak. 2012. Study of relationship between drought stresses tolerances with some physiological parameters in canola genotypes (*Brassica napus* L.). Annals of Biological Research, 3: 564-569.
17. Rosielle, A.A. and J. Hamblin. 1981. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non-stress environments. Crop Science, 21: 943-946.
18. Safavi, M., S. Pourdad and A. Safavi. 2013. Evaluation of drought tolerance in Safflower (*Carthamus tinctorius* L.) under Non-Stress and Drought Stress Conditions. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 9: 943-946.
19. Shabani, A., A.A. Kamkar-Haghighi, A.R. Sepaskhah, Y. Emam and T. Honar. 2010. Effect of water stress on grain yield, yield components and quality of rapeseed (*Brassica napus* L.) cv. Licord. Iranian Journal of Crop Sciences, 12: 409-421 (In Persian).
20. Shahrabi-Farahani, B., E. Farahmandfar, T. Hassanlo, A.H. Shirani-Rad and S.A. Tabatabaee. 2013. Evaluation of drought tolerance in rapeseed varieties based on physiological and agronomical characteristics at Yazd region. Electronic Journal of Crop Production, 6: 77-97 (In Persian).
21. Sinaki, J.M., E. Majidi-Heravan, A.H. Shirani-Rad, G.H. Noor-Mohammadi and G. Zarei. 2007. The effects of water deficit during growth stages of canola (*Brassica napus* L.). American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 2: 417- 22.
22. Sio-Se Mardeh, A., A. Ahmadi, K. Poustini and V. Mohammadi. 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. Field Crops Research, 98: 222-229.
23. Sullivan, C.Y. and J.D. Eastin. 1974. Plant physiological responses to water stress. Agricultural Meteorology, 14: 113-127.
24. Yan, W. and I. Rajcan. 2002. Biplot analysis of test sites and trait relations of soybean in Ontario. Crop Science, 42: 11-20.
25. Yan, W. and J. Frégeau-Reid. 2008. Breeding line selection based on multiple traits. Crop Science, 48: 417-423.
26. Yan, W. and M.S. Kang. 2002. GGE biplot analysis: A graphical tool for breeders, geneticists and agronomists. CRC press, Florida, USA, 267 pp.

Evaluation of Drought Tolerance in Canola (*Brassica napus* L.) Genotypes, using Biplot Analysis

Seyedeh Zahra Hosseini

Faculty Member of Basic Sciences, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
(Corresponding author: hosseini@bkatu.ac.ir)

Received: November 8, 2014 Accepted: July 25, 2015

Abstract

Drought is one of the major environmental stresses that adversely affect crop growth and productivity worldwide. For evaluation of drought stress on grain yield, yield components and drought tolerance indices, 20 genotype of rapeseed (*Brassica napus* L.) was studied in an experiment based on a randomized complete blocks design with three replications in two different conditions (stress and non-stress). Result of mean comparison showed significant difference among all genotypes for all traits. Losses in grain yield, thousand grain weight and water use efficiency due to drought stress was more than other traits. In this study, geometric mean productivity index (GMP), mean productivity index (MP), harmonic mean index (HAM) and stress tolerance index (STI) showed high correlation with grain yield in normal and drought stress conditions. In present research, GT-biplot approach was applied for grouping and detection drought-tolerant and drought-sensitive genotypes. Biplot diagram based on interaction of genotype \times trait (tolerance index) indicated that genotype Zarfam is the most stable genotype for non-stress and drought stress conditions, and in other hand Talent and Talye genotypes were identified as the most sensitive genotypes to drought stress condition. Hence, the statistical model of GT-biplot could provide useful information for evaluation of drought-tolerance canola genotypes in water deficit stress condition.

Keywords: Drought, Genotype \times trait interaction, GT-biplot, Tolerance index