

ارزیابی تحمل به تنش کم‌آبی در جمعیت‌های رازیانه (*Foeniculum vulgare* M.) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش خشکی

میلاذ قاسمی^۱، سعید اهری‌زاد^۲، علی بنده‌حق^۳، مجید نوروزی^۴ و رقیه اژدری^۱

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات و دانشیار گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
۲- استاد گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، (نویسنده مسؤل: s.aharizad@yahoo.com)
تاریخ دریافت: ۹۶/۳/۳ تاریخ پذیرش: ۹۷/۱/۱۴

صفحه: ۱۱۸ تا ۱۲۵

چکیده

تنش خشکی یکی از مهم‌ترین تنش‌های غیرزنده محیطی می‌باشد که تولید محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به منظور شناسایی جمعیت‌های متحمل به تنش کم‌آبی در رازیانه و تعیین موثرترین شاخص‌های تحمل به خشکی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو شرایط آبیاری مطلوب و محدود به‌طور مجزا در سه تکرار بر روی ۱۹ جمعیت رازیانه در سال ۱۳۹۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا گذاشته شد. اعمال تنش کمبود آب به صورت قطع آبیاری از زمان شروع گلدهی بوته‌ها برای شرایط تنش کمبود آب انجام شد. در شرایط آبیاری مطلوب و نیز تا مرحله گلدهی بوته‌ها در شرایط تنش کم‌آبی آبیاری به روال مرسوم انجام گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب، بین شرایط مختلف آبیاری و نیز بین جمعیت‌های مورد مطالعه از نظر اکثر صفات در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی‌داری وجود داشت. همچنین برهمکنش شرایط × جمعیت برای اکثر صفات در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. صفات تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد اسانس در تمام جمعیت‌های مورد ارزیابی در شرایط تنش کم‌آبی کاهش معنی‌دار یافتند. در حالی که میزان اسانس در تمام جمعیت‌ها در شرایط تنش معنی‌دار داشت. ارزیابی جمعیت‌ها از نظر تحمل به خشکی توسط شش شاخص مختلف SSI، MP، STI، GMP و HARM صورت گرفت. با توجه به همبستگی مثبت شاخص‌های HARM، MP، GMP و STI با عملکرد دانه و اسانس در شرایط آبیاری مطلوب و تنش کم‌آبی این چهار شاخص به عنوان موثرترین شاخص برای تعیین جمعیت‌های متحمل به تنش کم‌آبی شناسایی شدند. بر اساس این چهار شاخص مهم، جمعیت‌های بناب، بیرجند، آلمان (۱۱۴۸۶) و همدان متحمل به تنش کم‌آبی و جمعیت‌های قاضی‌آنتپ و خورشیدآباد حساس به تنش کم‌آبی شناسایی شدند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که جمعیت بناب از نظر صفات مهم نظیر عملکرد دانه، عملکرد اسانس، تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه و زیست‌توده در شرایط آبیاری مطلوب و از نظر تعداد چتر در بوته در شرایط تنش بیشترین میانگین این صفات را در مقایسه با سایر جمعیت‌ها دارا بود.

واژه‌های کلیدی: اسانس، تنش کم‌آبی، رازیانه، عملکرد دانه، همبستگی

مقدمه

می‌شود. امیری ده‌احمدی و همکاران (۲) در تحقیقی بر روی رازیانه نشان دادند که تعداد دانه در چتر، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر و وزن هزار دانه در شرایط تنش کم‌آبی کاهش می‌یابد. موسوی و همکاران (۱۲) با انجام آزمایشی بر روی رازیانه، نشان دادند که تنش کم‌آبی اثر معنی‌داری بر کاهش تعداد پنجه، ارتفاع بوته، قطر ساقه و عملکرد دانه دارد. حیدری و همکاران (۵) در بررسی اثر تنش کم‌آبی بر روی اینسون، کاهش عملکرد دانه، وزن هزار دانه، زیست توده، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در چترک، شاخص برداشت و عملکرد اسانس را در شرایط تنش خشکی مشاهده کردند.

شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی واکنش گیاهان در شرایط محیطی متفاوت و تعیین تحمل و حساسیت آنها ارائه شده است. شاخص حساسیت به تنش^۵ (SSD) با مقدار پایین‌تر، نشان‌دهنده تحمل به خشکی ژنوتیپ است (۴). روزیل و هامبلین (۱۹) شاخص‌های تحمل^۶ (TOL) و میانگین بهره‌وری (MP)^۷ را پیشنهاد کردند که هرچه مقدار TOL کمتر باشد این نشان‌دهنده تحمل بیشتر رقم به خشکی است و مقادیر پایین‌تر شاخص MP بیانگر حساسیت بیشتر ژنوتیپ‌ها به تنش می‌باشد. فرناندز (۳) شاخص‌های تحمل به تنش (STI)^۸، میانگین هارمونیک^۹ (HARM) و میانگین هندسی بهره‌وری (GMP)^{۱۰} را پیشنهاد نمود. هرچه مقادیر این شاخص‌ها بالاتر باشد، نشان‌دهنده تحمل بیشتر به تنش

با توجه به اینکه استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهانی دارای رویکرد روز افزونی بوده است، بنابراین کشت و تولید این گیاهان دارای اهمیت می‌باشد. رازیانه با نام علمی *Foeniculum vulgare* M. گیاهی چند ساله از خانواده چتریان یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی می‌باشد که بومی جنوب اروپا و منطقه مدیترانه است (۱۱). تمام اندام‌های رازیانه حاوی اسانس است که بیشترین مقدار اسانس در حدود ۲-۶ درصد در دانه آن می‌باشد. مهم‌ترین ترکیب‌های اسانس رازیانه عبارتند از آنتول^۱، فنکون^۲، لیمونن^۳ و متیل کایوکول^۴ (۲۲). آنتول یکی از اجزای اصلی اسانس در دانه رازیانه می‌باشد که فعالیت ضد سرطانی از خود نشان می‌دهد. این گیاه اثر ضد باکتریایی و ضد قارچی هم دارد (۲۳).

با توجه به اینکه آب یکی از مهم‌ترین عوامل محیطی است که تأثیر عمده‌ای بر رشد، نمو و مواد مؤثره گیاهان دارویی دارد (۲۴)، بنابراین شناخت واکنش‌های متفاوت گیاهان دارویی به کمبود آب از اهمیت خاصی برخوردار است (۶). قابل ذکر و تأکید است که قسمت عمده کشور ایران، دارای اقلیم خشک و نیمه‌خشک می‌باشد (۹).

نوروزی شهری و همکاران (۱۳) در آزمایشی به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از توده‌های بومی رازیانه نشان دادند که تنش خشکی موجب کاهش عملکرد دانه، بیوماس، درصد و عملکرد اسانس

1- Anetole

4- Methyl Chavicol

7- Mean Productivity

10- Geometric Mean Productivity

2- Fenchone

5- Stress Susceptibility Index

8- Stress Tolerance Index

3- Limonene

6- Tolerance

9- Harmonic Mean

$$TOL = Y_p - Y_s \quad (19)$$

$$MP = \frac{Y_s + Y_p}{2} \quad (19)$$

$$GMP = \sqrt{Y_p \times Y_s} \quad (3)$$

$$HARM = \frac{2(Y_p \times Y_s)}{(Y_p + Y_s)} \quad (3)$$

$$STI = \frac{Y_p \times Y_s}{(Y_p)^2} \quad (3)$$

Y_p : عملکرد هر ژنوتیپ در محیط بدون تنش
 Y_s : عملکرد هر ژنوتیپ در محیط دارای تنش
 \bar{Y}_p : میانگین عملکرد کلیه ژنوتیپها در محیط بدون تنش
 \bar{Y}_s : میانگین عملکرد کلیه ژنوتیپها در محیط دارای تنش
 همچنین ضرایب همبستگی پیرسون بین عملکرد دانه در شرایط آبیاری نرمال و تنش کم آبی و شاخصهای تحمل به تنش خشکی توسط نرم‌افزارهای EXCEL، M-STATC و SPSS برآورد و مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج و بحث

تجزیه واریانس مرکب برای دو شرایط مختلف آبیاری انجام گرفت (جدول ۱). نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین شرایط آبیاری مطلوب و محدود و جمعیت‌های مورد مطالعه برای اکثر صفات مورد ارزیابی تفاوت معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. همچنین برهمکنش جمعیت × شرایط آبیاری نیز برای اکثر صفات در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود که نشان می‌دهد جمعیت‌های مختلف نسبت به دو شرایط آبیاری مطلوب و تنش کم آبی واکنش متفاوتی داشتند.

با توجه به معنی‌دار شدن اثر متقابل جمعیت × شرایط برای تمامی صفات، مقایسه میانگین جمعیت‌ها برای صفات مورد ارزیابی در هر دو شرایط مختلف آبیاری به طور مجزا انجام گرفت (جدول ۲). صفات تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد اسانس در تمامی جمعیت‌های مورد ارزیابی تحت تنش کم آبی کاهش یافتند. در برخی از جمعیت‌ها این میزان کاهش زیاد بوده که احتمالاً نشان از تاثیر بالای تنش خشکی بر عملکرد جمعیت‌ها و ایجاد سازوکارهای مقاومت به خشکی نظیر کاهش رشد اندام هوایی بود. در بعضی جمعیت‌ها نیز کاهش کمتر عملکرد در برابر تنش خشکی نشان از تحمل بالای جمعیت‌ها داشت. از نظر عملکرد دانه در شرایط بدون تنش جمعیت بناب با ۳۵۰/۵۰ گرم در بوته بیشترین عملکرد را در واحد بوته داشت. جمعیت‌های قاضی‌آنتپ با ۳۹/۱۶، خورشیدآباد با ۵۳/۴۶، خرم‌آباد با ۶۲/۷۷ و تربت جام با ۷۴/۶۵ گرم در بوته به ترتیب کمترین عملکرد را در واحد بوته در شرایط آبیاری مطلوب داشتند. در شرایط تنش خشکی جمعیت همدان با ۱۲۷ گرم در بوته بیشترین عملکرد را داراست و جمعیت‌های ازمیر، قاضی‌آنتپ، خورشیدآباد و تتماع به ترتیب با مقادیر ۵، ۶/۷۶، ۱۲/۳۶ و ۱۹/۱۴ گرم در بوته کمترین عملکرد را در شرایط تنش خشکی داشتند. از نظر عملکرد اسانس جمعیت بناب در

خشکی است. طباطبایی و همکاران (۲۱) جهت تعیین اکوتیپ‌های مقاوم به تنش خشکی در زیره سبز از چهار شاخص GMP، STI، SSI و TOL استفاده کردند. هدف از این آزمایش ارزیابی تحمل خشکی ۱۹ جمعیت رازیانه ایرانی و خارجی و شناسایی جمعیت‌های متحمل به خشکی در شرایط تنش خشکی با استفاده از شاخص‌های مقاومت به تنش خشکی، به منظور بهره‌برداری اصلاح‌گران و تولید کنندگان گیاهان دارویی بوده است.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق ۱۹ جمعیت رازیانه شامل ۱۵ جمعیت بومی به همراه چهار جمعیت خارجی از دو کشور آلمان (۱۱۸۲) و ۱۱۴۸۶) و ترکیه (قاضی‌آنتپ و ازمیر) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و دو شرایط آبیاری مطلوب و محدود به طور مجزا در سال ۱۳۹۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مورد ارزیابی قرار گرفتند. جمعیت‌های بومی ایران عبارت بودند از: بناب، بیرجند، تتماع (کاشان)، تربت‌جام، خورشیدآباد (مشگین‌شهر)، خور و بیابانک (اصفهان)، خروسلی (مغان)، زیار (اصفهان)، شیروان (خراسان)، کرج، کرمان، خرم‌آباد، گرینه (نیشابور)، ورامین و همدان. آبیاری در هر دو شرایط، به صورت غرقابی به فاصله هر هفته یک بار اعمال شد. اعمال تنش کمبود آب به صورت قطع آبیاری از زمان شروع گلدهی بوته‌ها برای شرایط تنش کمبود آب انجام شد. عملیات داشت مانند وجین علف‌های هرز و کوددهی برای هر دو شرایط به صورت یکسان انجام شد.

برای ارزیابی صفات مورد مطالعه تعداد ۱۰ بوته از هر جمعیت به صورت تصادفی انتخاب و انواع صفات موفولوژی و زراعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. عصاره‌گیری و استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر انجام شد. عملکرد اسانس با فرمول زیر محاسبه شد:

$$100 / (\text{عملکرد دانه} \times \text{میزان اسانس در } 100 \text{ گرم بذرخشک})$$

قبل از انجام تجزیه‌های آماری، فرض‌های اساسی تجزیه واریانس شامل مستقل بودن اشتباه‌های آزمایشی، توزیع نرمال اشتباه‌های آزمایشی، یکنواختی واریانس‌های درون تیماری و عدم وجود اثر متقابل بین تیمار و بلوک انجام شد و برقراری مفروضات فوق در همه صفات تایید گردید. تجزیه واریانس مرکب و مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی به روش دانکن انجام گرفت. از شاخص‌های تحمل به خشکی، برای شناسایی جمعیت‌های متحمل به تنش کم آبی استفاده شد در این تحقیق از شش شاخص مقاومت به تنش خشکی شامل: شاخص حساسیت به تنش (SSI)، شاخص تحمل (TOL)، شاخص میانگین حسابی عملکرد (MP)، شاخص میانگین هندسی عملکرد (GMP)، شاخص میانگین هارمونیک (HARM) و شاخص تحمل به تنش (STI) برای تعیین میزان مقاومت یا حساسیت جمعیت‌ها استفاده شد و بر اساس مقادیر به دست آمده، جمعیت‌ها گروه‌بندی شدند.

$$SSI = \frac{1 - \left(\frac{Y_s}{Y_p}\right)}{1 - \left(\frac{\bar{Y}_s}{\bar{Y}_p}\right)} \quad (4)$$

تنش کم‌آبی افزایش یافتند. برخی از محققان نیز نشان دادند که میزان اسانس گیاهان دارویی در شرایط تنش کم‌آبی افزایش می‌یابد (۱۵). رضائی چپانه و همکاران (۱۷) در آزمایشی نشان دادند که گیاه رازیانه به‌عنوان یک واکنش در برابر کم‌آبی برای حفظ وضعیت آبی خود، هم‌فندهای محلول و هم مقدار پرولین خود را افزایش می‌دهد تا از طریق مکانیسم تنظیم اسمزی تا حدودی با خشکی مقابله کند. ریزوپولوس و دیاماتوگنون (۱۸) با آزمایش بر روی گیاه مرزنجوش بیان کردند که تنش خشکی موجب افزایش میزان اسانس این گیاه شده است. تعداد میانگه، زیست‌توده و ارتفاع بوته نیز در شرایط تنش کم‌آبی برای اکثر جمعیت‌های مورد ارزیابی با کاهش روبرو بوده‌اند. میرشکاری و فرح‌ش (۱۰) در طی آزمایشی بر روی رازیانه گزارش کردند که تنش خشکی باعث کاهش ارتفاع بوته، بیوماس، تعداد چتر، تعداد چترک در چتر، جهان‌آرا و حائری‌زاده (۷) اثرات منفی تنش خشکی را بر صفات ارتفاع بوته، بیوماس، تعداد چتر، تعداد چترک در چتر، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در دو توده بومی رازیانه مشاهده کردند.

شرایط آبیاری مطلوب با ۱۱/۵۷ و جمعیت همدان در شرایط تنش کم‌آبی با ۶/۳۱ بیشترین عملکرد اسانس را به خود اختصاص دادند. از نظر تعداد چتر در بوته در هر دو شرایط آبیاری جمعیت بناب بیشترین تعداد چتر در بوته را داشت. جمعیت‌های قاضی‌آنتپ و تربت جام به ترتیب کمترین تعداد چتر در بوته را در شرایط آبیاری مطلوب داشتند. همچنین در شرایط تنش کم‌آبی جمعیت‌های قاضی‌آنتپ، ازمیر و تجماع به ترتیب کمترین تعداد چتر در بوته را به خود اختصاص دادند. در شرایط آبیاری نرمال بیشترین وزن هزار دانه (۵/۱۶) و (۴/۸۶) به ترتیب به جمعیت‌های بناب و همدان تعلق داشت. در شرایط تنش کم‌آبی جمعیت‌های کرج، کرمان و قاضی‌آنتپ به ترتیب بیشترین وزن هزار دانه و اکثر جمعیت‌ها کمترین وزن هزار دانه را داشتند. پوریوسف (۱۶) طی آزمایشی بر روی رازیانه گزارش کرد که عملکرد دانه و اسانس رازیانه تحت تأثیر تنش خشکی به‌طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. کاهش عملکرد اسانس با افزایش تنش خشکی در سایر گیاهان دارویی نیز گزارش شده است (۱۴). این در حالی است که میزان اسانس در تمام جمعیت‌های مورد مطالعه در شرایط

جدول ۱- تجزیه واریانس مرکب صفات مورد ارزیابی در جمعیت‌های مورد مطالعه رازیانه

Table 1. Analysis of Compound variance of evaluated traits in studied populations of fennel

منبع تغییرات	درجه آزادی	زیست‌توده	شاخص برداشت	میزان اسانس	عملکرد اسانس	وزن هزار دانه	تعداد دانه در چتر	تعداد چتر در بوته
شرایط آبیاری	۱	۳۰۵۵۹/۸۴*	۵۳۱۲/۲۴**	۷/۲۲**	۷۵/۵۳*	۱۲۵۹۵۳/۶۷**	۱۴/۸۸**	۱۶۷۶۳۳/۱۰**
تکرار/شرایط آبیاری	۴	۲۲۸۵/۸۸	۲۹/۰۱	-/۰۸	-/۴۰	۱۴۱/۵۸	-/۱۶	۱۷۶/۰۰
جمعیت	۱۸	۵۴۹۷۵/۷۹**	۲۹۵/۹۲**	۴/۶۱**	۲۲/۱۴**	۱۳۰۱۴/۱۲**	-/۶۳**	۲۲۸۳۳/۶۸**
شرایط آبیاری × جمعیت	۱۸	۲۱۸۳۰/۱۹**	۲۵۷/۲۱**	-/۵۷**	۱۲/۳۷**	۸۰۳۹/۳۹**	-/۶۵**	۷۳۲۹/۹۳**
خطا	۷۲	۱۳۸۳/۹۴	۳۶/۴۰	-/۰۵	-/۶۵	۳۶۱/۴۳	-/۱۲	۲۹۷/۸۸
ضریب تغییرات (درصد)		۲۲/۰۵	۱۶/۱۸	۷/۲۲	۲۹/۱۸	۱۸/۹۲	۹/۷۴	۱۶/۲۵

* و ** معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪

جدول ۲- مقایسه میانگین جمعیت‌های رازیانه از نظر صفات مورد ارزیابی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش کم‌آبی
Table 2. Comparison of mean of fennel population respect to evaluated traits under normal irrigation and water deficit stress conditions

جمعیت	تعداد چتر در بوته		تعداد دانه در چتر		وزن هزار دانه (گرم)		زیست‌توده (گرم در بوته)	
	نرمال	تنش	نرمال	تنش	نرمال	تنش	نرمال	تنش
آلمان (۱۱۸۲)	۱۵۰/۴ ^c	۷۹/۵ ^{c-e}	۳۷۹ ^{a-c}	۳۷۹ ^{a-c}	۳/۹۸ ^{cd}	۳/۴ ^{a-d}	۲۱۷/۳ ^{-f}	۲۱۷/۳ ^{-f}
آلمان (۱۱۴۸۶)	۱۹۸/۶ ^b	۸۳/۶۶ ^{c-d}	۳۸۵/۶ ^{a-c}	۳۸۵/۶ ^{a-c}	۴/۱ ^{cd}	۳/۴۳ ^{a-c}	۳۰۶/۶ ^{b-c}	۳۰۶/۶ ^{b-c}
قاضی آنتپ	۵۰ ^f	۱۰/۶۸ ⁿ	۲۳۶/۳ ^{d-e}	۲۳۶/۳ ^{d-e}	۴/۲۵ ^{bc}	۳/۷۴ ^a	۱۲/۶ ^f	۱۲/۶ ^f
ازمیر	۱۱۳ ^{c-n}	۱۲/۸۴ ⁿ	۲۱۹/۲ ^{d-e}	۲۱۹/۲ ^{d-e}	۳/۴۴ ^{d-e}	۲/۶۹ ^g	۲۱/۵ ^f	۲۱/۵ ^f
بناب	۴۹۱/۸ ^a	۱۷۸ ^d	۲۹۸/۴ ^{c-e}	۲۹۸/۴ ^{c-e}	۵/۱۶۷ ^a	۲/۸۱ ^{c-g}	۲۵۶/۲ ^{c-e}	۲۵۶/۲ ^{c-e}
بیرجند	۲۲۹/۲ ^d	۴۹/۴۰ ^g	۴۴۸/۹ ^a	۴۴۸/۹ ^a	۳/۴۴ ^{d-e}	۳/۲۳ ^{a-g}	۲۰۸/۸ ^{c-f}	۲۰۸/۸ ^{c-f}
تجماع	۱۳۶/۱ ^{c-f}	۲۳/۵۰ ⁿ	۳۳۲/۵ ^{d-e}	۳۳۲/۵ ^{d-e}	۳/۸۸ ^{cd}	۳/۳۳ ^{a-g}	۲۰۱/۳ ^{d-f}	۲۰۱/۳ ^{d-f}
تربت جام	۸۰/۵ ^{h-i}	۵۱ ^g	۳۷۸/۱ ^{a-c}	۳۷۸/۱ ^{a-c}	۳/۷ ^{c-e}	۳/۱۷ ^{c-e}	۷۶/۹۲ ^{g-i}	۷۶/۹۲ ^{g-i}
خوشیدآباد	۹۶/۵ ^{f-n}	۵۰/۳۳ ^g	۲۰۰ ^e	۲۰۰ ^e	۳/۷۱ ^{c-e}	۲/۹۷ ^{c-g}	۴۲/۹۵ ⁿ⁻ⁱ	۴۲/۹۵ ⁿ⁻ⁱ
خورویابانک	۱۳۰/۴ ^{c-g}	۶۷/۹۲ ^{d-g}	۵۲۱/۳ ^{d-e}	۵۲۱/۳ ^{d-e}	۳/۴۱ ^{d-e}	۳/۰۴ ^{d-g}	۲۸ ^{d-a}	۲۸ ^{d-a}
خروسلری	۱۰۰/۳ ^{d-h}	۵۵/۸۴ ^{d-g}	۴۴۸/۱ ^{c-g}	۴۴۸/۱ ^{c-g}	۴/۳۶ ^{bc}	۲/۹۵ ^{c-g}	۱۳۱/۱ ^{f-h}	۱۳۱/۱ ^{f-h}
زیار	۱۲۱/۳ ^{c-n}	۷۰/۹۴ ^{d-f}	۴۸۹/۳ ^{c-g}	۴۸۹/۳ ^{c-g}	۴ ^{cd}	۳/۶۳ ^{ad}	۲۶۹/۶ ^{d-a}	۲۶۹/۶ ^{d-a}
سیروان	۸۹/۱۱ ^{gn}	۸۳ ^{cd}	۳۱۷ ^{d-a}	۳۱۷ ^{d-a}	۴/۰۵ ^{ca}	۳/۹۵ ^a	۲۰۷/۶ ^{c-f}	۲۰۷/۶ ^{c-f}
کرج	۱۰۰/۱ ^{e-h}	۵۷/۷۱ ^g	۲۳۹/۶ ^{d-e}	۲۳۹/۶ ^{d-e}	۳/۹۵ ^{cd}	۳/۷۰ ^a	۱۹۰/۳ ^{d-f}	۱۹۰/۳ ^{d-f}
کرمان	۱۴۰/۸ ^{c-e}	۶۳/۹۷ ^{e-g}	۴۱۹ ^{ab}	۴۱۹ ^{ab}	۳/۱۱ ^e	۲/۸۷ ^{d-g}	۱۶۳/۱ ^{e-g}	۱۶۳/۱ ^{e-g}
لرستان	۱۰۰/۴ ^{d-n}	۷۱ ^{d-f}	۳۱۵/۳ ^{d-a}	۳۱۵/۳ ^{d-a}	۳/۹ ^{cd}	۲/۳۴ ^{a-f}	۱۵۲/۳ ^{f-g}	۱۵۲/۳ ^{f-g}
گرینه	۱۲۶/۱ ^{c-g}	۹۲/۲۵ ^{bc}	۴۰۴/۹ ^{a-c}	۴۰۴/۹ ^{a-c}	۴/۰۱ ^{cd}	۲/۷۵ ^{c-g}	۳۶۵/۶ ^{ab}	۳۶۵/۶ ^{ab}
ورامین	۱۲۴/۷ ^{c-g}	۷۰/۰۵ ^{d-f}	۳۱۱/۹ ^{d-e}	۳۱۱/۹ ^{d-e}	۳/۱۲ ^c	۲/۹۵ ^{c-g}	۱۳۹/۷ ^f	۱۳۹/۷ ^f
همدان	۱۴۶/۶ ^c	۱۰۶ ^d	۳۱۶/۴ ^{d-e}	۳۱۶/۴ ^{d-e}	۴/۸۶ ^{ab}	۲/۷ ^g	۴۳۵/۳ ^a	۴۳۵/۳ ^a

ادامه جدول ۲

Continued 2 table

جمعیت	عملکرد دانه (گرم در بوته)		میزان اسانس (میلی لیتر در ۱۰۰ گرم بذر)		عملکرد اسانس (%)		شاخص برداشت (%)	
	نرمال	تنش	نرمال	تنش	نرمال	تنش	نرمال	تنش
آلمان (۱۱۸۲)	۱۱۹/۱ ^{d-t}	۶۴/۹۶ ^{c-e}	۵/۳ ^a	۵/۳ ^a	۵/۹۳ ^d	۳/۳۸ ^{bc}	۳۹/۰۵ ^{c-g}	۳۰/۸ ^{b-d}
آلمان (۱۱۴۸۶)	۱۸۹/۱ ^c	۷۶/۵۳ ^{bc}	۴/۳ ^b	۴/۵ ^b	۸/۱۴ ^c	۳/۴۷ ^b	۴۷/۷۵ ^{b-d}	۲۵/۹۵ ^{b-e}
قاضی آنتپ	۳۹/۱ ^e	۶/۷۶ ^h	۴/۳ ^b	۴/۳ ^{bc}	۱/۶۵ ^{fg}	۰/۲۹ ^{ef}	۴۶/۱۲ ^{b-e}	۵۲/۴۵ ^a
ازمیر	۹۴/۱۷ ^{e-1}	۵ ^h	۲/۸ ^{de}	۳/۳ ^d	۲/۷۰ ^{ef}	۰/۱۷ ^f	۵۳/۳۷ ^b	۲۳/۶۱ ^{b-e}
بناب	۳۵/۰/۵ ^a	۶۵/۸۱ ^{c-e}	۳/۳ ^{cd}	۳/۶ ^{de}	۱۱/۵۷ ^a	۲/۳۷ ^{b-d}	۲۵/۹۱ ^{c-g}	۲۵/۶۹ ^{b-e}
بیرجند	۲۸۵/۶ ^b	۶۰/۷۷ ^{de}	۳/۴ ^c	۳/۴ ^d	۹/۷۱ ^b	۲/۲۵ ^{b-d}	۶۶/۳۳ ^a	۲۹/۱۱ ^{bcd}
تتماج	۸۳/۶ ^{t-1}	۱۹/۱۴ ^h	۲/۳ ^{cd}	۲/۳ ^{de}	۲/۶۸ ^{ef}	۰/۶۵ ^{ef}	۳۹/۰/۱ ^{c-g}	۱۶/۱۷ ^c
تریت جام	۷۴/۶۵ ^{g-1}	۴۳/۱۶ ^{fg}	۲/۲ ^{fg}	۲/۲۵ ^{fg}	۱/۶۴ ^g	۱/۱۰۳ ^{d-t}	۴۸/۶۸ ^{b-d}	۵۶/۱۱ ^a
خوشیدآباد	۵۳/۴۶ ^l	۱۲/۳۶ ^h	۱/۸۵ ^{gh}	۲/۵ ^g	۰/۹۹ ^g	۰/۳۱ ^{ef}	۶۳/۳۶ ^a	۲۸/۵۴ ^{b-e}
خوروپیانک	۱۲۶/۱ ^{de}	۵۶/۱۳ ^{ef}	۱/۶۵ ^{hi}	۲/۴۷ ^g	۲/۰۸ ^{c-g}	۱/۳۸ ^{d-t}	۴۶/۳۳ ^{b-e}	۱۹/۵ ^{de}
خروسلری	۹۷/۹۲ ^{e-h}	۳۸/۹۹ ^g	۰/۹ ^j	۳/۴۵ ^{de}	۰/۸۸ ^g	۱/۳۶ ^{d-t}	۴۱/۰/۱ ^{c-t}	۲۹/۹۱ ^{b-d}
زیار	۷۸/۳۹ ^{t-1}	۶۵/۵۲ ^{c-e}	۱/۲۵ ^{lj}	۲/۸۵ ^f	۰/۹۶ ^g	۱/۸۷ ^{de}	۳۴/۸۶ ^{fg}	۲۴/۵۱ ^{b-e}
شیروان	۸۳/۲۳ ^{t-1}	۷۳/۲۳ ^{b-d}	۴ ^b	۴/۳ ^{bc}	۳/۳۳ ^c	۳/۱۵ ^{bc}	۲۹/۹۳ ^g	۲۵/۲۸ ^{bc}
کرج	۵۵/۳ ^{t-1}	۳۷/۵۹ ^g	۲/۳۵ ^{ef}	۲/۶۶ ^{fg}	۲/۰۱ ^{c-g}	۱/۰۰ ^{d-t}	۲۸/۹۱ ^{c-g}	۲۵/۴۸ ^{b-e}
کرمان	۹۹/۸۴ ^{d-h}	۵۶/۵۷ ^e	۲/۸ ^{fg}	۲/۸ ^{fg}	۲/۷۰ ^{ef}	۱/۵۸ ^{d-t}	۳۶/۶۷ ^g	۲۴/۲۵ ^{bc}
لرستان	۶۲/۷۷ ^{h-1}	۵۵/۴۷ ^{ef}	۳/۳ ^{cd}	۳/۳ ^{cd}	۲/۰۷ ^{c-g}	۱/۸۴ ^{c-e}	۴۰/۳۳ ^{c-g}	۳۶/۰۵ ^b
گرینه	۸۴/۸۷ ^{t-1}	۸۴/۳۹ ^b	۳/۲۵ ^{cd}	۴ ^c	۲/۷۶ ^{ef}	۳/۳۸ ^b	۳۸/۱۲ ^{d-g}	۲۳/۰۹ ^{c-e}
ورامین	۱۰۹/۳ ^{d-g}	۴۲/۴۶ ^{fg}	۲/۸ ^{fg}	۲/۸ ^{fg}	۳/۰۲ ^{ef}	۱/۲۱ ^{d-t}	۴۲/۷۸ ^{b-t}	۳۰/۴۷ ^{b-d}
همدان	۱۳۸ ^d	۱۲۷ ^a	۳/۳ ^{cd}	۳/۴۷ ^{de}	۳/۲۱ ^e	۶/۳۱ ^a	۴۹/۵۵ ^{bc}	۳۱/۷ ^{b-d}

حروف غیر مشترک بیانگر اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد می باشد.

مقادیر بالای شاخص HARM به ترتیب بیشترین تحمل را به تنش کم آبی داشتند. بر اساس همین شاخص جمعیت های ازمیر، قاضی آنتپ، خوشیدآباد و تتماج به ترتیب بیشترین حساسیت را به تنش کم آبی داشتند. به طور کلی از نظر عملکرد دانه اکثر شاخص های تحمل به خشکی نشان دهنده تحمل بالای جمعیت های همدان، بناب، بیرجند و آلمان (۱۱۴۸۶) به تنش کم آبی بودند. همچنین جمعیت های قاضی آنتپ، ازمیر و خوشیدآباد از نظر اکثر شاخص های تحمل به خشکی حساس به تنش کم آبی بودند. از نظر عملکرد اسانس جمعیت های همدان، زیار و گرینه از نظر شاخص SSI به ترتیب متحمل به تنش کم آبی و جمعیت های قاضی آنتپ، ازمیر، بناب، بیرجند، تتماج، خوشیدآباد و ورامین به ترتیب حساس به تنش کم آبی بودند. از نظر شاخص TOL جمعیت های همدان، زیار و گرینه با داشتن کمترین مقدار این شاخص، به ترتیب متحمل به تنش خشکی و جمعیت های بناب و بیرجند با مقایر بالای این شاخص حساس به تنش خشکی بودند. از نظر شاخص STI جمعیت های آلمان (۱۱۴۸۶)، بناب، بیرجند، همدان و آلمان (۱۱۸۲) به ترتیب متحمل به تنش کم آبی و جمعیت های خوشیدآباد، قاضی آنتپ، ازمیر، تتماج و تربت جام از نظر همین شاخص به ترتیب حساس به تنش کم آبی بودند. از نظر شاخص MP جمعیت های بناب، بیرجند، آلمان (۱۱۴۸۶)، همدان و آلمان (۱۱۸۲) متحمل به تنش کم آبی و جمعیت های خوشیدآباد و قاضی آنتپ به ترتیب حساس به تنش کم آبی بودند. جمعیت های بیرجند، آلمان (۱۱۴۸۶)، بناب، آلمان (۱۱۸۲) و همدان از نظر شاخص GMP به ترتیب متحمل به تنش کم آبی و جمعیت های خوشیدآباد، قاضی آنتپ و ازمیر به ترتیب حساس به تنش کم آبی بودند. با توجه به

جدول ۳ مقادیر شاخص های تحمل به تنش خشکی را از دو نکته نظر عملکرد دانه و عملکرد اسانس نشان می دهد. از نظر عملکرد دانه جمعیت های گرینه، همدان، لرستان، شیروان و زیار از نظر شاخص SSI به ترتیب متحمل به تنش کم آبی بودند. بر اساس همین شاخص جمعیت های ازمیر، قاضی آنتپ، بناب، بیرجند، تتماج و خوشیدآباد به ترتیب حساس ترین جمعیت ها در برابر تنش کم آبی بودند. از نظر شاخص TOL جمعیت گرینه با داشتن کمترین مقدار این شاخص متحمل به تنش کم آبی بود. بنابراین جمعیت گرینه طبق نظریه فیشر و موور (۴) به عنوان جمعیت با عملکرد دانه بالا در شرایط تنش معرفی شد. بر اساس این شاخص جمعیت های بناب و بیرجند با مقادیر بالای TOL به عنوان جمعیت های حساس به تنش کم آبی شناسایی شدند. جمعیت های بناب، همدان، بیرجند و آلمان (۱۱۴۸۶) با مقادیر بالای شاخص STI به ترتیب جمعیت هایی با عملکرد بالا و متحمل در برابر تنش خشکی بودند. بر اساس این شاخص جمعیت های قاضی آنتپ، ازمیر، خوشیدآباد و تتماج به ترتیب حساس در برابر تنش کم آبی بودند. از آنجا که مقادیر پایین شاخص MP بیانگر حساسیت بیشتر ژنوتیپ ها به تنش می باشد (۱۹) بنابراین دو جمعیت قاضی آنتپ و خوشیدآباد بیشترین حساسیت را به تنش کم آبی داشتند. بر اساس همین شاخص جمعیت های بناب، بیرجند، آلمان (۱۱۴۸۶) و همدان به ترتیب متحمل به تنش کم آبی بودند. بر اساس شاخص GMP جمعیت های بناب، بیرجند، همدان و آلمان (۱۱۴۸۶) به ترتیب با مقادیر بالای این شاخص متحمل به تنش کم آبی بودند. در حالی که جمعیت های قاضی آنتپ، ازمیر و خوشیدآباد به ترتیب کمترین مقدار این شاخص را دارا هستند و حساس به تنش کم آبی بودند. جمعیت های همدان، بناب، بیرجند و آلمان (۱۱۴۸۶) با

همکاران (۸) نیز در تحقیق خود شاخص‌های MP، GMP و STI را به‌عنوان بهترین شاخص‌ها جهت شناسایی جمعیت‌های مقاوم به خشکی پیشنهاد کردند. همچنین طباطبایی و همکاران (۲۱) شاخص STI و GMP را به‌عنوان بهترین شاخص برای شناسایی اکوتیپ‌های مقاوم به تنش خشکی در زیره سیاه معرفی کردند. بنابراین چهار شاخص MP، GMP، HARM و STI با داشتن همبستگی مثبت و معنی‌دار با عملکرد دانه و اسانس در هر دو محیط تنش و بدون تنش و داشتن قدرت تفکیک جمعیت‌های گروه A به عنوان بهترین شاخص‌ها جهت شناسایی جمعیت‌های حساس و متحمل به تنش کم‌آبی در رازیانه شناسایی شدند. بر اساس این چهار شاخص مهم تحمل به خشکی، از نظر عملکرد دانه، جمعیت‌های بناب، همدان، بیرجند و آلمان (۱۱۴۸۶) به‌ترتیب جمعیت‌های با عملکرد دانه بالا و متحمل به تنش کم‌آبی و جمعیت‌های قاضی‌آنتپ، ازمیر و خورشیدآباد به‌ترتیب جمعیت‌های حساس به تنش کم‌آبی بودند. از نظر عملکرد اسانس نیز جمعیت‌های آلمان (۱۱۴۸۶)، بناب، بیرجند، همدان و آلمان (۱۱۸۲) بر اساس چهار شاخص تحمل به خشکی فوق، به‌ترتیب متحمل به تنش کم‌آبی بودند. همچنین جمعیت‌های خورشیدآباد و قاضی‌آنتپ بر اساس همین شاخص‌ها حساس به تنش کم‌آبی از نظر عملکرد اسانس بودند. بنابراین با توجه به مقادیر شاخص‌های تحمل به خشکی، جمعیت‌های بناب، بیرجند، آلمان (۱۱۴۸۶) و همدان از نظر عملکرد دانه و هم از نظر عملکرد اسانس متحمل به تنش خشکی شناسایی شدند و جمعیت آلمان (۱۱۸۲) از نظر عملکرد اسانس به‌عنوان جمعیت متحمل به خشکی شناسایی شد که توانست عملکرد اسانس مطلوبی در شرایط تنش خشکی داشته باشد. جمعیت‌های فوق به‌عنوان جمعیت‌های متحمل به تنش کم‌آبی برای مناطق گرم و خشک شناسایی شدند. جمعیت‌های قاضی‌آنتپ و خورشیدآباد به جهت حساسیت به تنش خشکی از نظر هر دو عملکرد دانه و عملکرد اسانس مناسب برای مناطق گرم و خشک مثل ایران نمی‌باشند.

مقادیر شاخص HARM، جمعیت‌های آلمان (۱۱۴۸۶)، آلمان (۱۱۸۲)، همدان، بناب، بیرجند و گرینه به ترتیب متحمل به تنش کم‌آبی و جمعیت‌های ازمیر، خورشیدآباد، قاضی‌آنتپ و تمام به ترتیب حساس به تنش کم‌آبی بودند. فرناندز (۳) بر اساس واکنش ژنوتیپ‌ها به شرایط دارای تنش و بدون تنش، ژنوتیپ‌ها را در چهار گروه تقسیم‌بندی کرد: گروه A: ژنوتیپ‌هایی که عملکرد مطلوبی در هر دو محیط دارای تنش و بدون تنش دارند. گروه B: ژنوتیپ‌هایی که تنها در محیط بدون تنش عملکرد مطلوب را دارند. گروه C: ژنوتیپ‌هایی که تنها در محیط دارای تنش عملکرد مطلوب را از خود نشان می‌دهند. گروه D: ژنوتیپ‌هایی که در هر دو محیط دارای تنش و بدون تنش عملکرد پایینی دارند. از نظر فرناندز (۳) مناسب‌ترین معیار گزینش، شاخصی است که بتواند ژنوتیپ‌های گروه A را از سایر گروه‌ها تشخیص دهد. برای تعیین بهترین شاخص تحمل به خشکی در گیاه دارویی رازیانه ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه در شرایط نرمال آبیاری و تنش کم‌آبی و شش شاخص تحمل به تنش مورد بررسی قرار گرفتند (جدول ۴). ضرایب همبستگی نشان می‌دهد که شاخص‌های HARM، MP، GMP و STI دارای همبستگی معنی‌دار و مثبتی با هم‌دیگر بودند. همبستگی عملکرد دانه و اسانس در شرایط تنش با شاخص‌های MP، GMP، STI و HARM مثبت و معنی‌دار بود. عملکرد دانه و اسانس در شرایط آبیاری نرمال با شاخص‌های MP، GMP، HARM و STI همبستگی مثبت و معنی‌دار داشت. طبق نظر فرناندز (۳) شاخصی که دارای همبستگی معنی‌دار و بالا با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش باشد به طوری که بر اساس نوع همبستگی باعث افزایش عملکرد در هر دو شرایط تنش و بدون تنش گردد به‌عنوان بهترین شاخص معرفی می‌شود. اکبری و همکاران (۱) ادعان داشتند که شاخص‌های HARM، GMP، MP و STI همبستگی مثبت و معنی‌داری با عملکرد دانه در هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی دارند و به‌عنوان شاخص‌های مناسب جهت گزینش ارقام پرمحصول رازیانه در هر دو شرایط شناسایی شدند. سی و سه مرده و همکاران (۲۰) و کریمی افشار و

جدول ۳- مقادیر شاخص‌های تحمل به خشکی از نظر عملکرد دانه و اسانس در جمعیت‌های مورد ارزیابی رازبانه

Table 3. Indices of tolerance to water deficit stress respect to grain and essential oil yield in the evaluated populati of fennel

	HARM		STI		GMP		MP		TOL		SSI		
جمعیت‌ها	عملکرد اسانس	عملکرد دانه	عملکرد اسانس	عملکرد دانه	عملکرد اسانس	عملکرد دانه	عملکرد اسانس	عملکرد دانه	عملکرد اسانس	عملکرد دانه	عملکرد اسانس	عملکرد دانه	
آلمان (۱۸۲)	۴/۳۱	۸۴/۰۶	۱/۴۸	-/۵۵	۴/۴۸	۸۷/۹۵	۴/۶۵	۹۲/۰۲	۲/۵۵	۵۴/۱۳	-/۹۰	-/۸۱	
آلمان (۱۱۴۸۶)	۴/۸۷	۱۰۸/۹۷	۲/۰۹	۱/۰۳	۱/۵۳	۱۲۰/۳۱	۵/۸۰	۱۳۲/۸۳	۴/۶۷	۱۱۲/۵۹	۱/۲۰	۱/۰۶	
قاضی آنتب	-/۴۹	۱۱/۵۳	-/۰۴	-/۰۲	-/۶۹	۱۶/۲۷	-/۹۷	۲۲/۹۶	۱/۳۶	۳۲/۴۰	۱/۷۳	۱/۴۸	
ازمیر	-/۲۲	۹/۵۰	-/۰۳	-/۰۳	-/۶۷	۳۱/۷۰	۱/۴۴	۴۹/۵۸	۲/۵۳	۸۹/۱۷	۱/۹۷	۱/۶۹	
بناب	۴/۰۲	۱۱۰/۸۱	۲/۰۸	۱/۶۴	۵/۳۱	۱۵۱/۸۷	۷/۰۰	۲۰۸/۱۳	۹/۱۳	۲۸۴/۶۴	۱/۶۵	۱/۴۵	
بیرجند	۷۳/۳	۱۰۰/۲۲	۱/۸۲	۱/۲۳	۴/۹۷	۱۳۱/۷۵	۶/۶۱	۱۷۳/۲۰	۸/۷۳	۲۲۴/۸۶	۱/۶۷	۱/۴۱	
تماچ	۱/۰۱	۳۱/۱۵	-/۱۳	-/۱۱	۱/۳۲	۴۰/۰۰	۱/۷۳	۵۱/۳۷	۲/۲۳	۶۴/۴۶	۱/۶۴	۱/۳۸	
ترت جام	۱/۳۲	۵۴/۷۰	-/۱۳	-/۲۳	۱/۳۴	۵۶/۷۶	۱/۳۷	۵۸/۹۱	-/۵۴	۳۱/۴۹	-/۶۹	-/۷۵	
خوشیدآباد	-/۴۷	۲۰/۰۸	-/۰۲	-/۰۵	-/۵۶	۲۵/۷۱	-/۶۵	۳۲/۹۱	-/۶۸	۴۱/۱۰	۱/۴۳	۱/۳۷	
خوروبایانک	۱/۶۶	۷۷/۷۰	-/۲۱	-/۵۰	۱/۷۰	۸۴/۱۶	۱/۳۳	۹۱/۱۶	-/۶۹	۷۰/۰۷	-/۷۰	-/۹۹	
خروسلی	۱/۳۱	۵۵/۷۷	-/۱۳	-/۲۷	۱/۳۱	۶۱/۷۹	۱/۳۱	۶۸/۴۶	-/۰۸	۵۸/۹۳	-/۱۳	۱/۰۷	
زار	۱/۲۶	۷۱/۳۸	-/۱۳	-/۳۶	۱/۳۴	۷۱/۶۶	۱/۴۱	۷۱/۹۵	-/۹۱	۱۲/۸۸	-/۹۹	-/۲۹	
شیروان	۲/۹۷	۷۷/۹۱	-/۶۶	-/۴۳	۳/۰۰	۷۸/۰۷	۳/۰۳	۷۸/۲۳	-/۸۵	۹/۹۹	-/۵۲	-/۲۱	
کرج	۱/۳۴	۵۲/۱۶	-/۱۵	-/۲۳	۱/۴۲	۵۶/۵۹	۱/۵۱	۶۸/۴۰	۱/۰۱	۴۷/۶۱	۱/۰۵	۱/۰۰	
کرمان	۲/۰۰	۷۲/۲۲	-/۳۲	-/۴۰	۲/۰۷	۷۵/۱۵	۲/۱۴	۷۸/۲۱	۱/۱۱	۴۲/۲۷	-/۸۶	-/۷۷	
لرستان	۱/۹۵	۵۸/۹۰	-/۲۸	-/۲۵	۱/۹۵	۵۹/۰۱	۱/۹۶	۵۹/۱۲	-/۲۳	۷/۳۰	-/۳۳	-/۲۱	
گرینه	۲/۰۴	۸۴/۶۳	-/۶۹	-/۵۱	۲/۰۵	۸۴/۶۳	۳/۰۷	۸۴/۶۳	-/۶۲	-/۴۸	-/۴۷	-/۰۱	
ورامین	۱/۷۲	۶۱/۱۵	-/۳۷	-/۳۳	۱/۹۰	۶۸/۰۹	۲/۰۹	۷۵/۸۳	۱/۷۵	۶۶/۷۵	۱/۲۴	۱/۰۹	
همدان	۴/۲۶	۱۳۲/۵۳	۱/۵۰	۱/۲۵	۴/۵۰	۱۳۲/۶۴	۴/۷۶	۱۳۲/۲۴	-۳/۱۰	۱۰/۵۰	۲/۰۳	-/۱۴	

جدول ۴- ضرایب همبستگی بین شاخص‌های مقاومت به تنش خشکی و عملکرد دانه اسانس در هر دو شرایط آبیاری مطلوب و تنش کم آبی
Table 4. Correlation coefficients between indices of drought resistance and grain and essential oil yield under normal irrigation and water deficit stress conditions

	SSI	TOL	MP	GMP	STI	HARM	Yp (عملکرد دانه)	Ys (عملکرد دانه)	Yp (عملکرد اسانس)
TOL	.۶۱**	۱							
MP	.۰۲	.۷۷**	۱						
GMP	-.۲۳	.۵۶*	.۹۶**	۱					
STI	-.۰۷	.۶۷**	.۹۸**	.۹۷**	۱				
HARM	-.۴۶*	-/۳۱	-/۸۳**	-/۹۶**	-/۸۸**	۱			
Yp (عملکرد دانه)	.۲۹	.۹۳**	.۹۵**	.۸۳**	.۹۰**	-/۶۵**	۱		
Ys (عملکرد دانه)	-.۷۲**	-.۰۳	.۶۲**	.۸۱**	.۷۰**	-/۹۳**	.۳۶	۱	
Yp (عملکرد اسانس)	.۰۳۴	.۸۹**	-/۹۴**	-/۸۶**	.۹۰**	-/۷۴**	.۰۳۲	.۰۹۵**	۱
Ys (عملکرد اسانس)	-./۶۰	-./۱۱۲	./۶۶**	-/۷۷**	./۷۰**	-/۸۵**	./۹۴**	./۳۴	./۳۶

* و ** معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪

منابع

1. Akbari, A., A. Izadi Darbandi, K. Bahmani and H.A. Rameshini. 2015. Evaluation of drought tolerance in synthetic varieties and superior ecotypes of fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.). Iranian Journal of Crop Sciences, 17 (3): 193-204 (In Persian).
2. Amiri Deh Ahmadi, S.R., P. Rezvani Moghaddam and H.P. Ehyae. 2012. The effects of drought stress on morphological traits and yield of three medicinal plants (*Coriandrum sativum*, *Foeniculum vulgare* and *Anethum graveolens*) in greenhouse conditions. Iranian Journal of Field Crops Research, 10 (1): 116-124 (In Persian).
3. Fernandez, G.C.J. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In: Kuo, C.G (edn.) Adaptation of Food Crops to Temperature and Water Stress. AVRDC Publication, Shanhua, Taiwan, 257-270 pp.
4. Fisher, R.A. and R. Maurer. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. Australian Journal of Agricultural Research, 29: 897-912.
5. Heidari, N., M. Pouryousef, A. Tavakkoli and J. Saba. 2012. Effect of drought stress and harvesting date on yield and essential oil production of anise (*Pimpinella anisum* L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 28(1): 121-130 (In Persian).

6. Heidarisharifabad, H. 2001. Plant, dryness and drought. Publications Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.
7. Jahanara, F. and B. Haerizadeh. 2001. Information and Application of Iranian Official Herbal Drugs. Razi Darou Gostar Pub (In Persian).
8. Karimi Afshar, A., A. Baghizade, Gh. Mohammadinezhad and J. Abedi. 2014. Evaluate genotypes cumin (*Cuminum cyminum* L.) under drought stress based on tolerance indicators. First International Congress and Thirteenth Congress of Genetics in Iran, Tehran, Iranian Genetics Society (In Persian).
9. Kuchaki, A., H. Hoseyni and M. Nasiri Mahallati. 1995. The relationship between water and land in crops. Iranian Academic Center of Education, Culture and Research, Mashhad (In Persian).
10. Mir Shekari, B. and F. Farahvash. 2012. Management of irrigation and nitrogen fertilizing in fennel (*foeniculum vulgare* Mill.) as a medicinal plant under semi-arid conditions. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 27(4): 541-555 (In Persian).
11. Mozaffarian, V. 1982. An identification key and distribution unbelliferae of Iran. Publicatin Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (In Persian).
12. Musavi, S.M., S.G.R. Musavi and M.J. Seghatoleslami. 2014. Effect of drought stress and nitrogen levels on growth, fruit and essential oil yield of fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.). Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 30(3): 453-462 (In Persian).
13. Noroozi Shahri, F., M. Pouryousef, A. Tavakoli, J. Saba and A. Yazdinezhad. 2015. Evaluation the performance of some of Iran's native fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) accessions under drought stress condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 46(1): 49-56 (In Persian).
14. Omid Beygi, R. 1997. Approaches to Production and Processing of Medicinal Plants 2th edn. Nashre Tarrah, Tehran. (In Persian)
15. Omid Beygi, R. 2007. Processing of Medicinal Plants 3th edn. Press Astan Qods Razavi. (In Persian).
16. Pouryousef, M. 2015. Effects of terminal drought stress and harvesting time on seed yield and essential oil content of fennel (*foeniculum vulgare* Mill.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 30(6): 889-897 (In Persian).
17. Rezaei Chiyaneh, E., S. Zehtab Salmasi, K. Ghasemi Golezani and A. Delazar. 2012. Physiological responses fennel (*Foeniculum vulgare* L.) to water limitation. Agroecology Journal, 4(4): 347-355 (In Persian).
18. Rizopoulous, S. and S. Diamantoglon. 1991. Water stress, induced diurnal variation in leaf water relation stomatal conductance, soluble sugar, lipids and essential oil content of *origanum majorana* L. Journal of Horticultural Science, 66: 119-250.
19. Rosielle, A.A. and J. Hambelin. 1981. Theoretical aspect of selection for yield in stress and non-stress environments. Crop Science, 21: 943-946.
20. SioSe Mardeh, A., A. Ahmadi, K. Poustini and V. Mohammadi. 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditioning. Field Crop Research, 98: 222-229.
21. Tabatabaii, S.M., Gh. Mohammadinezhad and Kh. Yusefi. 2014. Evaluation of yield and drought tolerance indices in ecotypes of cumin. Iranian Journal of Water Research in Agriculture (formerly soil and water sciences), 28 (1): 163-170 (In Persian).
22. Telci, I., I. Demirtas and A. Sahin. 2009. Variation in plant properties and essential oil composition of sweet fennel (*Foeniculum vulgare* M.) fruites during stage of maturity. Industrial Crops and Products, 30: 126-130.
23. Zargari, A. 1989. Medicinal Plants. 1th edn. University of Tehran Press, (In Persian).
24. Zhua, Z., Z. Lianga, R. Hana and X. Wang. 2009. Impact of fertilization on drought response in the medicinal herb *Bupleurum chinense* DC. Growth and saikosaponin production. Industrial Crops and Products, 29: 629-633.

Evaluation of Water Deficit Stress Tolerance in Populations of Fennel (*Foeniculum vulgare* M.) Using Drought Tolerance Indices

Milad Ghasemi¹, Saeid Aharizad², Ali Bandehagh³, Majid Norouzi³ and
Roghayeh Azhdari¹

1 and 3- M.Sc. Student in Plant Breeding and Associate Professor Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2- Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran, (Corresponding Author: s.aharizad@yahoo.com)
Received: May 25, 2017 Accepted: April 3, 2018

Abstract

Drought stress is one of the most important non-polluting environmental stresses affecting crop production. In order to identify tolerant fennel populations to water deficit stress and determine the most effective drought tolerance indices, an experiment was conducted in randomized complete block design with three separate replications under limited and normal condition of irrigation with 19 fennel populations at the Agricultural Research Station, University of Tabriz in 2016. Water deficit stress applied during the beginning of flowering by disruption irrigation. Routine irrigation performed for normal condition. Combined analysis of variance showed that there is significant difference ($p < 0.01$) between two irrigation condition and also populations for most traits. Population \times condition interaction of most traits was significant ($p < 0.01$). The results showed that the number of umbels per plant, number of grain per umbel, grain weight, grain yield and essential oil yield in all evaluated populations are reduced under water deficit stress conditions. While the essential oil of the whole population increased in the water deficit stress conditions. Evaluation of population from the drought tolerance was performed by six different index SSI, TOL, MP, STI, GMP and HARM. According to positive correlation indices MP, GMP, HARM and STI with grain yield and essential oil yield, under normal and water deficit stress condition of irrigation this four indicators were identified as the most effective index for determining drought tolerant populations. According to the four major indices, Bonab, Birjand, Germany (11486) and Hamedan populations were identified as water deficit stress tolerant and Qazyantp and Khorshidabad populations were identified as sensitive to water deficit stress. The comparison results showed that Bonab population was the best a population from the important characteristics such as grain yield, essential oil yield, umbels per plant, grain weight and biomass under normal irrigation conditions and from the umbel per plant under stress conditions.

Keywords: Correlation, Essential Oil, Fennel, Grain Yield, Water Deficit Stress