



گزینش ژنتیک‌های پرمحصول با عملکرد روغن بالا در لاین‌های جهش (*Brassica napus* L.)

مهرزاد احمدی^۱، منصور امیدی^۲، بهرام علیزاده^۳ و علی‌اکبر شاه نجات بوشهری^۴

^۱ دانشجوی دکتری و استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

^۲ استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، (نویسنده مسؤول) (momidi@ut.ac.ir)

^۳ دانشیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

^۴ تاریخ دریافت: ۹۶/۶/۲۹ تاریخ پذیرش: ۹۶/۶/۱۹

چکیده

به منظور مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ۱۶ لاین جهش یافته کلزا (*Brassica napus* L.), به همراه رقم‌های طایله، زرفام، اکسپرس و شاهد اوکاپی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در طی سال زراعی ۱۳۹۴-۹۵ در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. تجزیه واریانس داده‌ها حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار بین ژنتیک‌های مورد بررسی از حیث طول دوره رویش و عملکرد دانه و روغن بود. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که لاین جهش یافته Z-800-6 بیشترین عملکرد دانه و روغن را نسبت به شاهد اوکاپی داشت. بیشترین و کمترین تعداد روز تا رسیدگی با ۲۵۶ و ۲۳۸ روز به ترتیب مربوط به لاین‌های جهش یافته-6 T-800-1 و Exp-900-1 بود. تجزیه به مولفه‌های اصلی، سه مولفه را مشخص کرد که بیش از ۷۹ درصد از تنوع موجود را توجیه کردند که به ترتیب عملکرد دانه، زمان گلدهی و عملکرد روغن بودند. بر مبنای نتایج رگرسیون گام‌به گام صفات تعداد خورجین در بوته و در شاخه‌های فرعی، طول خورجین در ساقه اصلی و وزن هزار دانه بیشترین تغییرات صفت عملکرد را توجیه کردند و می‌توان از این صفات به عنوان یک شاخص برای اصلاح در جهت افزایش عملکرد دانه و روغن استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: تجزیه به مولفه‌های اصلی، عملکرد دانه، کلزا و جهش یافته

طور موقعيت‌میزی در کلزا و سایر گیاهان به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی و جداسازی جهش یافته‌هایی با صفات اقتصادی مطلوب استفاده شده است (۲۰، ۲۷، ۲۷). پرتوتابی اشعه گاما و ایکس به طور گسترده به منظور القاء جهش در گیاهان زراعی استفاده شده است (۱۰). در مطالعه‌ای که روى پرتوتابی بذر سه رقم کلزا اساري گل، RGS003 و زرفام با سه شدت مختلف پرتو گاما صورت گرفت، پايداري تغييرات ژنتيکي القائي صفات زراعي، در ۶۶ لاین جهش یافته انتخابي از نسل M4 بررسی شد. ۲۲ لاین انتخاب شده نسل M5 نيز از حيث صفات زراعي مهم ارزياي شدند. نتایج تجزیه واریانس داده‌های حاصل، تفاوت معنی‌داری در تمامی صفات مورد مطالعه در لاین‌های آزمایشی نشان داد. بیشترین ضريبه تغییرات مربوط به تعداد خورجین در شاخه فرعی ۲۹/۵٪ درصد بود (۱۶). در بررسی ارتباط صفات مختلف با عملکرد دانه به کمک رگرسیون مرحله‌ای (گام به گام) نیز وزن هزار دانه به عنوان مهم‌ترین صفت تعیین‌کننده عملکرد شناخته شد. بنابراین با توجه به تنوع القاء شده در صفات مورفو‌لوجیک می‌توان از بین لاین‌های جهش یافته ارزیابی شده، گزینه‌های مناسب را برای برنامه‌های ژنتیکی - اصلاحی آینده کلزا انتخاب نمود (۱۷). در بررسی حاضر با هدف شناسایی ارقام پرمحصول و برتر از رقم رایج منطقه (رقم اوکاپی)، لاین‌های گزینش شده از بین نتایج جهش یافته به دست آمده از سه رقم کلزا زمستانه طایله، زرفام و اکسپرس ارزیابی شدند.

مواد و روش‌ها

این آزمایش طی سال زراعی ۱۳۹۴-۹۵ در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج با موقعیت طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۵۹ دقیقه شرقی و عرض

مقدمه تولید روغن خوارکی در ایران، تنها ده درصد مصرف سالیانه کشور را تامین کرده و جوابگوی نیاز مصرف کننده داخل کشور نیست (۸). کلزا با نام علمی (28) *Brassica napus* بعد از سویا رتبه دوم از حیث تولید دانه و پس از سویا و نخل روغنی رتبه سوم از حیث تولید روغن را به خود اختصاص داده است. میزان تولید جهانی دانه کلزا در سال زراعی ۱۳۹۴-۹۵ برابر ۷۱/۵ میلیون تن بوده و چین، کانادا، هندوستان، اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان - عمده‌ترین تولیدکنندگان کلزا و کشور کانادا مهم‌ترین صادر کننده دانه و روغن کلزا هستند (۸). کلزا یکی از گیاهان روغنی است که توانایی جبران کمبود روغن خوارکی در ایران را دارد. عوامل زیادی سبب کاهش عملکرد این محصول می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها عدم دسترسی به ارقام پرمحصول است. بدین منظور توسعه ارقام پرمحصول شکاف بین تولید داخلی و واردات روغن خوارکی را در کشور پر خواهد کرد (۱۳). افزایش تنوع ژنتیکی امکان انتخاب ژنتیک‌های مطلوب را فراهم می‌کند (۱۱). اگرچه اکثر گونه‌های *Brassica napus* خودسازگار هستند، گونه آمفی‌دیپلولئید *Brassica napus* خودسازگار بوده (۲۲) و روش‌های اصلاحی آن با تکیه بر توسعه گیاهان خودگشن استوار است (۴). عموماً گیاهان خودبار رو تنوع ژنتیکی کمی دارند. روش‌های متعددی برای افزایش تنوع ژنتیکی در اصلاح گیاهان وجود دارد. یکی از این روش‌ها به نژادی از طریق ایجاد جهش است. جهش منبع مهمی برای القاء تنوع در گیاهان است. القاء جهش به صورت موقعيت‌آمیزی برای اصلاح صفات اقتصادی و صفات کیفی در مدت زمان کوتاه استفاده می‌شود (۱۵). به نژادی جهشی به

(۱۳۹۵) صورت گرفت. در طول دوره رویش یادداشت برداری صفات مختلف مشتمل بر ارتفاع بوته، تعداد خورجین در ساقه‌های اصلی، فرعی و کل بوته، تعداد شاخه فرعی، طول شاخه اصلی، تعداد دانه در خورجین اصلی و فرعی، ارتفاع اولین خورجین از زمین، قطر ساقه (اندازه‌گیری قطر ساقه معمولاً از ۱۰ سانتی‌متری سطح زمین صورت می‌گیرد). طول خورجین اصلی و فرعی، تعداد روز تا شروع گلدهی، پایان گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی کامل، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن، درصد روغن دانه یادداشت برداری و ثبت شد. در پایان سال زراعی محصول هر کرت آزمایشی به طور جداگانه برداشت، ضمن ثبت مشخصات توزین شده، میزان روغن تیمارها با استفاده از دستگاه NMR¹ در آزمایشگاه تجزیه روغن بخش تحقیقات دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تعیین و در نهایت لاین‌های برتر مشخص گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات تجزیه‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS نسخه ۹.۴ انجام گرفت. مقایسه میانگین لاین‌های جهش‌یافته و شاهد به روش حداقل تفاوت معنی‌دار فیشر (FLSD) در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۸ دقیقه شمالی و ارتفاع ۱۲۶۰ متر از سطح دریا انجام شد. در این تحقیق سه رقم کلزا به اسمی زرفام، طلایه و اکسپرس همراه با ۱۶ لاین جهش‌یافته که از پرتوتابی ارقام فوق باشدت‌های ۱۲۰۰-۹۰۰ پرتو گام و پس از هفت نسل خویش‌آمیزی بدست آمده‌اند، همراه با رقم رایج منطقه اوکاپی در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و مورد بررسی قرار گرفت (جدول ۱). در این بررسی هر تیمار در یک کرت چهار خطی به طول چهار متر کشت شد. فاصله خطوط از یکدیگر ۳۰ سانتی‌متر و در مساحت هر کرت ۳/۶ متر مربع در نظر گرفته شد. عملیات آماده‌سازی زمین شامل شخم، دیسک و لولر در تابستان انجام شد و کودهای شیمیایی شامل کود کامل (۱۰۰ کیلوگرم در هکتار)، سوپرفسفات تربیل (۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) و سولفات پتاسیم (۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) در زمان تهیه زمین استفاده شد. کشت در تاریخ پنجم مهرماه سال ۱۳۹۴ انجام گردید. مبارزه با شته مومنی کلم با سم سیستمیک متاسیستوکس در غلظت دو در هزار در مرحله گلدهی صورت گرفت. مبارزه با علف‌های هرز به صورت وجین دستی در ۳ نوبت (دو نوبت در آبان و بهمن ۱۳۹۴ و یک نوبت فروردین

جدول ۱- مشخصات ارقام و لاین‌های مورد استفاده

Table 1. Characteristic of Cultivars and lines used in this research

کردنام	ارقام و لاین‌ها	کردنام	ارقام و لاین‌ها
T-800-1	T2	Zarfam	Z1
T-800-6	T3	Z-800-3	Z2
T-900-4	T4	Z-800-6	Z3
T-900-5	T5	Z-900-3	Z4
T-1200-1	T6	Z-900-6	Z5
Express	E1	Z-900-7	Z6
Exp-800-1	E2	Z-900-8	Z7
Exp-800-3	E3	Z-900-9	Z8
Exp-900-1	E4	Z-900-10	Z9
Okapi	O	Talayeh	T1

کشت دوم برای کشاورزان را میسر می‌سازد. در این بررسی رقم زرفام با ۱۵۷ روز، کمترین و رقم اوکاپی با ۱۸۴ روز، بیشترین تعداد روز از کاشت تا گلدهی را داشت. لاین جهش‌یافته-1 Exp-900-1 با ۲۳۸ روز کمترین و ۶- T-800 با ۲۵۳ روز بیشترین تعداد روز تا رسیدگی کامل را داشتند (شکل ۲). تعداد روز تا رسیدگی کامل در ارقام اکسپرس و طلایه به ترتیب ۲۴۵ و ۲۴۲ روز و در رقم شاهد اوکاپی ۲۵۰ روز بودست آمد. در یک بررسی که روی جهش‌یافته‌های رقم RGS003 و ساری‌گل حاصل از اشعه گاما صورت گرفت، تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی کامل در لاین‌های جهش‌یافته نسبت به والد خود کاهش نشان داد (۲). ارتفاع گیاه صفت تاثیرگذار بر عملکرد کلزا است. کاهش ارتفاع باعث افزایش کودپذیری و تحمل به خواهدگی شده و در نتیجه موجب افزایش عملکرد دانه و روغن می‌شود (۱۰). براساس نتایج مقایسه میانگین، تفاوت به صورت افزایشی و کاهشی در ارتفاع گیاه در برخی از لاین‌ها جهش‌یافته نسبت به شاهد مشاهده شده است. در بین لاین‌های جهش‌یافته، رقم زرفام کمترین ارتفاع (۱۳۷ سانتی‌متر) و ۶- T-800 بیشترین ارتفاع (۱۸۳ سانتی‌متر) را داشتند. از میان لاین‌های جهش‌یافته، لاین Z-900-3 با ارتفاع ۱۴۷/۳ سانتی‌متر کمترین ارتفاع را

نتایج و بحث

ارزیابی صفات زراعی ژنتیپ‌ها در هر سه شدت پرتوتابی اشعة گاما انجام شد. صفات ارتفاع بوته، تعداد خورجین در شاخه اصلی، فرعی و کل بوته، ارتفاع اولین خورجین از زمین، وزن هزار دانه، طول خورجین فرعی، عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن در سطح یک درصد و صفات تعداد شاخه فرعی، قطر ساقه، طول خورجین اصلی، تعداد روز تا شروع گلدهی و رسیدگی کامل، در سطح پنج درصد معنی‌دار بودند (جدول ۲) که نشان‌دهنده تاثیر معنی‌دار پرتوتابی گاما در تعدد صفات مورد مطالعه است. مقایسه میانگین لاین‌های جهش‌یافته با رقم اوکاپی به عنوان شاهد نشان داد که بیشتر لاین‌های جهش‌یافته دارای ارزش بیشتری از نظر صفات مورد بررسی می‌باشند. لازم به ذکر است که در میان لاین‌های جهش‌یافته، لاین‌هایی که ارزش صفات‌شان کمتر از رقم والد باشد نیز وجود داشت. کوتاه شدن دوره کاشت تا شروع گلدهی و نیز کوتاه شدن دوره رویش رقم موجب می‌شود که زراعت به یک یا دو نوبت آبیاری کمتری نیاز داشته و امکان کشت آن در مناطق با محدودیت آب فراهم آید. همچنین در مناطقی که آب کافی برای کشاورزی در دسترس است، جلو افتادن تاریخ برداشت محصول انجام

بيان کننده تاثیرپذیری بیشتر این صفت نسبت به مقادیر مختلف پرتودهی اشعه گاما می‌باشد (۲۳). در یک پژوهش که اثر اشعه گاما با شدت‌های مختلف (۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ گری) روی دو رقم RGS003 و ساری‌گل صورت گرفت، تعداد خورجین در بوته در شدت ۱۰۰۰ افزایش یافت و شدت ۱۲۰۰ گری اثر کاهشی در این صفت نشان داد (۷). طول خورجین یکی از اجزای موثر بر عملکرد کلزا می‌باشد که با انتخاب برمنای این صفت به طور غیرمستقیم می‌توان به افزایش عملکرد و در نتیجه افزایش عملکرد روغن دست یافت. طول خورجین اصلی در لاین Z-800-6 (با طول ۶/۷۶ سانتی‌متر) بیشترین و طول خورجین فرعی در Exp-800-3 (با طول ۶/۸ سانتی‌متر) بیشترین مقدار را داشت (جدول ۳).

جهش‌یافته‌هایی با افزایش طول خورجین در کلزا گزارش شده است (۲۴، ۲۶). در بررسی که بر روی تاثیر پرتو اشعه گاما در رقم آلتکس^۱ در شدت‌های ۱۵، ۱۰، ۲۰، ۲۵، ۳۰ گراد صورت گرفت، افزایش شدت پرتوتابی باعث افزایش تعداد بذر و طول خورجین شد (۱۹). وزن هزار دانه صفتی مهم در عملکرد است. وزن هزار دانه در لاین جهش‌یافته ۴-4 (T-900-5/۱۶ گرم) بیشترین و در لاین Z-800-3 (۳/۶۳ گرم) کمترین مقدار را داشت. در بررسی که بر روی جهش‌یافته‌های رقم RGS003 و ساری‌گل حاصل از اشعه گاما صورت گرفت، وزن هزار دانه جهش‌یافته‌ها نسبت به والد خود افزایش نشان داد (۲).

در پژوهش حاضر پرتوتابی اشعه گاما موجب افزایش معنی‌دار عملکرد برخی از لاین‌های جهش‌یافته شد. لاین جهش‌یافته ۶-Z-800-6 (با عملکرد ۵۲۷۷/۲ کیلوگرم در هکتار) بیشترین عملکرد را نسبت به شاهد اوکاپی (با عملکرد ۱۶۵۹ کیلوگرم در هکتار) داشتند (جدول ۳). در بررسی‌های متعدد سایر محققان نیز مشخص گردید که میانگین عملکرد دانه لاین‌های جهش‌یافته تقاضوت معنی‌دار افزایشی یا کاهشی را نشان می‌دهند (۱۸، ۱۶، ۲۹).

عملکرد روغن در لاین‌ها با شاهد اختلاف معنی‌داری داشت. لاین جهش‌یافته ۶-Z-800-6 (با عملکرد ۲۰۴۵/۴ کیلوگرم در هکتار) بیشترین عملکرد روغن را داشت (جدول ۳). در مطالعات دیگری نیز نتایج مقایسه میانگین حاکی از تقاضوت معنی‌دار عملکرد روغن برخی از لاین‌های جهش‌یافته به صورت افزایشی نسبت به ارقام شاهد بوده است (۹).

داشت (جدول ۳). در تحقیقی که توسط رحیمی و همکاران (۲۰) بر روی جهش‌یافته‌های ارقام طلایه و اوکاپی حاصل از شدت‌های ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ گری انجام شده، بیشترین ارتفاع در رقم اوکاپی با تیمار ۲۰۰ گری بوده که باعث خواهدگی گیاه شد و رقم طلایه نیز با تیمار ۵۰۰ گری کمترین ارتفاع را داشت. در بررسی دیگر جهش‌یافته‌های پاکوتاه با عملکرد بالا از طریق تیمار موتاژن گاما در جمعیتی از خرد بدبست آمد (۱۴). قطر ساقه صفتی مهم در زودرسی گیاه است. اکثر ژنوتیپ‌هایی با قطر ساقه کمتر تیپ بهاره هستند. لاین Z-900-6 کمترین قطر ساقه (۱/۲ سانتی‌متر) و لاین T-1200-1 بیشترین قطر ساقه (۱/۸۳ سانتی‌متر) را داشتند (جدول ۳).

تعداد شاخه فرعی در عملکرد بوته تاثیرگذار است. در بررسی حاضر بیشترین تعداد شاخه فرعی در T-800-1 و کمترین مقدار آن در Z-900-6 با ۶ شاخه فرعی به دست آمد (جدول ۳). در تحقیقی که اثر شدت‌های مختلف پرتو گاما (۱۰۰ الی ۶۰۰ گری) بر گیاه کلزا مورد بررسی قرار گرفت، در شدت‌های بالا تعداد شاخه‌های فرعی در گیاه افزایش یافت (۱). ارتفاع اولین خورجین از زمین صفتی مهم در هنگام برداشت ماشینی است. رقم طلایه بیشترین ارتفاع (۱۲۴ سانتی‌متر) و کمترین مقدار این صفت در رقم زرفام (۷۷/۷ سانتی‌متر) به دست آمد (جدول ۳). صفت ارتفاع اولین خورجین از زمین در جهش‌یافته‌های رقم طلایه نسبت به والد خود کاهش داشته است. این روند در ژنوتیپ‌های اکسپرس و زرفام افزایشی بوده است. در بررسی حاضر تعداد خورجین گیاه در برخی از لاین‌های جهش‌یافته در هر سه شدت اشعه گاما به طور معنی‌دار در مقایسه با شاهد افزایش یافت. لاین Z-800-6 بیشترین تعداد خورجین در شاخه‌های اصلی (۶۷ عدد)، در شاخه فرعی (۵۰۸) و کل بوته (۵۷۵ عدد) را دارا بود. همچنین در بین جهش‌یافته‌های مورد بررسی لاین جهش‌یافته ۵-T-900-5 بیشترین تعداد خورجین در شاخه فرعی (۶۵۶ عدد) را دارا بود. تعداد خورجین در شاخه‌های فرعی و کل بوته بیشترین ضریب تغییرات را داشت. محققان زیادی به افزایش تعداد خورجین در کلزا تحت تیمار اشعه گاما اشاره نموده‌اند (۳، ۲۵، ۵). در مطالعه‌ای دیگر روی نسل‌های M1 و M2 مشخص شد که صفت تعداد خورجین در شاخه‌های فرعی در اکثر موارد بیشترین ضریب تغییرات را نشان داده که

جدول ۲- تجزیه واریانس صفات زراعی در لاین های چهش یافته و رقم شاهد اوکاپی

Table 2. Analysis of variance for agronomic traits in mutant lines and control variety Okapi

		میانگین مریبات																		
علوکرد روغن	درصد روغن	علوکرد دانه	وزن هزار دانه	تعادل دانه در خوبین فرعی	تعادل دانه در خوبین اصلی	مول خوبین فرعی	مول خوبین اصلی	علو ساقه اصلی	تفاوت خوبین در بُوهه	تساد خوبین در شانه فرعی	تساد خوبین در شانه اصلی	ارفاغ اولین خوبین از زعن	تساد شانه فرعی	قطع ساقه	ارفاغ بوته	روز نا رسیدگی کلتر	روز نا شروع گلدهی	درجه آزادی	میانگین تغییر	
۶/۵۳ ^{ns}	۱/۱۳ ^{ns}	۹۹.۲/۶۵ ^{ns}	-/-۰۰۳ ^{ns}	-/-۰۱ ^{ns}	۱/۵۳ ^{ns}	-/-۰۲۳ ^{ns}	۲۸/۶۱ ^{ns}	۷۷۸۲۶/۱ ^{**}	۵۸.۰۵۸ [*]	۱۵۴/۱۳ ^{ns}	۱۶۰/۵۴ ^{ns}	۲/۷ ^{ns}	-/۲۴۳ [*]	۵۹/۹۲ ^{ns}	۵۷/۴۱ ^{ns}	۴/۸ ^{ns}	۸۸/۴۰ ^{ns}	۲	بلوک	
۲۸۱۴۹۴۲/۳ ^{**}	۶/۱۱ ^{**}	۲۴۳۴۵۴۳۲/۵ ^{**}	-/۴۲ ^{**}	۱۵/۳۳ ^{ns}	۱۳/۴۸ ^{ns}	۸/۶۸ ^{**}	-/۴۱ [*]	۱۴۱/۶۳ ^{ns}	۴۱۵۶۹/۹ ^{**}	۳۷۷۴۶۲/۴ ^{**}	۳۷۷۸/۷۴ ^{**}	۴۰۰/۶۵ ^{**}	۲/۷۲ [*]	-/۱۱۳ [*]	۷۸۳۵/۷۳ ^{**}	۴۰/۶۲ [*]	۱۸/۳۰ ^{ns}	۱۰.۶/۸۵ [*]	۱۹	زن ترتیب
۲۴۷۳۱	۲/۵۰	۱۳۶۸۳۸/۱	-/۰۷	۶/۰۱	۱۲/۶۸	-/۱۰	-/۲۰	۸۲/۵	۸۷۰۲/۸۵	۸۱۶۴/۲	۷۱/۹۴	۱۰.۶/۵۴	۱/۲۶	-/۰۴۵	۱۵۹/۵۴	۲۱/۳۹	۱۰/۴۶	۴۸/۳۴	۳۸	اشتباه
۱۲/۹۸	۴/۱۱	۱۱/۷۵	۵/۷۳	۸/۱۹	۱۱/۷۶	۵/۳	۷/۲۴	۱۶/۴۳	۱۷/۷	۱۹/۶۲	۱۱/۹۹	۱۰/۴۰	۱۴/۳۲	۱۴/۰۱	۷/۶۲	۱/۸۹	۱/۵۲	۴/۲۶	CV	آزمایش

ns و ** : به ترتیب غیر معنی داری، معنی داری در سطح احتمال پنج و یک درصد

جدول ۳- مقایسه میانگین صفات مورفوژیکی و زراعی لاین‌های جهش‌یافته و رقم شاهد اوکاپی
Table 3. Mean comparison of morphological and agronomical traits mutant lines and control variety, Okapi

شماره لاین‌ها	گلدهی کامل	روز تا رسیدگی	ارتفاع بوته (سانتی‌متر)	قطر ساقه (سانتی‌متر)	تعداد خورجین در شاخه فرعی	ارتفاع اولین خورجین در شاخه اصلی (سانتی‌متر)	تعداد خورجین در شاخه فرعی	ارتفاع اولین خورجین از زمین (سانتی‌متر)	تعداد خورجین در شاخه فرعی
Zarfam	۱۵۷/۷ ^{cb}	۲۴۲/۰ ^{dc}	۱۳۷/۳ ^f	۱/۵ ^{a-e}	۷۷/۷ ^b	۴۸ ^{b-e}	۲۲۷/۷ ^{c-g}	۹/۷ ^{ba}	۴۸ ^{b-e}
Z-800-3	۱۶۶ ^{bc}	۲۴۶/۷ ^{a-c}	۱۵۷/۹ ^{c-e}	۱/۷ ^e	۹۵/۲ ^{g-c}	۴۲ ^{ed}	۲۰/۱ ^{۳gf}	۷/۸ ^{a-e}	۹۵/۲ ^{g-c}
Z-800-6	۱۵۸ ^{bc}	۲۴۶/۰ ^{a-d}	۱۶۱/۲ ^{e-d}	۱/۶ ^{d-a}	۸۷/۸ ^{h-f}	۶۷/۶ ^a	۵۰/۸/۲ ^a	۷/۸ ^{a-e}	۸۷/۸ ^{h-f}
Z-900-3	۱۶۳ ^{bc}	۲۴۰/۳ ^{cd}	۱۴۷/۳ ^f	۱/۴ ^{c-e}	۸۷/۹ ^{hg}	۴۶ ^{e-c}	۳۲۸/۷ ^c	۷/۷ ^{a-e}	۸۷/۹ ^{hg}
Z-900-6	۱۵۷/۳ ^c	۲۴۵/۶۷ ^{b-d}	۱۵۷/۹ ^{c-f}	۱/۳ ^{e-d}	۹۲/۶ ^{c-h}	۴۱/۶ ^{ed}	۱۷۳ ^{gh}	۶ ^e	۹۲/۶ ^{c-h}
Z-900-7	۱۶۵ ^{bc}	۲۴۵/۶۷ ^{b-d}	۱۸۱/۹ ^{ba}	۱/۸ ^{c-a}	۱۰/۹/۱ ^{d-a}	۳۷/۶ ^c	۲۲۸/۶۷ ^{g-e}	۶/۸ ^{de}	۱۰/۹/۱ ^{d-a}
Z-900-8	۱۶۰/۳ ^{bc}	۲۴۱/۰ ^{cd}	۱۵۴ ^{f-d}	۱/۳ ^{e-d}	۹۲/۲۳ ^{h-d}	۶۶ ^a	۳۳۴/۶ ^c	۷/۸ ^{de}	۹۲/۲۳ ^{h-d}
Z-900-9	۱۶۱ ^{bc}	۲۴۷/۳ ^{a-c}	۱۷۶/۲ ^{c-a}	۱/۶ ^{d-a}	۹۴/۱ ^{h-c}	۵۱/۶ ^{b-d}	۲۷۳/۳ ^{e-c}	۷/۸ ^{e-b}	۹۴/۱ ^{h-c}
Z-900-10	۱۶۰/۳ ^{bc}	۲۴۱/۶۷ ^{cd}	۱۷۲ ^{a-d}	۱/۲ ^{c-d}	۱۰/۷/۶ ^{e-b}	۵۲/۶ ^{bc}	۳۲۰/۴ ^{c-d}	۱/۳ ^{d-a}	۱۰/۷/۶ ^{e-b}
Talaye	۱۶۰/۳ ^{bc}	۲۴۴/۶۷ ^{dc}	۱۸۲/۲ ^a	۱/۳ ^{e-d}	۱۲۴/۸ ^a	۴۰/۱ ^{ed}	۱۷ ^{hg}	۹ ^{a-c}	۱۲۴/۸ ^a
T-800-1	۱۶۱/۳ ^{bc}	۲۴۲/۳ ^{dc}	۱۷۲/۱ ^{a-d}	۱/۵ ^{a-d}	۹۶/۸ ^{c-f}	۴۲/۶ ^{c-e}	۲۱۱ ^{g-e}	۹/۶ ^{c-f}	۹۶/۸ ^{c-f}
T-800-6	۱۶۷ ^{bc}	۲۴۰/۳ ^a	۱۸۳/۱ ^a	۱/۵ ^{e-a}	۱۲۰/۵ ^{ba}	۵ ^{c-d}	۳۱۶/۷ ^{c-d}	۸/۱ ^{d-a}	۱۲۰/۵ ^{ba}
T-900-4	۱۶۲/۳ ^{bc}	۲۴۴ ^{c-d}	۱۶۴/۴ ^{a-e}	۱/۷ ^e	۹۱/۵ ^{e-h}	۴۲ ^{de}	۲۴۴/۶۷ ^{ff}	۷/۶ ^{g-f-a}	۹۱/۵ ^{e-h}
T-900-5	۱۶۰/۳ ^{bc}	۲۴۲/۶۷ ^{dc}	۱۶۲/۹ ^{a-e}	۱/۷ ^e	۹۷/۷ ^{g-c}	۴۰/۶ ^{ed}	۱۶۷/۲ ^{gh}	۸ ^{d-a}	۹۷/۷ ^{g-c}
T-1200-1	۱۶۰/۳ ^{bc}	۲۴۱/۳ ^{dc}	۱۶۹/۹ ^{a-d}	۱/۸ ^a	۱۰/۵ ^{b-e}	۴۳/۲ ^{c-d}	۲۴۸ ^{ef}	۹/۱ ^{ba}	۱۰/۵ ^{b-e}
Express	۱۶۸/۳ ^{bc}	۲۴۵/۶۷ ^{d-c}	۱۷۱/۱ ^{a-d}	۱/۴ ^{c-e-a}	۹۷/۱ ^{g-c}	۴۴/۳ ^{c-d}	۲۴۹/۳ ^{fe}	۷/۷ ^{e-c}	۹۷/۱ ^{g-c}
Exp-800-1	۱۶۹/ ^b	۲۴۱/۶۷ ^{dc}	۱۵۷/۱ ^{c-f}	۱/۴ ^{e-c}	۹۷/۹ ^{g-c}	۴۵/۶ ^{e-c}	۲۵۶/۷ ^{d-f}	۸/۱ ^{d-a}	۹۷/۹ ^{g-c}
Exp-800-3	۱۶۰/۳ ^{bc}	۲۴۰/۰ ^{dc}	۱۶۸/۱ ^{a-d}	۱/۵ ^{e-a}	۱۰/۹/۵ ^{c-a}	۴۴ ^{c-e}	۳۴۱/۳ ^c	۷/۶ ^{e-b}	۱۰/۹/۵ ^{c-a}
Exp-900-1	۱۶۰/۳ ^{bc}	۲۳۸/۶۷ ^d	۱۶۸/۲ ^{a-d}	۱/۴ ^{e-d}	۹۸/۹ ^{g-c}	۵۷/۶ ^{ba}	۴۲۷/۳ ^b	۱۰/۴/۳ ^{f-b}	۹۸/۹ ^{g-c}
Okapi	۱۸۴/ ^a	۲۵۰/۰ ^{ab}	۱۶۸/۰ ^a	۱/۸ ^{a-d}	۱۰/۴/۳ ^{f-b}	۳۷/۶ ^c	۱۲۵ ^h	۸ ^{a-d}	۱۰/۴/۳ ^{f-b}
LSD 5%	۱۱/۶۱	۷/۷	۲۰/۷۲	۰/۲۴	۱۷/۲۶	۹/۷۷	۶۱/۰/۸	۱/۶۸	۹/۷۷

میانگین‌های دارای حروف مشابه در ستون تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال ۵ درصد ندارند

ادامه جدول ۳- مقایسه میانگین صفات مورفوژیکی و زراعی لاین‌های جهش‌یافته و رقم شاهد اوکاپی
Continued Table 3. Mean comparison of morphological and agronomical traits mutant lines and control variety, Okapi

شماره لاین‌ها	تعداد خورجین در بوته (سانتی‌متر)	طول خورجین اصلی (سانتی‌متر)	طول خورجین در شاخه فرعی (سانتی‌متر)	وزن هزار دانه (گرم)	عملکرد رونمایشی	عملکرد دارنه (کیلوگرم در هکتار)	عملکرد رونمایشی (کیلوگرم در هکتار)	عمکردن رونمایشی (کیلوگرم در هکتار)
Zarfam	۲۷۵/۷ ^{n-l}	۵/۱۸ ^{m-n-c}	۶/۰۶ ^{c-1}	۳/۸۵ ^{ca}	۲۷۹۱/۶ ^{g-i}	۲۵۱۳/۹ ^{h-j}	۹۸/۹ ^{K-k}	۹۸/۹ ^{K-k}
Z-800-3	۲۴۳/۲ ^{gn}	۵/۵ ^{c-a}	۵/۵ ^g	۵/۶ ^g	۴۲ ^{ed}	۵۲۷۷/۲ ^a	۲۰/۴/۷ ^a	۹۱۵/۴ ^{K-1}
Z-800-6	۵۷۶ ^a	۶/۷۶ ^a	۵/۸۷ ^{e-g}	۴/۹۴ ^a	۴۲ ^{ed}	۵۲۷۷/۲ ^a	۲۰/۴/۷ ^a	۲۰/۴/۷ ^a
Z-900-3	۳۷۴/۶۷ ^{dc}	۵/۹۶ ^{a-c}	۵/۹۳ ^g	۴/۸۱ ^a	۳۵۴/۱/۶ ^{f-d}	۳۵۴/۱/۶ ^{f-d}	۱۳۷۳/۲ ^{I-C}	۱۳۷۳/۲ ^{I-C}
Z-900-6	۲۱۴/۶۷ ⁱⁿ	۵/۸۳ ^{a-b}	۵/۸۳ ^g	۵/۸۷ ^{gi}	۳/۹۶ ^{b-d}	۲۲۷۷/۸ ^{ji}	۹۰/۲/۸ ^{K-1}	۹۰/۲/۸ ^{K-1}
Z-900-7	۲۶۶/۳۳ ^{I-n}	۵/۵۱ ^{a-b}	۵/۵۱ ^g	۶/۰۶ ^{c-1}	۲۶۰/۷/۷ ^{j-j}	۲۶۰/۷/۷ ^{j-j}	۹۸/۵/۵ ^{K-k}	۹۸/۵/۵ ^{K-k}
Z-900-8	۴۰۰/۶۷ ^c	۶/۱۵ ^{a-c}	۶/۱۵ ^g	۵/۸ ^a	۴۱۶۶/۷ ^{cd}	۴۱۶۶/۷ ^{cd}	۱۶۳۳/۴ ^{C-D}	۱۶۳۳/۴ ^{C-D}
Z-900-9	۲۲۵/۰ ^{I-1}	۶/۴۳ ^{a-c}	۶/۴۳ ^g	۵/۸ ^a	۳۹۸۶/۱ ^{dc}	۳۹۸۶/۱ ^{dc}	۱۵۳۵/۷ ^{CD}	۱۵۳۵/۷ ^{CD}
Z-900-10	۳۷۷ ^{dc}	۶/۱۶ ^{a-c}	۶/۱۶ ^g	۵/۷ ^a	۳۷۸/۸/۳ ^{e-c}	۳۷۸/۸/۳ ^{e-c}	۱۴-۲/۵ ^{e-c}	۱۴-۲/۵ ^{e-c}
Talaye	۲۱۰/۳۳ ^{II}	۵/۵۱ ^{a-b}	۵/۵۱ ^g	۵/۸ ^a	۲۱۱/۱/۱ ^{ij}	۲۱۱/۱/۱ ^{ij}	۸۳ ⁺ ^{I-j}	۸۳ ⁺ ^{I-j}
T-800-1	۲۵۲/۶۷ ^{I-n}	۵/۱۳ ^{a-c}	۵/۱۳ ^g	۵/۸ ^a	۲۸۱/۹/۴ ^{g-i}	۲۸۱/۹/۴ ^{g-i}	۱۱۱۳/۴ ^{g-i}	۱۱۱۳/۴ ^{g-i}
T-800-6	۳۲۵/۶۷ ^{I-n}	۳۶۵۲/۸ ^{c-1}	۳۶۵۲/۸ ^{c-1}	۴/۷۱ ^a	۳۶۷۲/۸/۱ ^{c-1}	۳۶۷۲/۸/۱ ^{c-1}	۱۳۳۴/۲ ^{d-g}	۱۳۳۴/۲ ^{d-g}
T-800-6	۳۶۶/۶۷ ^{c-1}	۳۶۶/۶۷ ^{c-1}	۳۶۶/۶۷ ^g	۴/۷۵ ^a	۳۶۷۲/۸/۱ ^{c-1}	۳۶۷۲/۸/۱ ^{c-1}	۱۱۷/۶ ^{n-e}	۱۱۷/۶ ^{n-e}
T-900-4	۲۸۶/۶۷ ^{g-i}	۵/۶۳ ^{c-a}	۵/۶۳ ^g	۶/۶۷ ^{pa}	۳/۸۶ ^{ac}	۳/۸۶ ^{ac}	۸/۶ ^{q-k}	۸/۶ ^{q-k}
T-900-5	۲۰۰/۰ ^{..n}	۵/۴۳ ^{a-b}	۵/۴۳ ^g	۶/۰ ^{a-a}	۲/۴۹ ^{eu}	۲/۴۹ ^{eu}	۸/۶ ^{q-k}	۸/۶ ^{q-k}
T-1200-1	۲۹۱/۳ ^{gI}	۵/۴۶ ^{a-c}	۵/۴۶ ^g	۵/۶ ^{a-a}	۳/۵۶ ^{ed}	۳/۵۶ ^{ed}	۱۱۳۳/۲ ^{I-1}	۱۱۳۳/۲ ^{I-1}
Express	۲۹۱۳/۶۷ ^{c-e}	۳/۷۶ ^{a-c}	۳/۷۶ ^g	۶/۱ ^{a-a}	۲/۷۶ ^{dc}	۲/۷۶ ^{dc}	۱۰/۷۸/۱ ^{J-g}	۱۰/۷۸/۱ ^{J-g}
Exp-800-1	۳۰۲/۳۳ ^{geI}	۵/۵۳ ^{a-c}	۵/۵۳ ^g	۶/۰ ^{a-a}	۴/۴۶ ^{a-c}	۴/۴۶ ^{a-c}	۱۲۱۰/۷ ^{H-e}	۱۲۱۰/۷ ^{H-e}
Exp-800-3	۳۸۵ ^d	۶/۶۰ ^{a-c}	۶/۶۰ ^g	۶/۱ ^{a-a}	۴/۵۷ ^{ba}	۴/۵۷ ^{ba}	۱۳۷۷/۱/۷ ^{g-e}	۱۳۷۷/۱/۷ ^{g-e}
Exp-900-1	۴۸۵ ^D	۶/۶۵ ^{ab}	۶/۶۵ ^D	۶/۱ ^{a-a}	۴/۷۵ ^a	۴/۷۵ ^a	۱۸۳۸/۱ ^{ba}	۱۸۳۸/۱ ^{ba}
Exp-900-1	۱۶۲/۶۷ ^Y	۶/۶۵ ^{ab}	۶/۶۵ ^D	۶/۱ ^{a-a}	۴/۷۵ ^a	۴/۷۵ ^a	۶۲۸/۳ ^J	۶۲۸/۳ ^J
Okapi	۱۶۲/۶۷ ^Y	۶/۳ ^c	۶/۳ ^c	۵/۳ ^c	۲/۹۶ ^e	۲/۹۶ ^e	۱۶۵۹/۰ ^K	۱۶۵۹/۰ ^K
LSD 5%	۶۳/۹۶	۱/۰۹	۰/۴۸	۰/۴۸	۰/۳۴	۰/۳۴	۶۰۶/۵۶	۶۰۶/۵۶

میانگین‌های دارای حروف مشابه در ستون تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال ۵ درصد ندارند

عاملی بر صفاتی چون عملکرد دانه، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه و درصد روغن بود که این عامل، عامل عملکرد دانه نامیده شد و مولفه دوم و سوم به ترتیب بزرگترین ضرایب را برای صفات تعداد دانه در خورجین و تعداد گره در ساقه داشتند (۶). در بررسی که روی ۵۵ ژنتیک مختلف کلزا صورت گرفت. سه مولفه اول ۶۳ درصد از تنوع کل را توجیه کردند. در مولفه اول صفات وزن بذر در هر بوته و عملکرد روغن، در مولفه دوم تعداد شاخه فرعی در هر بوته و در مولفه سوم صفت طول خورجین بیشترین مقدار را داشتند (۱۲). تانگا و همکاران نیز نتایج مشابهی روی ارقام تجاری کلزا بدست آوردند (۲۸). در نمودار بای پلات کلیه لاین‌های جهش یافته در دو گروه قرار گرفتند. در گروه سمت راست لاین‌ها با عملکرد دانه و روغن بالا و زودرس و در گروه سمت چپ ژنتیک‌های دیررس با عملکرد دانه و روغن پایین به همراه رقم شاهد اکاپی قرار گرفتند (شکل ۱). نتایج حاصل از رگرسیون به روش گام به گام، عملکرد دانه به عنوان متغیر تابع و سایر صفات اندازگیری شده به عنوان متغیرهای مستقل در جدول ۵ نشان داده شده است که براساس آن صفات تعداد خورجین در شاخه فرعی، تعداد خورجین در بوته، طول خورجین و وزن هزار دانه در مدل رگرسیونی باقی ماندند (جدول ۵) و معادله (۱) به دست آمد که در آن X_1 تعداد خورجین در شاخه بوته، X_2 تعداد خورجین در شاخه فرعی، X_3 طول خورجین اصلی و X_4 وزن هزار دانه است. نتایج همچنین نشان داد که صفت تعداد خورجین در بوته با ضریب تبیین $R^2 = 0.93$ به تنهایی بخش عمده‌ای از تغییرات رگرسیونی را توجیه می‌کند. دیگر صفات گنجانده شده در مدل به ترتیب اهمیت، تعداد خورجین در شاخه فرعی، طول خورجین اصلی و وزن هزار دانه بودند (جدول ۵).

معادله (۱)

$$X_4 + ۲۶۴ / ۱X_3 + ۱۴ / ۸X_2 + ۳۳ / ۹X_1 = ۱۷۴۹ + ۳۸ / ۳Y$$

نتایج بدست آمده از رگرسیون گام به گام که بر روی ژنتیک صورت گرفت، به ترتیب صفات تعداد خورجین در بوته، تعداد شاخه فرعی و طول دوره گلدهی در مدل رگرسیونی باقی ماندند (۲۱).


در یک بررسی که بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا صورت گرفت، نتایج نشان داد که صفت تعداد غلاف در بوته دارای ضریب تبیین ۰/۴۱ بود که به تنهایی بخش عمده‌ای از تغییرات مدل رگرسیونی را توجیه نمود (۶).

نتایج نشان داد که پرتوتابی گاما مورد استفاده در اکثر صفات مورد مطالعه تنوع قابل ملاحظه‌ای را در جهش یافته‌ها ایجاد کرد. خصوصیات مورفولوژیک لاین‌های جهش یافته و شاهد رقم اوکاپی در جدول ۳ ارائه شده است. لاین‌هایی که از نظر چند صفت مورد بررسی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سایر لاین‌ها و شاهد داشتند، می‌توانند به عنوان لاین‌های برتر برای بررسی‌های آتی انتخاب شوند. با توجه به لاین‌های مطلوب بدست آمده از این رقم و نتایج حاصل از بررسی‌های صفات مربوط به اجزای عملکرد مشخص می‌شود که لاین-Z-6-800 با داشتن بیشترین عملکرد دانه و روغن به عنوان بهترین لاین جهش یافته انتخاب شد. در تجزیه به مولفه‌های اصلی که براساس ۱۴ صفت در ژنتیک‌های کلزا انجام شد، سه مولفه اول که مقادیر ویژه بزرگتر از یک داشتند، در مجموع ۷۹ درصد از تنوع موجود بین داده‌ها را توجیه کردند (جدول ۴). مولفه اول که عملکرد دانه نامیده شد به تنهایی ۵۵ درصد از کل تنوع را تبیین کرد. در این مولفه شاخص ارتفاع بوته، تعداد روز تا شروع گلدهی و رسیدگی کامل منفی و ۱۰ صفت دیگر در جهت مثبت درصد روغن، عملکرد بزرگترین ضرایب عاملی مثبت به ترتیب درصد روغن، عملکرد دانه، تعداد خورجین در بوته و در شاخه فرعی، تعداد دانه در خورجین اصلی و وزن هزار دانه تعلق داشت. بهطورکلی در گیاه کلزا افزایش عملکرد از طریق افزایش تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و تعداد دانه در خورجین صورت می‌گیرد که نشان دهنده رابطه مستقیم بین عملکرد دانه و اجزاء آن است. مولفه دوم (زمان گلدهی) ۱۳ درصد از کل واریانس داده‌ها را توجیه کرد. در این مولفه، بزرگترین ضرایب عاملی مثبت به ترتیب متعلق به صفات تعداد روز تا شروع گلدهی بود کامل، طول ساقه اصلی و تعداد روز تا شروع گلدهی بود (جدول ۴). در این مولفه، شاخص تعداد خورجین در شاخه اصلی، وزن هزار دانه و عملکرد روغن منفی بودند. مولفه سوم (عملکرد روغن) ۹ درصد از کل تنوع را توجیه نمود. در این مولفه اکثر صفات دارای ضرایب منفی بوده و تنها صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، طول ساقه اصلی، تعداد دانه در خورجین اصلی و عملکرد روغن مثبت بودند. بنابراین در بین صفات موثر بر عملکرد دانه، صفات تعداد خورجین در بوته و در شاخه فرعی و اصلی، تعداد دانه در خورجین اصلی، وزن هزار دانه، طول خورجین اصلی بیشترین همبستگی را با مولفه اول نشان دادند (جدول ۴). در یک بررسی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا، سه مولفه اصلی جماعت ۹۲/۲ درصد از تغییرات کل را توجیه کردند. در این بررسی مولفه اول ۴۹/۹ درصد تغییرات را توجیه کرد که دارای بزرگترین ضرایب

جدول ۴- نتایج تجزیه به مولفه‌های اصلی برای صفات مورد اندازه‌گیری در ژنتیک‌های کلزا

Table 4. The result of Component analysis for all traits in canola genotypes

صفت	مولده اول	مولده دوم	مولده سوم
ارتفاع بوته	-0/029	-0/052	-0/366
تعداد خورجین در شاخه اصلی	-0/315	-0/044	-0/247
تعداد خورجین در شاخه فرعی	-0/343	-0/020	-0/630
تعداد خورجین در بوته	-0/345	-0/015	-0/079
تعداد شاخه فرعی	-0/123	-0/257	-0/032
طول ساقه اصلی	-0/176	-0/441	-0/318
تعداد دانه در خورجین اصلی	-0/334	-0/022	-0/049
طول خورجین اصلی	-0/317	-0/001	-0/067
تعداد روز تا شروع گلدهی	-0/168	-0/357	-0/238
تعداد روز تا رسیدگی کامل	-0/105	-0/544	-0/403
وزن هزار دانه	-0/328	-0/006	-0/581
عملکرد روغن	-0/101	-0/053	-0/671
درصد روغن	-0/350	-0/026	-0/018
عملکرد دانه	-0/347	-0/039	-0/099
مقدار ویژه	7/88	1/87	1/37
درصد واریانس	-0/56	-0/13	-0/09
درصد تجمعی واریانس	-0/56	-0/69	-0/79



شکل ۱- نمودار بای پلات لین های جهش بانده و رقم اکاپی براساس مولفه اول و دوم
 Figure 1. Bio plot graph of mutant lines and Okapi cultivar basis of first and second components

درصد از تنوع بین ژنتیپ‌ها را توجیه کردند و به ترتیب عملکرد دانه، زمان گلدهی، عملکرد روغن نام‌گذاری شدند. برمنای نتایج رگرسیون گام به گام صفات تعداد خورجین در بوته و در شاخه فرعی، طول خورجین اصلی و وزن هزار دانه بیشترین تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند و می‌تواند به عنوان یک شاخص در اصلاح رقم باشد.

نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نشان داد که بین لاین های جهش یافته و رقم شاهد اختلاف معنی دار وجود داشته است. لاین جهش یافته Z-800-6 بیشترین عملکرد دانه و روغن را نسبت به شاهد اوکاپی داشت. بیشترین و کمترین تعداد روز تا رسیدگی کامل به ترتیب مربوط به لاین های جهش یافته T-800-6 و Exp-900-1 بود. تجزیه به مولفه های اصلی صفات، سه مولفه را مشخص کرد که بیش از



شکل ۲- لاین جهش یافته دیررس ۶- T-800
Figure 2. Late maturity mutant line T-800-6

منابع

1. Abd el-latifkhedr, E.K. 2012. Studies on the use of gamma irradiation and tissue culture in improving *Brassica napus*. M.Sc. thesis, Benha University, Egypt, 106 pp.
2. Abtahi, M. and A. Arzani. 2013. Molecular and morphological assessment of genetic variability induced by gamma radiation in canola. Journal of Plant Molecular Breeding, 1(2): 69-84.
3. Abtahi Foroushani, S.M., A. Arzani and M. Hossein Fotoukian. 2014. Evaluation of genetic diversity of mutations induced by gamma irradiation on morphological traits in the second generation mutant lines of rapeseed. Iranian Journal of Field Crops. Research, 12(2): 254-263 (In Persian).
4. Anonymous. 2012. Consensus document on the biology of the Brassica crops (*Brassica* spp.). Series on Harmonization of Regulatory Oversight in Biotechnology, OECD Environment, Health and Safety Publications, Paris, France, 54:1-142.
5. Auld, D.L., M.K. Heikkilä, D.A. Erickson, J.L. Sernyk and J.E. Romero. 1992. Rapeseed mutants with reduced levels of polyunsaturated fatty acids and increased levels of oleic acid. Crop Science, 32 (3): 657-662.
6. Baradaran, R., E. Majidi, F. Darvish and M. Azizi. 2006. Study of correlation relationships and Path coefficient analysis between yield and yield components in rapeseed (*Brassica napus* L.). Journal of agricultural sciences Islamic Azad University, 12(4):811-819 (In Persian).
7. Emrani, S.N., A. Arzani, G. Saeidi, M. Abtahi, M. Banifatemeh, M.B. Parsa and M.H. Fotokian. 2012. Evaluation of induced genetic variability in agronomic traits by gamma irradiation in canola (*Brassica napus* L.). Pakistan Journal of Botany, 44(4): 1281-1288.
8. FAO. 2014. FAOSTAT. Food and agricultural commodities production. Available at <http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx>. FAO.
9. Gerami, M., N. Babaeian Jelodar, R. Moemeni Larimi, A. Ghorbani and N. Bagheri. 2013. Induction of variation in agronomic traits of oilseed rape (*Brassica napus* L.) using gamma irradiation and investigation of induced mutation in loci of oleic acid by molecular markers. Journal of Plant Production, 20(1): 107-123 (In Persian).
10. Gupta, S.K. 2007. Advances in botanical research. Rapeseed breeding. In: M. Delseny and J.-C. Kader (Eds.)-Rapeseed Breeding-Elsevier, Academic Press, 45 pp.
11. Hedayati Marzoni, H. and H. Samiezdadeh Lahiji. 2016. Genetic Diversity Assessment of Lines and Varieties in Winter Rapeseed (*Brassica napus* L.) using RAPD and SSR Molecular Markers, Journal of Crop Breeding, 8(17):131-139 (In Persian).
12. Jankulovska, M., S. Ivanovska, A. Marjanovic-Jeromela, S. Bolaric, L. Jankuloski, Z. Dimov, D. Bosev and B. Kuzmanovska. 2014. Multivariate analysis of quantitative traits can effectively classify rapeseed germplasm. GENETIKA, 46(2) 545-559.
13. Khatri, A., I.A. Khan, M.A. Siddiqui, S. Raza and G.S. Nizamani. 2005. Evaluation of high yielding mutants of *Brassica juncea* cv. S-9 developed through gamma rays and EMS. Pakistan Journal of Botany, 37(2): 279-284.
14. Malek, M.A., H.A. Begum, M. Begum, M.A. Sattar, M.R. Ismail and M.Y. Rafi. 2012. Development of two high yielding mutant varieties of mustard [*Brassica juncea* (L.) Czern.] Through gamma rays irradiation. Australian Journal of crop science, 6(5): 922-927.
15. Manjaya, J.G. and R.S. Nandanwar. 2007. Genetic improvement of soybean variety JS 80- 21 through induced mutations. Plant Mutation Reports, 1(3): 36-40.
16. Mirabadi, A.Z. and M. Samadi Gorji. 2014. Effects of gamma irradiation on yield and yield components of rapeseed. Journal of Plant Production Research, 21(4): 193-204.
17. Mohammad Jani, A.M., H. Najafi Zarrini and S.R. Mousavi. 2014. Multivariate analysis of important morphological traits in some rapeseed (*Brassica napus* L.) Genotypes. International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 5(6): 9-14.
18. Mostafavirad, M., M. Azad Marzabadi and S. Faraji. 2013. Evaluation of agronomic traits and grain quality performance in some superior cultivars of winter oilseed rape. Journal of applied crop breeding, 1(1): 33-42 (In Persian).

- ۵۱
19. Muhammad Khan, W., S.Z. Shah, M. Saleem Khan, Z.U. Islam, S. Ali, F. Hussain, M. Irshad and M. Zahid. 2014. Effects of gamma radiations on some morphological and biochemical characteristics of *Brassica napus* L. (Variety Altex). International Journal of Biosciences, 4(10): 36-41.
 20. Rahimi, M.M. and A. Bahrani. 2011. Effect of gamma irradiation on qualitative and quantitative characteristics of canola (*Brassica napus* L.). Middle-East Journal of Scientific Research, 8(2): 519-525.
 21. Rameeh, V. 2014. Multivariate regression analyses of yield associated traits in rapeseed (*Brassica napus* L.) Genotypes. Advances in Agriculture, 2014: 1-6.
 22. Rosa, A.S., B. Blochtein, N.R. Ferreira and S. Witter. 2010. Apismellifera (*Hymenoptera: Apidae*) as a potential *Brassica napus* pollinator (cv. Hyola 432) (*Brassicaceae*). Brazilian Journal of Biology, 70 (4): 1075-1081.
 23. Samadi Gorji, M., N.B. Jelodar and N. Bagher. 2009. Assessment of gamma ray irradiation on germination and morphological characters in rapeseed (*Brassica napus* L.). Journal of Agriculture Science Nat, 16: 315-324 (In Persian).
 24. Samadi Gorji, M., A. Zaman Mirabadi, V. Rammeah, M. Hasanzpour and A. Esmailifar. 2015. Evaluation of agronomic traits of mutants induced by gamma irradiation in PF and RGS003 varieties of rapeseed (*Brassica napus* L.). Journal of Crop Breeding, 7: 135-144 (In Persian).
 25. Schnurbush, T., C. Mollers and H.C. Becker. 2000. A mutant of *Brassica napus* with increased palmitic acid content. Plant Breeding, 119: 141-144.
 26. Shah, S.A., I. Ali and K. Rahman. 1990. Induction and selection of superior genetic variables of oilseed rape (*Brassica napus* L.). The Nucleus, 26: 37-40.
 27. Siddiqui, M.A., I.A. Khan and A. Khatri. 2009. Induced quantitative variability by gamma rays and ethyl methane sulphonate alone and in combination in rapeseed (*Brassica napus* L.). Pakistan Journal of Botany, 41: 1189-1195.
 28. Thagana, W.M., C.M.N. dirangu, E.O. Omolo and T.C. Riungu. 2013. Variability in M2 generations and characteristics of advanced mutant lines of rapeseed (*Brassica napus* L.). Journal of Agricultural Science, 4: 83-86.
 29. Yadava, T.P., H. Singh, V.P. Gupta and R.K. Rana. 2010. Heterosis and combining ability in ray for yield and its components. Indian Journal of Genetics and Plant Breeding, 4(3): 684-695.

The Selection of Superior Genotypes with High Oil Yield Performance in Rapeseed Mutant Lines (*Brassica Napus L.*)

Mehrzed Ahmadi¹, Mansour Omidi², Bahram Alizaheh³ and
Ail Akbar Shah Nejat Boushahri⁴

1 and 4- PhD Student and Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran

2- Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran

(Corresponding Author: momidi@ut.ac.ir)

3- Associate Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj

Received: April 29, 2017

Accepted: September 10, 2017

Abstract

With the aim of comparing the grain yield and yield components of 16 oilseed rape (*Brassica napus L.*) mutant lines with cultivars Talayeh, Zarfam, Express and Okapi as check cultivar an experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications during 2015-2016 cropping season in experimental field of Seed and Plant Improvement Institute (SPII) in Karaj. Analysis of variance showed significant differences among the genotypes in length of vegetation period, seed and oil yield. The results showed that the mutant line Z-800-6 had the most grain and oil yield compared to Okapi. The maximum and minimum number of days to maturity was related to mutant lines T-800-6 (256 days) and Exp-900-1 (238 days), respectively. Principal component analysis indicated that three principal components explained more than 79 percent of the variation and were correlated with grain yield, flowering time and oil yield respectively. Stepwise regression analysis showed that number of pod per plant and per main stem, pod length on main stem and 1000-grain weight explained the most of the variation of yield suggesting that they can be used as indices for increasing grain and oil yield in oilseed rape breeding.

Keywords: Canola, Mutant line, Principal component analysis, Seed yield