



تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعی در گندم از طریق تجزیه خانواده‌های F₃ در شرایط نرمال و تنفس کمبود آب انتهایی فصل

علی‌اکبر اسدی^۱، مصطفی ولی‌زاده^۲، سید ابوالقاسم محمدی^۲ و منوچهر خدارحمی^۳

۱- استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران،
(نویسنده مسؤول: asadipm@gmail.com)

۲- استاد گروه بهنرآدی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

۳- استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
تاریخ دریافت: ۹۷/۷/۱۱ تاریخ پذیرش: ۹۸/۲/۲۱

صفحه: ۵۵ تا ۶۴

چکیده

شناسایی و انتخاب روش اصلاحی مناسب و استفاده از معیارهای گزینش صحیح و کاربردی جهت معرفی ارقام مقاوم به تنفس کمبود آب بسیار اهمیت دارد. جهت بررسی نحوه توارث صفات فیزیولوژیکی و زراعی در گندم F₁ لاین ۵۰ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط نرمال و تنفس کمبود آب انتهایی فصل در دو سال متوالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش مشخص کرد که در بین و درون خانواده‌های F₃ در تمامی صفات در دو محیط اختلاف معنی داری وجود دارد. بنابراین تنوع ژنتیکی زیادی برای این صفات وجود دارد. اثر ژن‌ها در دو محیط متفاوت رطوبتی تغییر قابل توجهی نداشت و جزء ژنتیکی تنوع در همه صفات در دو محیط بسیار بزرگ‌تر از بخش تنفس محیطی بود. در صفات وزن صدادنه، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله و قطر دانه در هر دو شرایط محیطی وراثت‌پذیری خصوصی میزان متوسطی را نشان می‌دهد که بیانگر نقش بیشتر واریانس افزایشی در کنترل این صفات است بنابراین می‌توان در بهبود این صفات گزینش را در نسل‌های اولیه اعمال نمود. عملکرد دانه تکبوته در هر دو شرایط محیطی وراثت‌پذیری عمومی بالا ولی وراثت‌پذیری خصوصی پایینی نشان داد که نشان می‌دهد وراثت این صفت ژنتیکی بوده ولی تحت کنترل اثرات افزایشی قرار نداشته و اثرات غالباً در کنترل آن نقش دارند و گزینش در نسل‌های انتهایی می‌تواند در بهبود آن موثر باشد.

واژه‌های کلیدی: امید ریاضی، بین و درون خانواده‌های F₃، تجزیه واریانس نسل‌ها، تنفس، وراثت‌پذیری

مقدمه

تجزیه میانگین و واریانس نسل‌ها ارزیابی تغییرات ژنتیکی بر مبنای بررسی یک نسل صورت می‌گیرد. موسوی و همکاران (۲۴) نشان دادند که در شرایط نرمال اثر غیرافزایشی ژن‌ها در کنترل صفات تعداد سنبله و قطر دانه در سنبله گندم نان، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در سنبله، عملکرد، وزن هزاردانه، تاریخ ۵۰٪ خوشده‌ی، مساحت برگ پرچم، تعداد روزنه در واحد سطح و شاخص برداشت دخالت دارد در حالی که در صفات طول پدانکل، طول سنبله و وزن خشک ریشه اثر افزایشی ژن‌ها نقش مهمی دارند. در شرایط تنفس خشکی، در صفات تعداد سنبله در سنبله، طول سنبله، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه، وزن هزاردانه، تعداد روزنه در واحد سطح و شاخص برداشت اثر غیرافزایشی دخالت عمدای داشت، درحالی که برای صفت طول پدانکل اثر افزایشی نقش عمدایی ایفا نمود. گل آبادی و همکاران (۱۲) نشان دادند که اگرچه هر دو نوع اثر افزایشی و غالباً در کنترل صفات مختلف در هر دو شرایط محیطی نرمال و تنفس خشکی داشتند اما توجه به اثرات مختلف و اجزای تنفس نشان می‌دهد که جزء غالباً مؤثرتر از جزء افزایشی است و صفات ارتفاع بوته، طول برگ پرچم و طول پدانکل دارای واریانس غالباً بیشتری نسبت به واریانس افزایشی بودند لذا استفاده از این صفات در برنامه‌های گزینشی در گندم مفید نخواهد بود همچنین مشخص شد که کنترل ژنتیکی صفات در هر دو شرایط محیطی مشابه

پس از شناسایی صفات مهم و انتخاب آن‌ها به عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر مقاومت به خشکی، اطلاع از تنوع آن‌ها در جمعیت، نحوه عمل ژن‌ها و تعیین وراثت‌پذیری این صفات مهم ترین کاری است که توسط بهترآگر باید صورت پذیرد (۳۴). گزینش غیرمستقیم در نسل‌های اولیه اصلاحی از طریق صفاتی که همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه داشته و وراثت‌پذیری به مراتب بیشتر از عملکرد دانه داشته باشند، یکی از راهکارهای مهم اصلاحی است. بررسی نحوه توارث صفات در شرایط محیطی متفاوت بیانگر این است که با تغییر شرایط محیطی، نحوه عمل ژن‌ها، برآورد پارامترهای ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات تغییر می‌کند (۸)، که به دلیل وجود اثر متقابل بین ژنتیک و محیط در شرایط تنفس است. به نظر می‌رسد بررسی نحوه توارث صفات و اتخاذ راهکار اصلاحی مناسب برای هر شرایط محیطی ضروری باشد (۳۱).

هالوئر و میراندا (۱۳) مرور جامعی را از روش‌های ارزیابی اجزای واریانس ژنتیکی ارائه داده‌اند. در این روش‌ها بر اساس شباهت بین والدین و نتاج و سایر خویشاوندان امکان شناسایی اجزاء واریانس ژنتیکی به وجود می‌آید. از جمله این روش‌ها می‌توان به روش تجزیه دی‌آل، رگرسیون والد-نتاج، طرح‌های تلاقی سه‌جانبه I، II، III، تلاقی لاین×تستر و تجزیه میانگین و واریانس نسل‌ها اشاره نمود. در اغلب روش‌های یادشده بجز

برآورد واریانس ژنتیکی و بالا بودن اثر متقابل ژنتیپ در محیط را علت این امر دانسته‌اند. بارنلارد و همکاران (۲) در بررسی ژنتیکی صفات کیفی گندم نان وارثت‌پذیری صفات کیفی گندم را بیچیده و به صورت پلی‌ژنیک گزارش کردند. آن‌ها همچنین وراثت‌پذیری خصوصی بالایی برای صفات وزن هزاردانه، رنگ دانه و وزن هکتولیتر مشاهده کردند. هدف از این تحقیق تعیین پارامترهای ژنتیکی اصلاحی (میزان اثرات غالیت و افزایشی)، همچنین میزان وراثت‌پذیری عمومی و خصوصی در دو شرایط محیطی نرمال و تنش کمبود آب انتهای فصل می‌باشد.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق از دو ژنتیپ گندم والدی Gasspard، رقم پاییزه پرمحصول ولی حساس به خشکی و لاین بهاره DN₁₁، با عملکرد بالاتر نسبت به Gasspard ولی متحمل به خشکی جهت انجام تلاقی استفاده شد و نسل‌های F₁, F₂, F₃, BC₁ و BC₂ در گلخانه پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای کرج و مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و نهال بذر کرج تولید شدند. ارزیابی در مزرعه پژوهشی پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای کرج درجه و ۴۹ دقیقه شمال و ۵۰ درجه و ۴۴ دقیقه شرق با ارتفاع ۱۲۷۵ متر از سطح دریا در دو سال زراعی ۹۳-۹۴ انجام گرفت. سه نسل بدون تفرق (والدین و F₁) و خانواده‌های F₃ مورد استفاده در دو آزمایش مجزا در قالب طرح بلوك‌های کاملاً تصادفی در سه تکرار در پاییز کشت شدند. نسل‌های کشت شده در بهار تحت دو شرایط آبیاری نرمال و تنش کمبود آب آخر فصل مقایسه شدند. آخرين آبیاري در شرایط کمبود آب درست قبیل از مرحله شروع گرده‌افشانی انجام شد؛ اما برای شرایط با آبیاري نرمال دو نوبت آبیاري بیشتر در مراحل دانه‌بندی و پرشدن دانه انجام گرفت. در این آزمایش هر کدام از والدین در چهار خط، F₁ها در سه خط و نسل F₃ به صورت ۱۵۰ خط در کنار هم کشت شدند (۱۵۰). در هر خط به طول ۱۵۰ سانتی‌متر بذور با فاصله ۱۰ سانتی‌متر روی خط کشت شدند. برای صفات فیزیولوژیک، مورفو‌لولوژیک و زراعی از ۵۰ خط استفاده شد. برای اندازه‌گیری صفات مختلف در هر تکرار، از هر کدام از نسل‌های بدون تفرق هر کدام ۱۰ بوته و از هر کدام از خانواده‌های F₃ تا ۵ بوته (در مجموع ۲۰۰ الی ۲۵۰ بوته) به تصادف انتخاب شد. میانگین بارندگی در سال زراعی ۹۲-۹۳ و ۹۳-۹۴ به ترتیب ۱۷۴/۸ و ۱۶۲/۷ میلی‌متر بود. جهت دقت در کار همه بوتهای انتخابی پس از رسیدگی کامل برداشت شده و بعد از انتقال به بیرون از مزرعه صفات مختلف زراعی اندازه‌گیری شدند. صفات مورد اندازه‌گیری عبارت بودند از: مساحت برگ پرچم، محتوای نسبی آب، شاخص کلروفیل، تعداد کل پنجه، ارتفاع بوته (از سطح زمین تا انتهای سنبله)، تعداد سنبله‌چه در سنبله اصلی، طول سنبله، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله اصلی، عملکرد دانه تک بوته، وزن صدادنه، عملکرد بیولوژیک، قطر دانه، وزن حجمی و شاخص برداشت.

بوده و محیط اثرات ژنی را در صفات مورد مطالعه تعییر نداده است. داندا و ستي (۸) در تجزیه ژنتیکی صفات مختلف گندم نان در دو شرایط محیطی نرمال و تنش خشکی مشخص کردند که هر دو نوع اثر ژنی افزایشی و غالیت نقش مهمی را در کنترل وراثت صفات در هر دو شرایط محیطی دارند اما برای صفات مختلف میزان اهمیت این اثرات در محیط‌های مختلف متفاوت است به طوری که این صفات در محیط نرمال به طور عمده توسط اثرات افزایشی و غالیت نسبی ژن‌ها کنترل می‌شوند ولی در محیط سهم اثرات محیطی و اثر متقابل ژنتیپ در میزان اثرات غیرافزایشی ژن‌ها بیشتر بوده و عمل ژن بیشتر از نوع فوق غالیت است.

صادقی (۳۰) در مطالعه بر روی صفات عملکردی گندم نشان داد که مدل افزایشی- غالیت برای بیشتر صفات به غیر از وزن دانه و وزن ۱۰ سنبله گندم و عملکرد دانه کفایت نمود. نتایج بدست آمده از تجزیه هیمن نشان داد که اثرات افزایشی و غیرافزایشی در کنترل صفات نقش دارند. بیشترین و کمترین میزان وراثت‌پذیری خصوصی به صفات وزن هزاردانه و وزن هکتولیتر به ترتیب ۵۷ درصد و ۱۳ درصد تعلق گرفت. با توجه وجود اثر افزایشی در مواد تحت بررسی و اثر تجمیعی در انتقال ژنها به نسل بعد، می‌توان از طریق گرینش در نسل‌های اولیه در افزایش صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه در برنامه اصلاح گندم نان استفاده نمود.

بهوتا و میشرا (۳) در گندم دامنه وراثت‌پذیری عمومی را برای صفات مورفو‌لولوژیک و زراعی مورد مطالعه از ۵۰ تا ۹۱ درصد گزارش کردند. شارما و همکاران (۳۲) در بررسی کنترل ژنتیکی عملکرد دانه در تلاقی‌های مختلف گندم نان وراثت‌پذیری خصوصی بالا و سهم بیشتر اثر افزایشی را برای صفات زراعی در شرایط تنش گزارش نمودند. کاماک (۴) با بررسی وراثت‌پذیری اجزاء عملکرد، بهخصوص وزن دانه، مقدار نسبتاً متوسطی را برای وراثت‌پذیری خصوصی آن گزارش کرده است. در مقابل مو و کرونستاد (۲۶) وراثت‌پذیری خصوصی بالایی را برای این صفت برآورد نمودند. یائو و همکاران (۳۸) برای طول سنبله اصلی، تعداد سنبله بارور، تعداد سنبله نایارور، تعداد دانه در سنبله اصلی و وزن هزاردانه وراثت‌پذیری نسبتاً بالا و برای وزن دانه در سنبله وراثت‌پذیری پایین را گزارش کردند. کولاکو (۶) در مطالعه عملکرد، اجزای آن و برخی از صفات مورفو‌فیزیولوژیکی ارقام گندم نان در شرایط تنش و بدون تنش خشکی وجود فوق غالیت و سهم بیشتر اثر غیرافزایشی را در توارث عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت مورد تأکید قرار دادند. خیرالله و همکاران (۱۵) نشان دادند که در شرایط نرمال، وراثت‌پذیری عملکرد دانه قابل توجه است و اثر افزایشی و غیرافزایشی ژن‌ها در کنترل آن سهیم می‌باشد ولی در مقابل اهدایی و بیز (۱۰) با تعیین وراثت‌پذیری خصوصی عملکرد دانه گندم در دو شرایط تنش خشکی و آبیاری کامل، گزارش کردنده که این صفت از وراثت‌پذیری پایینی برخوردار می‌باشد. این محققان، پایین بودن

پس از جمع آوری داده‌های مربوط به صفات مختلف و تست نرمال بودن داده‌ها، اجزاء واریانس ژنتیکی (افزايشي و غالبيت) و واريانس اثرات محيطی بر اساس روش کرسی و یونی (۱۶) با استفاده از تجزيه واريانس و اميد رياضي خانواده‌های F_3 انجام شد. جدول ۱ تجزيه واريانس، اميد رياضي و روش‌های محاسبه اين اجزا را نشان می‌دهد.

نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزيه واريانس والدين، نسل F_1 و خانواده‌های F_3 صفات مورد بررسی تحت دو شرایط نرمال و تنش کمبود آب انتهای فصل در جدول‌های ۲ و ۳ نشان داده شده است. وجود تفاوت معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها برای تمامی صفات در هر دو محیط نشان‌دهنده وجود تبعیقی در بین نسل‌های موجود می‌باشد. بنابراین، گزینش را می‌توان بر مبنای این صفات انجام داد؛ همچنین، اختلاف معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها را می‌توان به اختلاف بین نسل‌های والد، DN_{11} ، والد $Gaspard$ ، نسل F_1 و نسل F_3 و همچنین بین خانواده‌های F_3 نسبت داد.

۲۰ روز پس از گردهافشاني سطح برگ پرچم بهروش پیشنهادی مولر (۲۵) از طريق رابطه زير محاسبه شد:

$$\text{مساحت برگ پرچم} = \text{طول برگ پرچم} \times \text{عرض برگ پرچم} \times 0.74$$

صفت شاخص کلروفيل برگ (میزان محتواي کلروفيل) که برآورد غیرتخربي از مقدار نسبی کلروفيل كل برگ می‌باشد، در برگ پرچم پنجه اصلی به کمک دستگاه کلروفيل‌سنج همراه اندازه‌گيري شد. محتواي نسبی آب برگ پرچم ۱۵ روز پس از گردهافشاني به روش ترنر (۳۵) (FW) برگ پرچم تعیین شود، سپس برگ‌ها در آب مقطر و در دماي ۴ درجه سانتي‌گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شدند و وزن برگ پس از توريزسانس (TW) نيز اندازه گرفته شد. در ادامه، برگ‌ها در آون با دماي ۷۲ درجه سانتي‌گراد به مدت ۲۴ ساعت خشک شده و وزن خشک (DW) آن‌ها توزين شد. RWC با رابطه زير محاسبه شد:

$$RWC = \left(\frac{FW-DW}{TW-DW} \right) \times 100$$

جدول ۱- تجزيه واريانس و اميد رياضي والدين، F_1 و خانواده‌های F_3 های آزمون شده در چند سال و فرمول‌های محاسبه واريانس افزايشي و غالبيت

Table 1. Analysis of variance and expected values of F_1 and F_3 families tested in few years and formulas for additive and dominant variance calculation

منابع تغيير	ميانگين مربعات	ميانگين مربعات مربوط	ميانگين مربعات مربوط
سال		M_6	
بلوك در سال		M_5	
نسل		M_4	
بين نسل‌ها			M_3
بين خانواده‌های F_3			M_{31}
نسل×سال			M_{32}
P_1, P_2, P_3 و F_1, F_2, F_3			M_2
خانواده‌های F_3 × سال			M_1
خطاي آزمایشي			
خطاي نمونه‌برداري			
درون خانواده‌های F_3			
درون P_1, P_2, P_3 و F_1, F_2, F_3			
واريانس درون خانواده‌های F_3	$\delta_{WF3}^2 = M_{11} - M_{12} = \frac{1}{4}A + \frac{1}{8}D$	M_{41}	
واريانس بين خانواده‌های F_3	$\delta_{BF3}^2 = \frac{M_{42} - M_{32}}{rs} = \frac{1}{2}A + \frac{1}{16}D$	M_{42}	
واريانس افزايشي	$A = \frac{4}{3} \left(\left(\frac{2(M_{42} - M_{32})}{rs} \right) - (M_{11} - M_{12}) \right)$		$D = \frac{16}{3} \left(2(M_{11} - M_{12}) - \left(\frac{(M_{42} - M_{32})}{rs} \right) \right)$
واريانس غالبيت	$V_A = \frac{1}{2}A$		
	$V_D = \frac{1}{4}D$		

جدول ۲- میانگین مربعات صفات مختلف در نسل های والدی، F_1 و خانواده های F_3 تحت شرایط نرمالTable 2. Mean squares of different traits in parenting generations, F_1 and F_3 families in normal condition

TT	GD (mm)	VW (cm ³)	HI	TB (g)	NGS	GY (g)	NSS	SI (cm)	SN	PH (cm)	100GW (g)	CI	RWC	FLA (cm ³)	Df	منابع تغییر
-	-	-	1/0.99**	259767/1**	318/4	292/3	91/2**	2/94	100/3	256/3	1/186	111/8	-/175	2228**	1	سال
14/53**	-/15	-/1377	-/329	2275/6	1038/5	1029/4	87/4	4/89	29/99	176/4	2/007	922/7	-/751	8/58	2	بلوک در سال
3/959**	-/301**	-/221**	-/0253**	2105/8**	1371/8**	646/4**	52/64**	13/8**	132/6**	2142/1**	2/146**	233/1**	-/019**	200/5**	52	نسل
11/42**	-/199 ^{ns}	1/0.87**	-/116**	782/8	243/4	890/3	84/5**	45/2**	102/8	5563**	1/124	789/9**	-/029**	368/6**	3	بین نسل ها
3/48*	-/307**	-/1816**	-/021*	2231/8**	1446/9**	631*	50/72**	10/2**	134/2*	191/9**	2/209**	198/7**	-/019**	189/4**	49	بین خانواده های F_3
-	-	-	-/0414**	2-77/3*	259/9	461	11/55	2/6	111/9	342/7	-/343**	188/2**	-/0137	95/7	52	نسل \times سال
-	-	-	-/379**	4336/8**	785/1**	772/4	4/22	4/09**	64/16	320/9	-/805**	436/5**	-/0145	72/54	3	$P_1 \times F_1$ و $P_2 \times F_1$
-	-	-	-/0185	1971*	227/1	419/3	12/27	117/1	350/5	-/417	100/5	-/0137	97/5	49	خانواده های $F_3 \times$ سال	
2/401	-/126	-/0158	-/0138	1292/9	361/4	401/4	11/18	2/11	87/4	474/9	-/488	90/6	-/0139	82/03	208	خطای آزمایشی
1/012	-/071	-/0784	-/0028	866/9	188/3	244/9	2/23	1/12	49/2	66/2	-/2188	55/03	-/0021	33/8	خطای نمونه برداری	
1/119**	-/074**	-/1**	-/003**	971/4**	231/1**	271/2**	3/61**	1/26**	55/08**	72/47**	-/225*	61/01**	-/0021*	42/8**	F_3	درون خانواده های F_3
-/049	-/055	-/022	-/00174	361/5	71/18	110/9	1/299	-/399	19/6	30/55	-/141	23/2	-/00195	24/7	$F_1 \times P_2, P_1$	درون $P_1 \times F_1$
24/6	7/66	5/59	11/7	39/16	18/3	32/9	8/14	9/62	32/31	9/7	12/11	20/8	5/48	22/9	ضریب تغییرات CV%	

** و *: معنی دار در سطح ۱ و ۵ درصد به ترتیب.
 FLA: مساحت برگ پرچم، RWC: محتوای نسبی آب، CI: ارتفاع بوته، GW: وزن صدaine، PH: ارتفاع سنبله، SL: طول سنبله، NSS: تعداد سنبله، GY: عملکرد بیولوژیکی، HI: شاخص برداشت، VW: وزن جرمی، GD: قطر دانه، TT: تعداد کل پنجه

جدول ۳- میانگین مربعات صفات مختلف در نسل های والدی F_1 و خانواده های F_3 تحت شرایط تنفس کمبود آبTable 3. Mean squares of different traits in parenting generations, F_1 and F_3 families in water deficit condition

GD (mm)	VW (cm ³)	HI	TB (g)	NGS	GY (g)	NSS	SI (cm)	SN	PH (cm)	100GW (g)	CI	RWC	FLA (cm ³)	Df	منابع تغییر
-	-	13/717**	72-711/6**	13718/8**	633/1/2**	416/1**	32/15**	1119/8	1-6-2/1	1/03	72663	4/25**	22557**	1	سال
-/494	-/0389	-/074	11139	57/9	84	23/6	1/26	23/9	195/2/5	-/69	788/7	-/194	25/78	2	بلوک در سال
-/49**	-/193**	-/0142**	23131/8**	1478/9**	813/7**	53/9**	14/05**	20/8/9**	2519**	2/46**	2850/6**	-/021**	1619**	52	نسل
-/63**	-/1645**	-/049**	11967/9	631/1	5899/4**	12/2	41/4**	780/1**	6-30/3**	4/114**	319/5**	-/115**	134/5**	3	بین نسل ها
-/49**	-/2117*	-/012*	2537/6**	1562/5**	499/9**	54/1**	12/3**	171/1**	2286/5**	2/217**	282**	-/015**	163/5**	49	بین خانواده های F_3
-	-	-/0086	192/7	563/2	286/6	17/47*	2/1**	70/25	298/04	-/429	132/7**	-/0146	90/31	52	نسل \times سال
-	-	-/0716**	7531/5	1131/1**	337/5	11/34	4/13**	77/1	44/8	-/64**	316/42**	-/096**	18/13	3	$P_1 \times F_1$ و $P_2 \times F_1$
-	-	-/0048	1589/1	528/8	283/2	17/02*	2/9*	69/9	312/25	-/419	74/8**	-/0116	94/7	49	خانواده های $F_3 \times$ سال
-/156	-/075	-/0075	1599/8	415/78	302/9	10/42	1/74	95/68	419/51	-/379	147/8	-/0122	71/88	208	خطای آزمایشی
-/179	-/039	-/00281	616/8	185/1	157/7	3/45	0/94	38/65	67/8	-/184	5195	-/0022	33/17	3	خطای نمونه برداری
-/18**	-/0411**	-/0029**	6841/2**	191/6**	1659/9**	2/44**	0/99**	47/1**	73/21**	-/198**	57/18**	-/0023**	26/14**	F_3	درون خانواده های F_3
-/053	-/0234	-/0022	24/9	145	107/3	1/42	0/6	17/58	35/8	-/1078	23/2	-/0016	16/64	$F_1 \times P_2, P_1$	درون $P_1 \times F_1$
8/4	31/94	10/7	34/8	17/97	29/8	8/28	8/93	33/6	10/05	12/4	22/2	6/45	24/02	ضریب تغییرات CV%	

** و *: معنی دار در سطح ۱ و ۵ درصد به ترتیب.
 FLA: مساحت برگ پرچم، RWC: محتوای نسبی آب، CI: ارتفاع بوته، GW: وزن صدaine، PH: ارتفاع سنبله، SL: طول سنبله، NSS: تعداد سنبله، GY: عملکرد بیولوژیکی، HI: شاخص برداشت، VW: وزن جرمی، GD: قطر دانه

نتایج مربوط به برآورد اجزای واریانس و وراثت‌پذیری خصوصی و عمومی صفات مورد بررسی در دو محیط نیز در جدول‌های ۴ و ۵ نشان داده شده است. در برخی از صفات در برآورد واریانس افزایشی، مقدار عددی منفی دیده شد. میلر و پیکت (۲۵) و روی (۲۹) دلیل این موضوع را اشتباه نمونه‌برداری، عدم وجود تنوع ژنتیکی کافی، استفاده از مدل آماری نادرست و یا کم بودن تعداد داده‌ها بیان نموده‌اند. در آزمایش حاضر به نظر می‌رسد که کم بودن تعداد داده‌ها (۵۰ خانواده F₃) و عدم وجود تنوع ژنتیکی کافی دلیل برآورد اعداد منفی برای واریانس افزایشی باشد. به‌حال، در جمعیت مورد ارزیابی در مورد این صفات واریانس افزایشی وجود نداشت و واریانس غالبیت، کل واریانس ژنتیکی را به خود اختصاص داد. پورداد و ساچان (۲۷) و هنرنژاد (۱۴) نیز در آزمایش‌های مربوط به برآورد پارامترهای ژنتیکی، مقادیر واریانس منفی را در نتایج خود به‌دست آوردند. در مطالعه گل‌آبادی و همکاران (۱۲) نیز وجود واریانس منفی برای اثرات افزایشی در خانواده‌های F₃ گندم تحت دو شرایط آبی و دیم گزارش شده است.

برای صفاتی مانند صفات تعداد دانه در سنبله و عملکرد بیولوژیک در هر دو شرایط محیطی و وزن صددانه، تعداد سنبله، عملکرد تک بوته و قطر دانه در شرایط نرمال اختلافات در بین نسل‌ها معنی‌دار نبود. در بین خانواده‌های F₃ در تمامی صفات در دو محیط اختلاف معنی‌داری مشاهده شد؛ به عبارت دیگر بین خانواده‌های F₃ مورد ارزیابی در این تحقیق، تنوع ژنتیکی بالایی از لحاظ این صفات وجود دارد و بنابراین می‌توان گزینش بر مبنای این صفات را مؤثر دانست.

از طرف دیگر، در تمامی صفات در دو محیط اختلاف معنی‌داری درون خانواده‌های F₃ مشاهده شد، بنابراین، می‌توان اظهار داشت که گزینش در درون خانواده‌های F₃ نیز نتیجه‌بخش خواهد بود. با توجه به معنی‌دار بودن هر دو واریانس بین و درون خانواده‌ها مشخص می‌شود که تنوع ژنتیکی زیادی برای این صفات وجود دارد. با توجه به طبیعت خودگشتن گندم، با پیشرفت نسل‌ها از تنوع درون نسل‌ها کاسته شده و تنوع بین نسل‌ها، افزایش می‌یابد. به‌همین دلیل برای استفاده از واریانس ژنتیکی نیاز است که خودگشتنی ادامه یابد تا در نسل‌های بالاتر واریانس درون کاهش و واریانس بین خانواده‌ها افزایش یابد.

جدول ۴- واریانس های مختلف و وراست پذیری های اندازه گیری شده از نسل ها و خانواده های مورد ارزیابی در شرایط نرم افزار

Table 4. Different variances and heritability measured from generations and families under normal conditions

TT	GD (mm)	VW (cm ³)	HI	TB (g)	NGS	GY (g)	NSS	SI (cm)	SN	PH (cm)	100GW (g)	CI	RWC	FLA (cm ²)	
۰/۳۵۹	۰/۰۶	۰/۰۲۵	۰/۰۰۴	۴۷/۳	۲۰/۳/۳	۳۵/۲۸	۶/۴۱	۱/۳۸	۲/۸۵	۲۶۰/۰۷	۰/۲۹۹	۱۶/۵۸	۰/۰۰۸	۱۵/۳۱	
۰/۷۱	۰/۰۱۹	۰/۰۷۸	۰/۰۰۱۲	۶۰/۹/۹	۱۵۹/۹	۱۶۰/۴	۲/۳۳	۰/۸۶	۳۵/۴۸	۴۱/۹۲	۰/۰۹۴	۴۰/۲۱	۰/۰۰۱۵	۱۸/۱	
۰/۰۰۶	۰/۰۶۸	-۰/۰۱۸	۰/۰۰۰۲۸	-۲۹۱/۱	۱۶۴/۵	-۵۹/۸۸	۶/۹۹	۱/۲۶	-۱۹/۸۵	۳۱۸/۸	۰/۳۳	-۳/۳۸	۰/۰۰۱	۸/۳۵	
۳/۴۴	-۱/۱۸۷	-۰/۲۸۸	-۰/۰۱۲۶	۲۶۱۸/۳	۷۴۸	۵۶۷/۹	۱۷/۴۸	۴/۵۶	۱۲۴/۴	۵۳۶/۴	۰/۷۴	۱۴۴/۹۸	۰/۰۰۴	۹/۰/۳۵	
۰/۸	-۰/۰۴۲	-۰/۰۳۵	-۰/۰۰۲۳	۲۱۵/۴۸	۶۰/۲	۶۶/۹	۱/۸۶	-۰/۳۵	۱۴/۵۶	۱۵۸/۳	-۰/۰۸۱	۱۵/۱	-۰/۰۰۲۳	۱۴/۰۰۵	
۳/۴۴۶	-۰/۲۵۵	-۰/۲۸۸	-۰/۰۰۲۲۵	۲۶۱۸/۳	۹۱۲/۴	۵۶۷/۹	۲۴/۴۷	۵/۱۲	۱۲۴/۴	۸۵۵/۲	۱/۰۷	۱۴۴/۹۸	۰/۰۰۵۱	۹/۸/۷	
۰/۲۴۶	-۰/۱۹۷	-۰/۲۲۳	-۰/۰۲۴۸	۲۸۲۳/۸	۹۷۲/۶	۶۳۴/۸	۲۶/۲۳	۶/۱۷	۱۲۸/۹۶	۱۰۱۳/۵	۱/۱۵۱	۱۶۰/۰۸	-۰/۰۰۷۴	۱۱۲/۷	
۸۱	۸۵/۸	۸۹/۱	۹۰/۱	۹۲/۴	۹۳/۸	۸۹/۴۶	۹۲/۹	۹۴	۸۹	۸۴	۹۳	۹۰	۶۹	۸۷/۶	وارث پذیری عمومی
۱۰	۲۲/۹	-	۱/۱	-	۱۶/۹	-	۲۶/۵۸	۲۰	-	۳۱	۲۸/۷	-	۱۴	۷/۴	وارث پذیری خصوصی

برداشت: VW؛ وزن حجمی، GD؛ قطر دانه، TT؛ تعداد کل پنجه

جدول ۵- واریانس های مختلف و وراحت بذیری های اندازه گیری شده از نسل ها و خانواده های مورد ارزیابی در شرایط تنش کمود آب

Table 5. Different variances and heritability measured from generations and families under water deficit conditions

GD (mm)	VW (cm ³)	HI	TB (g)	NGS	GY (g)	NSS	SL (cm)	SN	PH (cm)	100GW (g)	CI	RWC	FLA (cm ²)
-111	-0.47	-0.012	158/0.8	172/27	36/12	7/85	1/189	16/87	328/89	-0.316	34/53	-0.023	11/47
-0.29	-0.177	-0.007	443/3	46/6	58/6	2/0.2	1/16	24/52	37/41	-0.902	33/57	-0.007	19/5
-129	-0.51	-0.011	126/0.2	198/6	9/0.9	9/11	1/83	6/14	413/6	-0.36	22/93	-0.008	2/28
-295	-0.143	-0.0045	230.9/9	471/5	267/35	19/63	3/78	10.3/4	60.7/9	-0.75	155/12	-0.0094	88/3
-0.52	-0.25	-0.00125	256/6	69/3	50/35	1/74	0/29	15/95	59/92	-0.63	24/63	-0.002	11/98
-424	-0.194	-0.0056	2435/9	670/1	276/44	28/74	5/61	10.9/55	10.21/46	1/11	178/0.5	-0.0102	90/58
-476	-0.219	-0.0068	270.2/6	732/4	326/79	30/48	5/9	125/5	10.91/38	1/173	20.2/68	-0.0122	10.2/56
89/1	88/5	81/7	9.0/1	91/5	84/6	94	95	87/3	93	94	87/8	83	88
27	23/3	16	4/7	27/1	2/8	30/48	31	4/2	38	30/7	11/3	3/4	2/0.2
													رائت پذیری عمومی
													رائت پذیری خصوصی

RW: مساحت برگ پرچ، W: وزن صد دانه، PH: ارتفاع بوته، NS: تعداد سنبله، SL: طول سنبله، NSS: تعداد سنبله در سنبله، GY: عملکرد دانه تک بوته-NGS: تعداد دانه در سنبله، TB: میکملکرد بیولوژیکی، CI: شاخص کلروفیل، GW: 100 جم، GD: قطر دانه، VV: وزن حجم، HI: شاخص برداشت.

نسل‌های اولیه اعمال نمود. اهمیت اثرات افزایشی در توارث ارتفاع بوته توسط شیخ و همکاران (۳۳)، لونک (۲۱) و ادواردز و همکاران (۹)، در توارث برگ پرچم توسط وندا و هوشمند (۳۷) در توارث وزن صدادنه توسط لونک (۲۱)، لی و کالستیک (۲۰)، توکلو و یاگباسانلار (۳۶)، مالیک و همکاران (۲۲)، چودری و همکاران (۵) و ادواردز و همکاران (۹)، در توارث تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در سنبله توسط لونک (۲۱) و لی و کالستیک (۲۰)، در توارث طول سنبله توسط لونک (۲۱)، خان و همکاران (۱۸) و مالیک و همکاران (۲۲) و در توارث قطر دانه توسط توکلو و یاگباسانلار (۳۵) نیز گزارش شده است. در مورد عملکرد دانه تکبوته در هر دو شرایط محیطی، وراثت‌پذیری عمومی بالا ولی وراثت‌پذیری خصوصی پایین بود که نشان می‌دهد وراثت این صفت ژنتیکی بوده ولی تحت کنترل اثرات افزایشی قرار نداشته و اثرات غالبیت در کنترل این صفت نقش دارند. این مورد توسط لونک (۲۱)، پراکاش و همکاران (۲۸)، کولاریا و شارما (۱۹)، سانگ وان و چودری (۳۱)، بیکر (۱) و عشقی و آخوندووا (۱۱) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در باقی صفات نیز مثل عملکرد دانه تک بوته اثر افزایشی نقش چندانی را در کنترل ژنتیکی این صفات نشان نمی‌دهد بنابراین، جهت اصلاح این صفات، نمی‌توان گرینش را از نسل‌های اولیه آغاز نمود و بهتر است که گرینش در نسل‌های انتهایی صورت گیرد. این موضوع با معنی دارشدن واریانس درون خانواده‌های F_3 نیز توجیه می‌شود که نشان می‌دهد درون خانواده‌ها تنوع ژنتیکی وجود دارد.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از پژوهشگران ارجمند آقایان بهنام ناصریان و علی براتی که در اجرای آزمایش‌ها رهنمودهای ارزنده‌ای ارائه نمودند قدردانی می‌گردد.

نکته قابل توجه در بررسی اجزاء تنوع این بود که جزء ارثی تنوع (واریانس افزایشی و غالبیت) در همه صفات در دو محیط بسیار بزرگ‌تر از بخش تنوع محیطی بود و از آنجایی که واریانس محیطی منبع خطایی است که از دقت مطالعات ژنتیکی می‌کاهد می‌توان به صحت نتایج به دست آمده از نظر تاثیر کم محیط بر آن اطمینان بیشتری داشت.

نکته دیگر این که اثر ژن‌ها در دو محیط متفاوت رطوبتی تغییر قابل توجهی نداشت که دلیل آن را می‌توان به زمان اعمال تنش در شروع رشد زایشی و تاثیر کمتر آن بر مراحل رشد رویشی ربط داد زیرا عمدۀ تغییرات صفات مورد مطالعه در مراحل رویشی رخ می‌دهد. اصولاً برآورده اثرات مختلف ژنی با صادق‌بودن فرضیاتی از قبیل تفرق دیپلوبیدی، هموزیگوت بودن والدین، عدم وجود آل‌های چندگانه، عدم وجود پیوستگی ژنی و عدم وجود اثر متقابل محیط و ژنوتیپ قابل دستیابی است. دو فرض اول در جمیعت‌های گندم صادق است اما در مورد سایر فرضیات، هرگونه انحرافی از آن‌ها منجر به برآوردهای ناصحیح از اثرات ژنی می‌شود (۱۷). در تمامی صفات بررسی شده وراثت‌پذیری‌های برآورده شده در دو محیط تفاوت اندکی نشان دادند که مشخص می‌کند تنش کمبود آب تاثیر چندانی در تغییر واریانس افزایشی نداشته است (بجز در صفات شاخص برداشت و وزن حجمی که در شرایط تنش وراثت‌پذیری خصوصی اندکی افزایش یافته است). با توجه به میزان بالای وراثت‌پذیری‌های عمومی برآورده شده در دو محیط مشخص می‌شود که اثرات ژنتیکی در توارث تمامی صفات نقش زیادی دارند بنابراین در اصلاح این صفات می‌توان از روش‌های متنوع گرینش استفاده کرد.

در صفات وزن صدادنه، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و قطر دانه در هر دو شرایط محیطی و صفات وزن حجمی و تا حدودی شاخص برداشت وراثت‌پذیری خصوصی میزان متوسطی را نشان می‌دهد که این موضوع نشان‌دهنده نقش واریانس افزایشی در کنترل این صفات است بنابراین می‌توان در بهبود این صفات گرینش را در

منابع

1. Baker, R.J. 1978. Issues in diallels analysis. *Crop Science*, 18: 533-536.
2. Barnlard, A.D., M.T. Labuschagne and H.A. Van Niekerk. 2001. Heritability estimates of bread wheat quality traits in the Western Cape province of South Africa. *Euphytica*, 127: 115-122.
3. Bhutta, M.A. and Y. Mishra. 1995. Studies on yield and yield components in spring wheat under drought conditions. *Journal of Agricultural Research*, 35: 75-79.
4. Cammack, F.P., 1984. Stability compensation and heritability of yield and yield components in winter wheat. *Dissert Abstract International Biological Science Engineering*, 44: 2033-2034.
5. Chowdhry, M.A., M.S. Saeed, I. Khaliq and M. Ahsan. 2005. Combining ability analysis for some polygenic traits in a 5x5 diallel cross of bread wheat (*Triticum aestivum* L.). *Asian Journal of Plant Sciences*, 4(4):405-408.
6. Collaku, A. 1994. Selection for yield and its components in a winter wheat population under different environmental conditions in Albania. *Plant Breeding*, 112: 40-46.
7. Dana, I. and T. Dasgupta. 2001. Combining ability in black gram. *Indian Journal of Genetics*, 61: 170-171.
8. Dhanda, S.S. and G.S. Sethil. 1996. Genetics and interrelationships of grain yield and its related traits in bread wheat under irrigated and rainfed conditions. *Wheat Information Service*, 83: 19-27.
9. Edvards, L., H. Ketata and E.L. Smith. 1976. Gene action of heading date, plant height and other characters in two winter wheat crosses. *Crop Science*, 16: 275-279.
10. Ehdaie, B. and J.G. Waines. 1994. Genetic analysis of carbon isotope discrimination and agronomic characters in a bread wheat cross. *Theoretical Applied Genetics*, 88: 1023-1028.
11. Eshghi, R. and E. Akhundova. 2010. Genetic analysis of grain yield and some agronomic traits in hulless barley. *African Journal of Agricultural Research*, 4(12): 1464-1474.
12. Golabadi, M., A. Arzani and S.A.M. Mirmohamadi Meibodi. 2008. Genetic Analysis of some Morphological Traits in Durum Wheat by Generation Mean Analysis under Normal and Drought Stress Conditions, 24(1): 99-116 (In Persian).
13. Hallauer, A.R. and J.B. Miranda. 2010. Quantitative genetics in maize breeding. Iowa State Univ. Press. Ames, Iowa, 486 pp.
14. Honarnejad, R. 2007. Estimation of Genetic Parameters in Rice Using Different Diallel Methods of Griffing Approach, 11(41): 247-258 (In Persian).
15. Kheirella, K.A., M. Defrawy and T. Sherif. 1993. Genetic analysis of grain yield, biomass and harvest index in wheat under drought stress and normal moisture conditions. *Asian Journal of Agriculture Science*, 24: 163-183.
16. Kearsey, M.J. and H.S. Pooni. 1996. The Genetical Analysis of Quantitative Traits. Chapman and Hall.
17. Kempthone, O. 1957. An Introduction to Genetic Statistics. John Wiley and Sons Inc, New York.
18. Khan, M.Q., K. Alam and M.A. Chowdhry. 1992. Diallel cross analysis of some morphological traits in spring wheat. *Pakistan Journal of Agricultural Science*, 13: 211-215.
19. Kularia, R.K. and A.K. Sharma. 2005. Generation mean analysis for yield and its component traits in barley (*Hordeum Vulgare* L.). *Indian journal of Genetics and Plant Breeding*, 65(2): 129-130.
20. Lee, J. and P.J. Kaltsikes. 1972. Supplemental information on the use of computer program for the Jinks-Hayman diallel analysis of data from F_1 , F_2 and F_3 generations. *Crop Science*, 12: 633-643.
21. Long, W., 1988. Types of gene effect governing quantitative characters in winter wheat. *Plant breeding Abstracts*. 60(3): 260-268.
22. Malik, A.J., A.R. Chowdhury, M.M. Pajpur and K.A. Siddiqui. 1988. General and specific combining ability estimates in spring wheat diallel crosses. *Pakistan Agriculture Research*, 9(1): 10-15.
23. Miller, D. and R.C. Pikett. 1957. Inheritance of parent male fertility in *Sorghum vulgar* Peres. *Crop Science*, 14: 1-4.
24. Mousavi, S.S., B. Yazdi-Samadi, A.A. Zali and M.R. Ghanadha. 2006. Study GCA and SCA effects of quantitative traits of wheat in normal and water stress conditions. *Iranian Journal of Agriculture Science*, 37(1): 227-238 (In Persian).
25. Muller, J. 1991. Determining leaf surface area by means of linear measurements in wheat and riticale (brief report). *Archiv Fuchtungsforsch*, 21: 121-123.
26. Mou, B. and W.E. Kronstad. 1994. Duration and rate of grain filling in selected winter wheat populations, I. Inheritance. *Crop Science*, 34: 833-837.
27. Pourdad, S.S. and J.N. Sachan. 2001. Studies on heterosis, inbreeding depression and combining ability for important economic traits and inheritance of erucic acid in *Brassica napus* L. PhD Thesis, GB Plant Univ. Agric. Tech. Pantnagar, India, 254 pp.

28. Prakash, V., R.V. Singh and D.D. Saini. 2005. Gene action for grain yield and its related traits in barley (*Hordeum Vulgare L.*), Crop Improvement, 32(1): 40-43.
29. Roy, D. 2000. Plant breeding: analysis and exploitation of variation, Alpha Science International LTD, 701.
30. Sadeghi, F. 2014. Estimation of genetic structure of yield and yield components in bread wheat (*Triticum aestivum L.*) using diallel method, Journal of Crop Breeding, 6(13): 101-113.
31. Sangwan, V.P. and B.D. Chaudhary. 1999. Diallel analysis in wheat (*T. aestivum*). Annals of Biology Ludhiana, 15(2): 181-183.
32. Sharma, S.N., R.S. Sain and R.K. Sharma. 2002. Gene system governing grain yield per spike in macaroni wheat. Wheat Information Service, 94: 14-18.
33. Sheikh, S., I. Singh and J. Singh. 2000. Inheritance of some quantitative traits in bread wheat (*Triticum aestivum L. em. Thell*). Annals of Agriculture Research, 21: 51-54.
34. Talei, A. and M. Beigi. 1996. Study of combining ability and heterosis in wheat cultivars through Diallel mating. Agriculture Science Journal of Iran, 27: 67-75 (In Persian).
35. Turner, N.C. 1986. Adaptation to water deficits: a changing perspective. Australian Journal of Plant Physiology, 13: 175-190.
36. Toklu, F. and T. Yagbasanlar. 2007. Genetic analysis of kernel size and kernel weight in bread wheat. Asian Journal of Plant Science, 6: 844-848.
37. Vanda, M. and S. Houshmand. 2011. Study of genetic structure of stomatal and flag leaf traits in durum wheat (*Triticum turgidum L. ssp. durum*), Journal of Crop Breeding, 3(7): 27-41.
38. Yao, J., G. Yao, X. Yang, C. Qian and S. Wang. 2004. Analysis on the combining ability and heritability of the spike characters in wheat. Acta Agriculture Shanghai, 20: 32-36.

Genetic Analysis of Some Physiological and Yield Traits in Wheat by F₃ Families under Normal and late Season Water Deficit Conditions

Ali Akbar Asadi¹, Mostafa Valizadeh², Seyed Abolghasem Mohammadi² and Manochehr Khodarahmi³

1- Assistant Professor, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zanjan, Iran,
(Corresponding author: asadipm@gmail.com)

2- Professor of Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz,
Iran

3- Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension
Organization (AREEO), Karaj, Iran

Received: October 3, 2018 Accepted: May 11, 2019

Abstracts

Identification and selection of appropriate breeding methods and use of correct and applicable selection criteria for introducing resistant cultivars to water deficit stress is very important. In order to study the inheritance of physiological and agronomical traits in wheat, 50 F₃ lines along with parents and F₁ generations in a randomized complete block design with three replications under normal and water deficit conditions for two consecutive years were examined. The results showed that there are significant differences between and within the F₃ families for all traits in two environments. So, there is a lot of genetic variation for these traits. Gene effects in two different humidity conditions did not change significantly, and the genetic component of diversity in all traits in two environments was much larger than that of environmental diversity. In weight traits of 100-grain weight, plant height, spike length, number of grain per spike, number of spikelets per spike, grain diameter showed a moderate heritability in both environmental conditions, which indicate a greater role of additive variance in controlling of these traits, therefore, to improvethese traits, selection can be done in early generations. Grain yield per plant in both environmental conditions, showed high level of general heritability but low level of specific heritability, which indicates that, inheritance of this trait is genetically controled, and it is not controlled by additive effects and, on the contrary, dominance effects play important role in controlling it.

Keyword: Between and Within The F₃ Families, Generation Variance Analysis, Heritability, Mean Expected, Stress