



ارزیابی اثرات ژنتیکی و محیط بر صفات مرغولوژیکی و زراعی در اکوتیپ‌های مختلف سیاهدانه (*Nigella sativa L.*)

مهندی محب‌الدینی^۱, نرگس مهری^۲ و رقیه فتحی^۲

۱- دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، (نویسنده مسؤول: Mohebodini@uma.ac.ir)

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی

تاریخ دریافت: ۹۶/۰۷/۱۹ تاریخ پذیرش: ۹۷/۰۷/۱۹

صفحه: ۱۰۸ تا ۱۱۷

چکیده

سیاهدانه با نام علمی *Nigella sativa L.* یکی از گیاهان دارویی تیره Ranunculaceae است، که دانه‌های آن حاوی روغن، پروتئین، الکالوئید (مثل نیجیلیسین و نیجیدین)، کینون‌ها (مانند تیموکینون)، ساپونین و اسانس فرار می‌باشند. تنوع ژنتیکی رکن اصلی بیشتر بر نامه‌های اصلاحی بوده و انجام گزینش وابسته به وجود تنوع ژنتیکی مطلوب در صفات مورد بررسی می‌باشد. از این رو، به‌منظور تعیین تنوع ژنتیکی تعدادی از اکوتیپ‌های سیاهدانه و انتخاب بهترین اکوتیپ‌های گیاه دارویی سیاهدانه بومی ایران، آزمایشی در استان اردبیل به صورت طرح بلوك‌های کاملاً تصادفی با ۴ تکرار و در دو مکان از نظر صفات مرغولوژیکی و زراعی انجام پذیرفت. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها تفاوت معنی داری بین صفات مورد بررسی در هر دو مکان نشان داد، که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین اکوتیپ‌ها و متفاوت بودن اثر مکان بر میزان عملکرد و صفات مرغولوژیک اکوتیپ‌های سیاهدانه است. براساس نتایج تجزیه همبستگی، صفات عملکرد بیولوژیک، تعداد برگ، تعداد انشعبات ساقه، تعداد گل و کپسول در بوته به عنوان صفات مهم و تأثیرگذار بر عملکرد دانه شناخته شده‌اند. در مجموع مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که اکوتیپ‌های کرج، اردبیل^۱، تاکستان، همدان و لرگان از نظر عملکرد دانه در هر دو مکان از سایر اکوتیپ‌ها برتر بودند.

واژه‌های کلیدی: سیاهدانه، تجزیه همبستگی، تنوع ژنتیکی، عملکرد بذر

مختلف بایستی در محیط‌های متعدد مطالعه شوند. اثرات متقابل ژنتیک در محیط که پاسخ‌های متفاوت ژنتیک‌ها را در محیط‌های مختلف نشان می‌دهد، انتخاب ژنتیک‌ها را از یک محیط به محیط دیگر با مشکل مواجه می‌نماید. بنابراین، بررسی ژنتیک‌ها در محیط‌های مختلف از لحاظ تعیین استراتژی اصلاحی مناسب برای آزادسازی ارقام سازگار به محیط‌های هدف دارای اهمیت می‌باشد^(۱). در زمینه‌ی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف سیاهدانه مطالعات محدودی صورت گرفته است. ایلیسیم و همکاران^(۲) با مطالعه‌ی خصوصیات مرغولوژیک چندین گونه‌ی سیاهدانه در ترکیه، تنوع زیادی را در بین گونه‌های مورد بررسی از نظر صفات زراعی گزارش کردند. سلامتی و زینلی^(۱۲) در بررسی تنوع ژنتیکی ۲۱ ژنتیپ سیاهدانه از نقاط مختلف ایران با استفاده از صفات مرغولوژیکی و زراعی گزارش کردند، که اختلاف ژنتیکی اکوتیپ‌های مورد مطالعه برای کلیه صفات (میزان عملکرد، تعداد فولیکول در بوته و تعداد دانه در فولیکول) بجز شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است. همچنین فراوانی و همکاران^(۷) تنوع زراعی و آناتومیکی ۲۸ اکوتیپ سیاهدانه از نقاط مختلف خراسان را مورد بررسی قرار داده و اعلام کردند که شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی بیشترین توارث‌پذیری و بازده ژنتیکی را داشته و از میان صفات مورد بررسی، عملکرد بیولوژیکی و تعداد انشعبات ساقه تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند. فناجی و همکاران^(۶) نیز با مطالعه سازگاری زراعی و مواد موثره گیاهان دارویی (سیاهدانه، زیره سبز و رازیانه) در استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند که گیاهان فوق قابلیت کشت در هر دو فصل پائیز و بهار منطقه را دارند. اما بیشترین تولید را در فصل پائیز داشتند. همچنین نتایج کیفی نشان داد که میزان و نوع

مقدمه

ایران با برخورداری از تنوع جغرافیایی و اقلیمی به عنوان بستر مناسبی برای رشد و نگهداری گونه‌های مختلف گیاهی محسوب می‌شود که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره‌برداری صحیح می‌تواند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغال‌زایی و صادرات غیر نفتی داشته باشد^(۱۰). سیاهدانه (*Nigella sativa L.*) یکی از با ارزش‌ترین گیاهان دارویی است که در صنایع داروسازی و پزشکی کاربردهای فراوانی دارد^(۲). تأثیرات مصرف این گیاه در انسان شامل: شیرآوری، ضد نفخ، مسهل، ضد انگل، ضد صرع، ضد باکتری، ضد تومور، مسکن و کاهنده قند خون می‌باشد^(۸). با توجه به نقش تنوع ژنتیکی در پیشبرد برنامه‌های بهنژادی، بدون شک بررسی و پیگیری‌های مرغولوژیکی و فولوژیکی تعیین کننده عملکرد از جمله روش‌های مناسب برای دستیابی به معیارهای انتخاب در جهت بهبود عملکرد و اصلاح و معرفی ارقام است^(۳). عملکرد بذر صفت پیچیده‌ای است که توسط تعداد زیادی ژن کترول می‌شود و گریش تنها براساس عملکرد اغلب همراه با موفقیت نمی‌باشد. به همین دلیل یکی از راههای شناسایی اکوتیپ‌های ژن کترول می‌باشد. به بررسی صفاتی است که رابطه معنی داری با عملکرد بذر دارند تا با گزینش یا حذف آنها نسبت به تجمع ژن‌های مطلوب در ارقام اصلاح شده اقدام گردد^(۱۳). بررسی و تحلیل تنوع ژنتیکی در ذخایر تواریثی موجود از مهم‌ترین مراحل پژوهش‌های بهنژادی است که امکان گروه‌بندی و توصیف دقیق نمونه‌ها را فراهم آورده و بهنژادگر را در تشخیص زیر مجموعه‌ها و نمونه‌هایی که امکان استفاده موثر از آن‌ها در برنامه‌های اصلاحی وجود دارد را یاری می‌کند^(۳). برای نیل به تشخیص میزان تأثیر عوامل ژنتیکی و یا محیطی بر روی یک صفت، ژنتیک‌های

رشد و نمو مراقبت‌های زراعی معمول مانند وجین و تنکسازی بوته‌ها در ۳ مرحله ۲ برگی، ۴ برگی و ۸ برگی انجام شد و در نهایت در هر کرت در حدود ۱۱۰-۱۲۰ بوته تنهاداری شد. یادداشت برداری از صفات ارتفاع ساقه به سانتی‌متر، تعداد برگ، تعداد انشعابات ساقه، طول میانگره به سانتی‌متر، تعداد گره تا اولین گل، تعداد گل در بوته، طول ساقه گله‌هاینده به سانتی‌متر، طول شاخه فرعی به سانتی‌متر، طول بلندترین شاخه فرعی به سانتی‌متر، عرض برگ به میلی‌متر، طول برگ به میلی‌متر، وزن تر و خشک به گرم، طول و عرض فولیکول به میلی‌متر، تعداد برچه در هر فولیکول، تعداد دانه در هر برچه، تعداد فولیکول در بوته، وزن هر فولیکول به گرم و وزن ۱۰۰ دانه در ۵۰ درصد گله‌های با انتخاب تصادفی ۵ بوته در هر کرت اندازه‌گیری و ثبت گردید. تجزیه واریانس جداگانه هر یک از محیط‌ها، مقایسه میانگین و تجزیه همبستگی بین صفات با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 انجام شد.

نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تنوع مطلوبی بین اکوئیپ‌های سیاهدانه از لحاظ صفات (ارتفاع ساقه، تعداد برگ، تعداد انشعابات ساقه اصلی، تعداد گره تا اولین گل، تعداد میانگره، تعداد گل در بوته، طول ساقه گله‌هاینده، طول شاخه فرعی، طول بلندترین شاخه فرعی، طول و عرض برگ، عرض فولیکول، وزن تر و خشک، طول فولیکول، وزن ۱۰۰ دانه، وزن فولیکول، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در هر برچه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت) در سطح یک درصد و در صفت تعداد برچه در هر فولیکول، در سطح پنج درصد در هر دو مکان (اردبیل و خلخال) وجود دارد (جدول ۱ و ۲). با توجه به اینکه در این آزمایش شرایط محیطی برای کلیه اکوئیپ‌ها در هر یک از مکان‌ها یکسان بود، می‌توان بیان داشت تفاوت‌های موجود در بین اکوئیپ‌ها در اثر تفاوت‌های ژنتیکی آنها ایجاد شده است. اختلاف معنی دار بین صفات مورد مطالعه در هر دو محیط، حاکی از وجود تنوع ژنتیکی بالا در بین اکوئیپ‌ها از لحاظ این صفات می‌باشد که می‌تواند به عنوان یک پتانسیل ارزشمند در برنامه‌های اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج مطالعه آنthonio و همکاران (۵) در ارزیابی عملکرد دو گونه Nigella sativa و Nigella damascene که تنوع بالای برای صفات (تعداد دانه در فولیکول، عملکرد روغن، عملکرد دانه و وزن هزار دانه) وجود دارد و مشخص شد که در هر دو گونه تعداد دانه در فولیکول بیشترین اثر را بر روی عملکرد دانه دارد. Ahmed و همکاران (۱) نیز با بررسی اکوئیپ‌های سیاهدانه موجود در مرکز تحقیقات پاکستان، تنوع زیادی را در بین اکوئیپ‌ها از نظر صفات مورفولوژیکی گزارش نمودند.

مواد موثره موجود در انسان تحت تأثیر شرایط آب و هوایی متفاوت می‌تواند متغیر باشد. نوروزبور و رضوانی مقدم (۱۱) در بررسی اثر فواصل مختلف آبیاری بر روی سیاهدانه نشان دادند که عملکرد دانه و درصد انسان از همبستگی مثبت و بالایی برخوردار بودند.

از آنجا که اکوئیپ‌های مورد بررسی بومی هستند و کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، لذا این پژوهش اولین مطالعه در زمینه بررسی اثرات ژنتیک و محیط روی گیاه سیاهدانه در ایران می‌باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ژنتیک و محیط روی عملکرد، اجزای عملکرد و تعدادی از صفات زراعی در مورد اکوئیپ‌های مورد مطالعه در دو محیط و سپس بررسی اکوئیپ‌ها در هر کدام از محیط‌ها و انتخاب بهترین اکوئیپ‌ها برای هر محیط است. شناسایی اکوئیپ‌هایی که از لحاظ بسیاری از صفات با یکدیگر تفاوت دارند و دارای منشأ متفاوتی هستند، می‌تواند برای استفاده از بهترین آنها در پژوهش‌های اصلاحی به عنوان والدین تلاقی‌ها و بهره‌گیری از صفات ممتاز آنها مؤثر باشد.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در سال ۱۳۹۶ در دو محیط شامل شهرستان خلخال، استان اردبیل (طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۱۳ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۶۱ دقیقه شمالی با ارتفاع ۱۷۵۰ متری از سطح دریا) و مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی، استان اردبیل (طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۳ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۸ درجه و ۲۵ دقیقه شمالی با ارتفاع ۱۳۱۱ متری از سطح دریا) به صورت طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با ۲۷ اکوئیپ سیاهدانه جمع‌آوری شده از نقاط مختلف کشور شامل استان‌های اردبیل، کرج، اصفهان، اهواز، شیراز، کردستان، گیلان، ارومیه، قزوین، مشهد، لرستان، اراک، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی با ۳ تکرار اجرا شد. در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ ۲۰ فروردین اقدام به کشت اکوئیپ‌ها شد و از ۱ مرداد با توجه به رسیدگی اقدام به برداشت گردید. همچنین کشت بذور سیاهدانه در شهرستان خلخال در تاریخ ۲۳ فروردین و برداشت آن با توجه به رسیدگی اکوئیپ‌ها از تاریخ ۷ مرداد آغاز گردید. عملیات آماده‌سازی زمین شامل شخم، دیسک و صاف کردن زمین قبل از اجرای آزمایش صورت گرفت. پس از آماده‌سازی زمین اقدام به ایجاد کرت‌هایی به طول و عرض یک متر گردید و نقشه طرح پیاده شد. به دلیل کوچک بودن بذرها، کشت با عمق کم، در حدود ۲-۳ سانتی‌متری سطح خاک، انجام شده و برای اطمینان از داشتن گیاه در کل ردیف ۴-۵ بذر در هر نقطه کشت شد. فاصله‌ای کشت روی ردیف‌ها ۱۵ سانتی‌متر و فاصله‌ای ردیف‌ها از هم ۳۰ سانتی‌متر بود. آبیاری گیاهان به طور منظم یکبار در هفته با روش نشستی انجام گرفت. در طول دوران

جدول ۱- تجزیه واریانس ساده صفات مختلف اکوئیپ‌های یومی سیاهدانه در اردبیل

Table 1. Analysis of variance of different characteristics of *Nigella sativa* L. ecotypes in Ardabil

منابع تغییر	درجه آزادی	HS(cm)	NL	NSB	NNF	NN	NF	LS(cm)	LB(cm)	LLB(cm)	LL(mm)	LW(mm)	NCB
بلوک	۳	۴۸/۰۲ ^{ns}	۲۲/۳۳ ^{ns}	۷/۲۷ ^{ns}	۱/۱۲ ^{ns}	۱/۱۴ ^{ns}	۱/۸۳ ^{ns}	۷/۸/۱۰ ^{ns}	۸/۲۹ ^{ns}	۱۶۰/۵۶ [*]	۳۸/۲۸ ^{ns}	۳۸/۲۸	۳/۲۱ ^{ns}
توده	۲۶	۵۶۸/۴۹ ^{**}	۵۴۰/۰۵ ^{**}	۱۲/۴۸ ^{**}	۲۶/۵۸ ^{**}	۲۸/۲۸ ^{**}	۱۳۴/۵۶ ^{**}	۴/۹۳ ^{**}	۱۴۳/۱۰ ^{**}	۱۶۳/۶۸ ^{**}	۱۱۹/۸۰ ^{**}	۱۱۴/۴۲ ^{**}	۱۳۸/۷۵ ^{**}
اشتباه	۷۸	۳۴/۴۷	۲۶/۴۰	۲/۲۷	۲/۲۴	۲/۲۶	۰/۸۶	۱۰/۴۴	۱۲/۴	۹۴/۵۲	۹۴/۷۱	۴۹/۷۲	۳/۷۲
ضریب تغییرات		۷۱/۰۷	۲۸/۴۰	۲/۱۰	۱۷/۲۰	۱۵/۹۰	۲۶/۱۵	۱۷/۲۶	۲۲/۲۳	۲۶/۷۸	۱۰/۰۷	۲۱/۵۸	

ادامه جدول ۱

Continue Table 1

منابع تغییر	درجه آزادی	NSC	NCF	DLF(mm)	DWF(mm)	WS(g)	WW(g)	WD(g)	WC(g)	GY(kg)	BY(kg)	HI	
بلوک	۳	۲/۴۷ ^{ns}	۰/۴۷ ^{ns}	۰/۴۶ ^{ns}	۰/۴۶ ^{ns}	۰/۸۱ ^{ns}	۳۹/۷۹ ^{**}	۳/۸ [*]	-/-A ^{ns}	۲/۲۳ ^{**}	.۰/۲۰ ^{ns}	.۰/۰۰-Y ^{ns}	
توده	۲۶	۱۰/۴۶ ^{**}	۰/۷۲ [*]	۳/۵۳ ^{**}	۱/۳۹ ^{**}	۱۰/۷۷ ^{**}	۱۷/۷۷ ^{**}	-/-A ^{**}	-/-A ^{**}	۲۵۲۴/۶۰ ^{**}	۸۳۳۲/۲ ^{**}	.-/۳۳ ^{**}	
اشتباه	۷۸	۳/۸۹	۰/۳۷	۱/۳۱	۰/۵۹	-/...۰۹	۹/۳۳	۱/۲۷	۰/۷۹	.۰/۷۹	.۰/۷۹	.-/۰۰-۶	
ضریب تغییرات		۱۷/۲۵	۱۱/۱۳	۱/۱۶	۱۱/۲۵	۱۱/۲۵	۱۱/۲۵	۱۱/۲۵	۱۰/۴۶	۱۰/۴۶	۳۳/۶۹	۱۲/۷۲	۱۰/۰۶

*، **: بهترین معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد، ۱ درصد و عدم معنی داری
ارتفاع ساقه (HS)، تعداد برگ (NL)، تعداد اشتعابات ساقه (NSB)، تعداد میانگرۀ تا اولین گل (NNF)، تعداد گره (NN)، تعداد گله (NF)، طول شاخه فرعی (LB)، طول بلندترین شاخه فرعی (LLB)، طول برگ (LL)، عرض برگ (LW)، تعداد فولیکول در بوته (NCB)، تعداد بذر در هر برچه (NSC)، تعداد فولیکول (NCF)، عرض فولیکول (DWF)، وزن تر (WW)، وزن دانه (WS)، وزن هر فولیکول (WD)، عملکرد دانه (GY)، عملکرد بیولوژیک (BY) و شاخص برداشت (HI).

جدول ۲- تجزیه واریانس ساده صفات مختلف اکوئیپ‌های یومی سیاهدانه در خلخال

Table 2. Analysis of variance of different characteristics of *Nigella sativa* L. ecotypes in khalkhal

منابع تغییر	درجه آزادی	HS(cm)	NL	NSB	NNF	NN	NF	LS(cm)	LB(cm)	LLB(cm)	LL(mm)	LW(mm)	NCB
بلوک	۳	۲۸/۷۵ ^{**}	۴/۷۳ ^{**}	۰/۰۴ ^{ns}	۱۹/۱۷ ^{**}	۱۹/۱۷ ^{**}	۰/۰۱ ^{ns}	۴/۲۳ ^{ns}	۱۲/۲۳ ^{**}	۸۶/۵۹ ^{**}	۹/۰۹ ^{**}	.-/۱۲ ^{ns}	
توده	۲۶	۱۷/۵۳ ^{**}	۲/۱۲ ^{**}	۱/۰۵ ^{**}	۱۰/۰۸ ^{**}	۱۰/۰۸ ^{**}	۰/۰۵ ^{**}	۳/۰۵ ^{**}	۲۰/۱۸ ^{**}	۵۷/۶۱ ^{**}	۱۰/۰۶ ^{**}	.-/۱۷ ^{**}	
اشتباه	۷۸	۴/۵۰	۰/۱۱	۰/۰۹	۰/۹۴	۰/۹۴	۰/۰۴	۰/۳۶	۱/۰۳ [*]	۱۱/۰۳	۱/۱۰ [*]	۱/۱۰ [*]	.-/۱۱
ضریب تغییرات		۸/۷۳	۱۱/۷۴	۱۵/۵۹	۱۱/۱۷	۱۱/۱۷	۱۴/۹۱	۱۳/۹۲	۳۶/۹۴	۳۶/۴۴	۱۲/۲۳	۱۲/۲۳	۱/۱۲ [*]

ادامه جدول ۲

Continue Table 2

منابع تغییر	درجه آزادی	NSC	NCF	DLF(mm)	DWF(mm)	WS(g)	WW(g)	WD(g)	WC(g)	GY(kg)	BY(kg)	HI	
بلوک	۳	۰/۰۷ ^{ns}	۰/۰۷ ^{ns}	۰/۰۴ ^{ns}	۱/۷۴ ^{ns}	۷/۱۴ ^{**}	۰/۰۷ ^{ns}	-/-A ^{ns}	-/-A ^{ns}	۲۴۰۰-۵ ^{**}	۴/۱۶ ^{**}	.-/۰۰۰-Z ^{ns}	
توده	۲۶	۸/۷۰ ^{**}	۱/۳۳ ^{**}	۰/۱۸ ^{**}	۴/۵۲ ^{**}	۴/۰۲ ^{**}	۰/۰۰۲ ^{**}	۱/۰۳ ^{**}	۱/۰۳ ^{**}	۵۶۴۴/۱۰ ^{**}	۲۳۸۰/۱۰ ^{**}	.-/۰۱ ^{**}	
اشتباه	۷۸	۰/۷۰	۲/۱۸	۰/۰۷	۰/۰۵ ^{**}	۰/۰۱ ^{**}	۰/۰۱ ^{**}	۰/۰۱ ^{**}	۰/۰۱ ^{**}	۰/۰۴	۱/۰۴	.-/۰۰۰-۲	
ضریب تغییرات		۱۶/۱۶	۹/۲۹	۱/۰۶	۹/۱۵	۱۰/۷۱	۱۰/۷۱	۲۴۲۶	۳۱/۱۹	۱۰/۰۴	۱۰/۰۴	۹/۷۳	۶/۵۸

*، **: بهترین معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد، ۱ درصد و عدم معنی داری
ارتفاع ساقه (HS)، تعداد برگ (NL)، تعداد اشتعابات ساقه (NSB)، تعداد میانگرۀ تا اولین گل (NNF)، تعداد گره (NN)، تعداد گله (NF)، طول شاخه فرعی (LB)، طول بلندترین شاخه فرعی (LLB)، طول برگ (LL)، عرض برگ (LW)، تعداد فولیکول در بوته (NCB)، تعداد بذر در هر برچه (NSC)، تعداد فولیکول (NCF)، عرض فولیکول (DWF)، وزن تر (WW)، وزن دانه (WS)، وزن هر فولیکول (WD)، عملکرد دانه (GY)، عملکرد بیولوژیک (BY) و شاخص برداشت (HI).

کمترین مقدار را داشتند. از نظر صفت طول و عرض برگ و طول فولیکول اکوتیپ همدان بیشترین مقدار را داشت. صفات ارتفاع گیاه، تعداد انشعابات ساقه، تعداد فولیکول و وزن فولیکول اجزای اصلی تشکیل دهنده عملکرد دانه در بوته سیاهدانه محسوب می‌شوند. و با توجه به اینکه اکوتیپ‌های لردگان، تاکستان، همدان، اردبیل ۱ و کرج در هر دو محیط از نظر این صفات نمود برتری داشتند به نظر می‌رسد که این صفات کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار گرفته و می‌تواند معیار خوبی برای انتخاب چهت افزایش عملکرد دانه باشد. در همین زمینه ویلام (۱۶) و اسمیت (۱۵) با بررسی عوامل مؤثر بر پتانسیل تولید علوفه گیاهان علوفه‌ای لگوم گزارش دادند رقم یکی از مؤلفه‌های موثر در عملکرد است.

برای بررسی روابط بین صفات موثر بر عملکرد دانه از تجهیزه همبستگی استفاده شد. ارتباط بین عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن با استفاده از ضرایب همبستگی در جدول ۵ نشان داده شده است. همبستگی عملکرد دانه با صفات ارتفاع گیاه، تعداد برگ، تعداد انشعابات ساقه، تعداد میانگره، تعداد گل در بوته، تعداد فولیکول، تعداد برچه و تعداد دانه در برچه و وزن فولیکول در هر دو مکان به صورت مثبت و معنی‌دار بود. بیشترین همبستگی معنی‌دار مثبت بین عملکرد دانه و تعداد برگ و تعداد انشعابات ساقه، تعداد گل و کپسول مشاهده گردید. سلامتی و زینلی (۱۲) نیز در بررسی تنوع ژنتیکی سیاهدانه گزارش کردند که عملکرد دانه در بوته با صفات عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در فولیکول، ارتفاع بوته، تعداد انشعاب‌های ساقه و شاخص برداشت همبستگی مثبت و بالایی دارد. از دیگر همبستگی‌های مثبت معنی‌دار می‌توان به همبستگی ارتفاع گیاه با کلیه صفات مورد بررسی بجز وزن ۱۰۰ دانه اشاره کرد. که همبستگی منفی و معنی‌دار -0.059 با این صفت نشان داد. همچنین ارتفاع گیاه بالاترین ضریب همبستگی را با تعداد برگ، تعداد گل و کپسول در بوته داشت (-0.096). در مطالعه حاضر همبستگی بالای ارتفاع گیاه با صفات ذکر شده، می‌تواند به دلیل گسترده‌گی اولیه برگ‌ها و ذخیره بیشتر مواد غذایی جهت رشد طولی گیاه و رشد بیشتر بخش رویشی و در نهایت انتقال به بخش زایشی و افزایش عملکرد شود (۱۶) که در اکوتیپ‌های تاکستان، کرج، همدان، لردگان و اردبیل ۱ مشاهده می‌شود. بین تعداد فولیکول در بوته و وزن هر فولیکول و تعداد دانه در هر برچه و وزن خشک همبستگی مثبت و معنی‌دار ولی با وزن صد دانه همبستگی منفی و معنی‌دار وجود دارد. این نتایج با نتایج مطالعه‌ی انجام شده روی سیاهدانه توسط زینلی و سلامتی (۱۲) و همچنین بهرامی نژاد و پاپ زن (۴) در خصوص افزایش تعداد فولیکول در بوته که منجر به کاهش وزن ۱۰۰ دانه، تعداد دانه در فولیکول و در نهایت عملکرد دانه نیز شده است، مطابقت دارد. در مجموع طبق مشاهدات، با افزایش ارتفاع، تعداد برگ و تعداد انشعابات ساقه تعداد فولیکول در بوته و تعداد دانه در فولیکول افزایش یافته و رابطه منفی با وزن ۱۰۰ دانه نشان داد. اما در بین اکوتیپ‌هایی که از لحاظ صفات مورد بررسی و عملکرد قوی بودند و اکوتیپ‌هایی که ضعیفتر بوده و به

همچنین در بین صفات مورد مطالعه ارتفاع بوته، طول برگ، طول شاخه فرعی، وزن فولیکول و وزن خشک ضریب تغییرات نسبتاً بالا داشتند که نشان دهنده تأثیر زیاد محیط بر روی این صفات نسبت به سایر صفات بود که همگی، صفات مرتبط با عملکرد دانه هستند. در تطابق با نتایج حاضر، سلامتی و زینلی (۱۲) نیز پراکنده‌گی وسیعی برای صفات ارتفاع گیاه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و وزن فولیکول در گیاه سیاهدانه برآورد نمودند.

نتایج مقایسه میانگین‌ها در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی (جدول ۳) نشان داد که اکوتیپ تاکستان بیشترین میزان تعداد برگ (۵۴ عدد)، عملکرد دانه (۱۴۲/۷۱ گرم) و شاخص برداشت (۰/۹۵) و اکوتیپ بروجن کمترین میزان تعداد برگ (۱۱/۸۱)، عملکرد دانه (۳۹/۶۲) و شاخص برداشت (۰/۱۲) را دارا بود. از نظر ارتفاع بوته، بلندترین اکوتیپ در بین اکوتیپ‌های مورد مطالعه، اکوتیپ لردگان (۴۸/۷۵ سانتی‌متر) و کوتاه‌ترین اکوتیپ اهواز (۲۳/۳۷ سانتی‌متر) بود. این صفت ضریب تغییرات برابر ۷۱/۰۷ درصد داشت که گویای وجود تنوع نسبتاً زیاد بین اکوتیپ‌ها از نظر این صفت می‌باشد. همچنین از نظر صفت تعداد میانگره و گره تا اولین گل، اکوتیپ کرج بیشترین و مشهد ۲ کمترین مقدار را نشان داد. بیشترین میزان صفات تعداد فولیکول در بوته، طول فولیکول، تعداد گل در بوته، تعداد انشعابات ساقه، طول شاخه فرعی و طول بلندترین شاخه فرعی مربوط به اکوتیپ لردگان بود.

عملکرد بیولوژیک در اکوتیپ همدان (۱۸۶/۹۱) گرم در متر مریع) بیشترین و اکوتیپ مشهد ۱ (۱۳/۷۵ گرم) کمترین مقدار را داشتند. وزن فولیکول در اکوتیپ‌های اردبیل ۱، کرج، همدان، سریشه، لردگان و تاکستان بیشترین میزان مقدار و اکوتیپ‌های اصفهان ۱، اردبیل ۲ و میاندواب کمترین مقدار را دارا بودند. از نظر وزن ۱۰۰ دانه، اکوتیپ‌های کرج، همدان، املش و تاکستان کمترین میزان و اکوتیپ‌های کاشان، اصفهان ۱ و ۲، مشهد ۱، پیرانشهر، اهواز و بروجن بیشترین مقدار را داشتند.

در مجموع مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی، اکوتیپ تاکستان با ۱۴۲۷ کیلوگرم، اکوتیپ لردگان با ۱۱۸۲ کیلوگرم، اکوتیپ کرج با ۱۱۰۴ کیلوگرم، اکوتیپ همدان با ۱۰۶۰ کیلوگرم و اکوتیپ اردبیل ۱ با ۹۸۵ کیلوگرم در هکتار برترین ارقام بودند. نتایج مقایسه میانگین اکوتیپ‌ها در شهرستان خلخال نشان داد (جدول ۴) که در صفات ارتفاع گیاه، تعداد انشعابات ساقه، تعداد فولیکول در بوته و تعداد میانگره اکوتیپ لردگان (۳۲/۲۰) بیشترین میزان را دارا بود. عملکرد دانه در اکوتیپ‌های کرج، همدان، لردگان، تاکستان و اردبیل ۱ بیشترین مقدار و اکوتیپ اصفهان ۱ کمترین مقدار را دارا بود. اکوتیپ پیرانشهر از نظر عملکرد بیولوژیک (۲۱۰/۵۹) و شاخص برداشت (۰/۳۴) بیشترین مقدار و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک مربوط به اکوتیپ اراک (۳۴/۰۶) بود. وزن کپسول اکوتیپ‌های اردبیل ۱، کرج، همدان، لردگان و تاکستان بیشترین میزان و اکوتیپ کاشان و اصفهان ۱

میزان را دارا بودند. همچنین مقایسه میانگین شهرستان خلخال (جدول ۴) نشان داد که اکوتیپ اردبیل ۱ با ۱۰۶۲ کیلوگرم در هکتار بیشترین و اکوتیپ اصفهان ۱ با ۱۹۵ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید نمودند. همچنین حداکثر عملکرد بیولوژیک مریبوط به اکوتیپ پیراشهر با ۲۱۰۵ کیلوگرم در هکتار و حداقل آن مریبوط به اکوتیپ اراک با ۳۴۰ کیلوگرم در هکتار بوده است. به طور کلی، با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر و تجزیه‌های آماری انجام شده می‌توان نتیجه گرفت اکوتیپ‌های تاکستان، لردگان، کرج، همدان و اردبیل ۱ در هر دو مکان از نظر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه نمود برتری از سایر اکوتیپ‌ها داشتند.

عبارتی از تعداد انشعابات کمتر یا فاقد انشعاب بوده و فقط یک یا چند فولیکول داشتند تفاوت معنی‌داری بین وزن ۱۰۰ دانه هر دو گروه مشاهده نشد. بنابراین اکوتیپ‌های اردبیل ۱، همدان، لردگان، تاکستان و کرج هم از لحاظ علوفه‌ای و هم از لحاظ عملکرد بذر اکوتیپ‌های مطلوب‌تری بودند. نتایج این تحقیق نشان داد عامل مکان و اکوتیپ بر بروز پتانسیل تولید عملکرد سیاهدانه موثر است و میزان محصول بستگی به شرایط آب و هوا و نوع اکوتیپ دارد. مقایسه میانگین‌ها (جدول ۳) نشان داد که در اردبیل، اکوتیپ تاکستان با ۱۴۲۷ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه و اکوتیپ بروجن با ۲۹۶ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید کرد. از نظر عملکرد بیولوژیک اکوتیپ همدان با ۱۸۶۹ کیلوگرم در هکتار بیشترین و اکوتیپ مشهد ۱ با ۱۳۷۷ کیلوگرم کمترین

جدول ۳- مقایسه میانگین صفات اکوئیپ‌های سیاهدانه (*Nigella sativa* L.) کشت شده در اردبیلTable 3. Mean comparison of traits in *Nigella sativa* L. ecotypes cultivated in Ardabil

HI	BY	GY	LW	LL	WS	DWF	DLF	NCF	NSC	WC	WD	WW	NCB	LLB	LB	LS	NF	IL	NNF	NSB	NL	HS	توده
-/۵۷ ^{dc}	۲۶/۲ ^c	۴۱/۹ ^f	۸/۲۴ ^{ab}	۲/۸ ^{ab}	-/۲۷ ^{d-f}	-/۵۶ ^{c-j}	۵/۲۳ ^{a-c}	۱۱/۵۶ ^{a-c}	۹/۵۵ ^{a-c}	۹/۳۸ ^{a-c}	۵/-۸ ^{ab}	۹ ^{ab}	۴۹/۸۵ ^b	۱۷/۱۸ ^{ab}	۱۱ ^{a-c}	۹/۱۸ ^{a-c}	۳/۹۹ ^a	۱۹۵ ^b	۶/۷۸ ^a	۴/۰۵ ^{a-c}	۱۵/۰۶ ^{a-c}	۲۳/۸۷ ^b	شیراز
-/۱۳ ^a	۳۶/۵۷ ^h	۲۹/۵۷ ^a	۷/۰۸ ^a	۲/۰۷ ^{ab}	-/۲۷ ^g	۱/-۲۷ ^k	۴/۸۸ ^{ab}	۹/۰۸ ^a	۹/۰۷ ^{a-c}	۹/۱۹ ^{a-c}	۵/۱۴ ^{a-c}	۸/۱۱ ^{ab}	۵۷/۴۷ ^{ab}	۱۵۴ ^a	۸/۶۸ ^{ab}	۴/۶۸ ^{a-c}	۲/۲۷ ^a	۶/۵۳ ^a	۲/۸۷ ^a	۱۱/۸۱ ^a	۲۳/۵۰ ^a	بروجن	
-/۱۴ ^b	۲۸/۰۸ ^m	۲۶/۰۷ ^{dc}	۷/۰۷ ^{ab}	۳/۰۷ ^{a-c}	-/۰۷ ^g	-/۰۷ ^{a-h}	۴ ^a	۱-۰۷ ^{a-c}	۱-۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^{a-c}	۸/۰۷ ^{ab}	۱۴/۰۷ ^a	۱۲/۰۷ ^{a-d}	۱-۰۷ ^{a-c}	۷/۰۷ ^{hi}	۳/۰۷ ^a	۲/۸۷ ^{ab}	۱۵/۱۸ ^{a-c}	۲۵/۰۷ ^{a-c}	اراک		
-/۲۴ ^{bc}	۱۹/۱۹ ^b	۴-۰۱۹ ^f	۷/۰۷ ^{ab}	۲/۰۷ ^a	-/۰۷ ^{a-d}	-/۰۷ ^{a-f}	۶/۰۷ ^{a-c}	۱۰/۰۷ ^{ab}	۹/۰۷ ^{a-c}	۱۰/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۶/۱۷ ^{ab}	۶۷/۰۸ ^{ab}	۲۲/۵۷ ^{ab}	۱۲/۱۳ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۴/۹۰ ^{a-f}	۶/۷۸ ^a	۴/۱۸ ^{a-c}	۱۴/۰۷ ^{ab}	۲۹ ^{a-d}	سمیرم	
-/۲۴ ^{bc}	۱۳۷/۱۷ ^a	۳۷/۱۷ ^b	۷/۰۹ ^{ab}	۱/۰۷ ^a	-/۰۷ ^g	-/۰۷ ^{c-j}	۵ ^{ab}	۱۱/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۵ ^{ab}	۶/۰۷ ^{ab}	۶۶/۰۷ ^a	۱۸/۱۰ ^{ab}	۱۱ ^{a-c}	۹/۱۰ ^{a-c}	۴/۱۰ ^a	۳/۱۰ ^a	۷/۱۰ ^{ab}	۱۳/۰۷ ^a	۲۶/۰۷ ^{a-c}	مشهد	
-/۱۷ ^a	۲۸/۱۴ ^p	۵۷/۰۷ ^{ij}	۷/۰۷ ^{ab}	۱/۰۷ ^a	-/۰۷ ^g	۱/۰۷ ^{c-k}	۶ ^{a-c}	۹/۰۷ ^a	۹/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^{ab}	۱۰/۰۷ ^a	۱۷/۰۷ ^{a-d}	۶/۰۷ ^{ab}	۵/۰۷ ^{ab}	۵/۰۷ ^a	۵/۰۷ ^{a-c}	۱۷/۰۷ ^a	۲۵/۰۷ ^{a-c}	کاشان		
-/۹۸ ^g	۱۳۶/۲۱ ^f	۱۴۲/۱۷ ^q	۱۲/۱۹ ^c	۴/۱۴ ^{b-d}	-/۱۴ ^{a-c}	۱/۱۹ ^{c-k}	۱۹/۱۶ ^c	۱۴/۱۴ ^{cd}	۱-۰۷ ^{a-c}	۹/۱۲ ^{a-c}	۶/-۸ ^{ab}	۲۱/۰۷ ^C	۹۷/۴۷ ^{bc}	۲۵/۰۷ ^{de}	۳۱/۱۲ ^g	۲۷/۹۵ ^f	۸/۰۷ ⁱ	۱۷/۰۷ ^d	۱۱/۰۷ ^{dc}	۷/۵۲ ^{ef}	۵۴ ^g	۵۳/۰۷ ^f	تاقسستان
-/۱۴ ^a	۱۳۵/۱۷ ^r	۱۱-۰۱۰ ^o	۱۹/۱۷ ^f	۶ ^{de}	-/۰۷ ^{ab}	۱/۰۷ ^{b-k}	۲۲/۰۷ ^{bc}	۱۱/۱۲ ^{a-c}	۱-۰۷ ^{a-c}	۱-۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۲۱/۰۷ ^c	۶۶/۴۵ ^{bc}	۲۵/۰۷ ^{cd}	۲۰/۱۲ ^c	۱۷/۰۷ ^{cd}	۷/۱۰ ^a	۲/۱۰ ^a	۱۳/۰۷ ^a	۲۶/۰۷ ^{a-c}	۱۳۵/۰۷ ^{a-c}	کرج	
-/۱۸ ^{fg}	۱-۰۷/۱۱ ^g	۱۱۸/۲۱ ^p	۱۷/۱۹ ^f	۵/۱۳ ^{c-c}	-/۱۳ ^{a-d}	۱/۱۳ ^k	۲۷/۰۷ ^f	۱۴/۰۷ ^{cd}	۱۳/۰۷ ^d	۱۱/۰۷ ^d	۶/۰۷ ^c	۲۸/۰۷ ^d	۷۷/۰۷ ^{ab}	۳۷/۰۷ ^{c-e}	۳۷/۰۷ ^a	۳۴/۰۷ ^g	۲۶/۰۷ ^f	۸/۰۷ ^g	۴۶/۰۷ ^g	۶۸/۰۷ ^g	لدگان		
-/۷۵ ^{cf}	۴۵/۰۷ ^l	۶-۰۱۷ ^k	۷/۰۷ ^a	۳/۰۷ ^{ab}	-/۰۷ ^{b-c}	۱/۰۷ ^{a-k}	۱/۰۷ ^{a-c}	۱۱/۰۷ ^c	۱-۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۶/-۸ ^{ab}	۲۱/۰۷ ^C	۹۷/۴۷ ^{bc}	۲۵/۰۷ ^{de}	۳۱/۱۲ ^g	۲۷/۹۵ ^f	۸/۰۷ ⁱ	۱۷/۰۷ ^d	۱۱/۰۷ ^{dc}	۷/۵۲ ^{ef}	۵۴ ^g	۵۳/۰۷ ^f	لرستان
-/۱۰ ^{fg}	۳۶/۰۷ ⁱ	۲۱/۰۷ ^{rr}	۱۱/۰۷ ^{c-d}	۲/۰۷ ^{ab}	-/۰۷ ^{c-g}	-/۰۷ ^{a-g}	۶/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^a	۹/۰۷ ^{a-c}	۸/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{ab}	۱۰/۰۷ ^a	۲۰/۰۷ ^{ab}	۱۱/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^a	۵/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{a-f}	۴/۰۷ ^a	۲۸/۰۷ ^{a-d}	۰۷ ^{fg}	نیشابور	
-/۰۵ ^{b-d}	۳۷/۰۷ ⁱ	۶-۰۱۷ ^k	۶/۰۷ ^{a-c}	۲/۱۱ ^a	-/۰۷ ^{a-d}	-/۰۷ ^{c-j}	۸/-۸ ^{bc}	۱۱/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{ab}	۵/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۱۷/۰۷ ^{a-d}	۶/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-f}	۱۶/۰۷ ^a	۵/۰۷ ^{a-c}	۱۵/۰۷ ^{a-c}	۲۹/۰۷ ^{a-d}	قزوین	
-/۹۰ ^g	۳۶/۰۷ ⁱ	۶۱/۰۷ ^k	۸/۰۷ ^{ab}	۳/۰۷ ^{ab}	-/۰۷ ^g	-/۰۷ ^{a-f}	۵/۰۷ ^{a-c}	۱۱/۰۷ ^{a-c}	۱-۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۶/۰۷ ^{ab}	۶۴/۰۷ ^{ab}	۲۲/۰۷ ^{bc}	۱۲/۰۷ ^{a-c}	۶/۰۷ ^a	۵/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-c}	۲۳/۰۷ ^a	۰۷ ^{fg}	اهواز	
-/۱۷ ^b	۶-۰۹ ^o	۴-۰۱۷ ^f	۹/۰۷ ^{a-c}	۳/۰۷ ^{ab}	-/۰۷ ^{a-d}	۱/۰۷ ^k	۵/۰۷ ^{a-c}	۱-۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^{ab}	۱۱۳/۰۷ ^c	۲۸ ^c	۱-۰۷ ^{ab}	۹/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-f}	۳/۰۷ ^{cd}	۱۶/۰۷ ^{a-c}	۳۰/۰۷ ^{a-d}	سریشنه		
-/۰۳ ^{b-d}	۲۷/۰۹ ^f	۵۱/۰۶ ^h	۷/۰۹ ^{ab}	۱/۰۷ ^a	-/۰۷ ^{c-g}	-/۰۷ ^{ab}	۷/۰۷ ^{bc}	۹/۰۷ ^a	۹/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{ab}	۶/۰۷ ^a	۶/۰۷ ^{ab}	۱۷/۰۷ ^a	۱۲/۰۷ ^{a-d}	۶/۰۷ ^a	۵/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{a-f}	۴/۰۷ ^a	۲۵ ^{ab}	۰۷ ^{b-d}	اردبیل
-/۰۱ ^d	۱۷/۰۷ ^d	۴۴/۰۷ ^g	۷/۰۷ ^a	۲/۰۷ ^{ab}	-/۰۷ ^{c-j}	-/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{ab-c}	۹/۰۷ ^a	۹/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{ab}	۵۰/۰۷ ^{ab}	۱۰/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{a-d}	۴/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-c}	۰۷ ^{b-d}	۰۷ ^{fg}	اصفهان	
-/۰۷ ^{dc}	۴۱/۰۷ ^j	۸-۰۱۷ ^k	۸/۰۷ ^{ab}	۱/۰۷ ^g	-/۰۷ ^{a-c}	-/۰۷ ^{a-c}	۱/۰۷ ^{ab}	۱۱/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{ab}	۱۱/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{ab}	۱۰/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-c}	۲۶/۰۷ ^{a-d}	۰۷ ^{fg}	اصفهان	
-/۰۶ ^{dc}	۲۶/۰۷ ⁱ	۲۶/۰۷ ^c	۷/۰۷ ^{ab}	۱/۰۷ ^a	-/۰۷ ^{a-d}	-/۰۷ ^{b-i}	۵/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^a	۹/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{ab}	۵/۰۷ ^a	۵/۰۷ ^{ab}	۱۱/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{a-d}	۴/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-c}	۰۷ ^{fg}	کاشمر	
-/۰۷ ^{dc}	۲۶/۰۷ ^c	۲۶/۰۷ ^c	۷/۰۷ ^{ab}	۱/۰۷ ^a	-/۰۷ ^{a-d}	-/۰۷ ^{b-i}	۵/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^a	۹/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{ab}	۵/۰۷ ^a	۵/۰۷ ^{ab}	۱۱/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{a-d}	۴/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-c}	۰۷ ^{fg}	میاندواب	
-/۰۷ ^{dc}	۵۱/۰۷ ^{rr}	۵۳/۰۷ ^{rr}	۹/۰۷ ^{a-c}	۲/۰۷ ^{ab}	-/۰۷ ^{a-d}	-/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۱۰/۰۷ ^{ab}	۹/۰۷ ^a	۹/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{ab}	۱۱/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{ab}	۱۰/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-c}	۲۶/۰۷ ^{a-d}	۰۷ ^{fg}	کردستان	
-/۰۰ ^{cd}	۳۰/۰۷ ^g	۵۴/۰۷ ^{ij}	۹/-۸ ^{ab}	۲/۰۷ ^{ab}	-/۰۷ ^{c-c}	-/۰۷ ^{a-j}	۷/۰۷ ^{ab}	۱۱/۰۷ ^{a-c}	۸/۰۷ ^a	۸/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^{ab}	۴/۰۷ ^{ab}	۷۶/۰۷ ^{ab}	۱۰/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{a-d}	۴/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-c}	۳۱/۰۷ ^{a-d}	۰۷ ^{fg}	مریوان	
-/۰۵ ^{cd}	۲۰/۰۷ ^c	۲۰/۰۷ ^c	۷/۰۷ ^{ab}	۲/۰۷ ^{ab}	-/۰۷ ^{c-g}	-/۰۷ ^{a-h}	۷/۰۷ ^{ab}	۱۱/۰۷ ^{a-c}	۸/۰۷ ^a	۸/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^{ab}	۴/۰۷ ^{ab}	۷۶/۰۷ ^{ab}	۱۰/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{a-d}	۴/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-c}	۰۷ ^{fg}	مشهد		
-/۰۷ ^{bc}	۲۰/۰۷ ^a	۲۰/۰۷ ^a	۷/۰۷ ^{ab}	۲/۰۷ ^{ab}	-/۰۷ ^{c-g}	-/۰۷ ^{a-h}	۷/۰۷ ^{ab}	۹/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^a	۹/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^{ab}	۴/۰۷ ^{ab}	۷۶/۰۷ ^{ab}	۱۰/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{a-d}	۴/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-c}	۰۷ ^{fg}	امش		
-/۰۷ ^g	۲۶/۰۷ ^v	۳۷/۰۷ ^v	۸/۰۷ ^{ab}	۲/۰۷ ^a	-/۰۷ ^{a-i}	۵/۰۷ ^{ab-c}	۱۱/۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^a	۹/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{ab}	۵/۰۷ ^a	۵/۰۷ ^{ab}	۱۱/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{a-d}	۴/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-c}	۰۷ ^{fg}	تریت		
-/۰۷ ^{fg}	۳۵/۰۷ ⁱ	۴-۰۱۷ ^f	۹/۰۷ ^{a-c}	۲/۰۷ ^{ab}	-/۰۷ ^{a-d}	-/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۱۱/۰۷ ^{a-c}	۱-۰۷ ^{a-c}	۹/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{a-c}	۵/۰۷ ^{ab}	۵/۰۷ ^a	۵/۰۷ ^{ab}	۱۱/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{a-d}	۴/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-c}	۰۷ ^{fg}	پیرانشهر	
-/۰۷ ^{de}	۱۷/۰۷ ⁱ	۵۵/۰۷ ^j	۱۰/۰۷ ^{b-d}	۷/۰۷ ^{ab}	-/۰۷ ^{a-g}	-/۰۷ ^{a-h}	۷/۰۷ ^{ab}	۱۰/۰۷ ^a	۹/۰۷ ^{a-c}	۸/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^{ab}	۱۰/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^{ab}	۱۰/۰۷ ^{a-c}	۴/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^a	۱۰/۰۷ ^a	۴/۰۷ ^{a-c}	۰۷ ^{fg}	مریوان		
-/۱۸ ^a	۱۸۶/۰۷ ⁱ	۱۰-۰۱۰ ⁿ	۱۲/۰۷ ^{de}	۶/۰۷ ^c	-/۰۷ ^a	-/۰۷ ^{a-k}	۱۰/۰۷ ^d	۱۰/۰۷ ^{d</sup}															

جدول ۴- مقایسه میانگین صفات اکوئیپ‌های سیاهدانه (*Nigella sativa L.*) کشت شده در خلخالTable 4. Mean comparison of traits in *Nigella sativa L.* ecotypes cultivated in Khalkhal

HI	BY	GY	LW	LL	WS	DWF	DLF	NCF	NSC	WC	WD	WW	NCB	LLB	LB	LS	NF	NN	NNF	NSB	NL	HS	توده
-/۱۷ ^{lm}	۵۳/۷۵ ^f	۱۹/۵۷ ^d	۹/۳۳ ^{ab}	۱۵ ^a	-/۲۷ ^{b-c}	۷/۲۵ ^a	۷/۰۴ ^{b-c}	۷/۲۲ ^a	۷/۵۵ ^{b-c}	-/۵ ^{ab}	-/۴۲ ^{b-c}	۱/۴۸ ^a	۱/۱۶ ^a	۲/۲۵ ^a	۲/۲۵ ^{ab}	۳/۱۲ ^b	۱/۱۶ ^{b-c}	۹/۳۳ ^{ab}	۶/۷۵ ^a	۱/۱۶ ^a	۵/۳۳ ^a	۱۴/۰۸ ^a	اصفهان ^۱
-/۱۷ ^p	۶۸/۱۱ ⁱ	۲-/۹۳ ^{ab}	۸/۱۸ ^{ab}	۲-/۶۳ ^{b-c}	-/۲۵ ^{ab}	۸/۱۲ ^a	۰/۶۵ ^a	۴/۷۱ ^{b-c}	۰/۹۹ ^a	-/۲۵ ^a	-/۱۷ ^a	۱/۱۹ ^a	-/۶۵ ^{b-d}	۴/۱۶ ^{a-c}	۴/۱۶ ^{a-c}	۴/۱۶ ^{a-f}	۸/۱۸ ^{ab}	۶/۶۳ ^a	۱/۶۵ ^a	۶/۱۱ ^{a-c}	۱۶/۵۳ ^{ab}	کاشان	
-/۱۸ ^a	۱۰/۴۲۲ ⁿ	۱۰/۶۲۲ ^s	۱۳/۵۴ ^{d-g}	۷۷ ^{c-g}	-/۲۷ ^{ab}	۹/۲۵ ^a	۱۱/۱۸ ^f	۵/۹۹ ^f	۱۲/۲۵ ^c	۱/۵ ^h	۱/۲۵ ^{d-f}	۰/۲۱ ^{cd}	۳/۱۵ ⁱ	۹/۱۸ ^{b-c}	۸/۱۸ ^{de}	۶/۱۵ ^{g-j}	۱۱/۱۴ ^{h-i}	۳۰/۶۲۸ ⁱ	اردبیل ^۱				
-/۱۸ ^c	۸-/۵۳ ^l	۶۷/۰۳ ^{a-f}	۱۱/۱۵ ^{a-f}	۲۷/۱۰ ^{a-g}	-/۲۹ ^{b-c}	۸/۱۳ ^a	۶/۹۳ ^{a-c}	۰/۵ ^b	۷/۹۹ ^{b-d}	-/۵۴ ^{a-d}	-/۳۱ ^{ab}	۱/۲۵ ^a	۲/۱۴ ^{c-i}	۱/۲۴ ^a	۰/۵ ^{ig}	۱/۱۸ ^{b-f}	۶/۷۵ ^a	۲/۱۸ ^{f-g}	۶/۸۳ ^{a-d}	۱۸/۹۲ ^{a-c}	لرستان		
-/۱۸ ^q	۲۱-/۵۹ ^v	۶۲/۰۴ ⁱⁱ	۹/۳۳ ^a	۱۸/۱۴ ^c	-/۲۷ ^{bc}	۷/۱۰ ^a	۸/۱۶ ^{b-c}	۴/۱۰ ^{b-f}	۸/۱۰ ^{a-d}	۱/۰ ^{c-h}	-/۷۰ ^{a-c}	۰/۴۰ ^{a-d}	۱/۵۵ ^{b-d}	۴/۱۸ ^{a-d}	۳/۱۶ ^{a-c}	۱/۶۵ ^{a-f}	۹/۳۳ ^a	۷/۱۸ ^{ab}	۱/۶۵ ^{a-d}	۵/۶۵ ^{ab}	۱۶/۴۱ ^{a-c}	پیرانشهر	
-/۱۹ ^l	۸-/۹۲ ^۱	۳۰/۰۱ ^c	۸/۱۵ ^{ab}	۱۸/۱۴ ^c	-/۱۸ ^c	۷/۱۰ ^a	۷/۱۰ ^{a-c}	۳/۱۸ ^{ab}	۷/۱۰ ^{b-c}	-/۷۰ ^{a-d}	-/۶۰ ^{a-d}	۱/۱۹ ^{ab}	۱/۱۷ ^{a-d}	۲/۱۰ ^a	۰/۱۷ ^{a-f}	۸/۱۶ ^{ab}	۶/۷۵ ^a	۲/۱۸ ^{f-g}	۶/۸۳ ^{a-d}	۲۰/۰۵ ^{b-d}	اردبیل ^۲		
-/۲۸ ^۰	۷۷/۶۱ ^j	۲۵/۰۱ ^{cd}	۸/۱۳ ^a	۱۷ ^{ab}	-/۱۰ ^c	۷/۱۰ ^a	۸/۱۰ ^{b-c}	۴/۱۶ ^{a-c}	۷/۱۰ ^{b-g}	۱/۱۰ ^{c-e}	۳/۱۰ ^{a-d}	۱/۱۵ ^a	۷/۱۰ ^{a-c}	۰/۱۰ ^{a-c}	۱/۱۰ ^{a-f}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{dc}	۷/۱۰ ^{a-f}	۷/۱۰ ^a	۲۰/۰۵ ^{b-d}	کردستان		
-/۱۲ ^{cd}	۳۴/-۰ ^a	۲۷/۰۱ ^d	۸/۱۰ ^{ab}	۲۱/۱۰ ^{a-c}	-/۱۰ ^c	۸/۱۰ ^a	۸/۱۰ ^{b-c}	۴/۱۰ ^{b-e}	۸/۱۰ ^{a-e}	-/۱۰ ^{a-d}	-/۱۰ ^{a-c}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۲/۱۰ ^{a-b}	۴/۱۰ ^{a-c}	۱ ^a	۲/۱۰ ^a	۸/۱۰ ^{ab}	۱ ^a	۶/۱۰ ^{a-c}	۲۱/۱۰ ^{b-d}	زراک	
-/۱۸ ^j	۲۴/۲۳ ^c	۲۲/۲۴ ^{bc}	۱-/۱۰ ^{a-c}	۲-/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^a	۷/۱۰ ^a	۷/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^{b-e}	۸/۱۰ ^{a-d}	-/۱۰ ^{a-c}	-/۱۰ ^{a-f}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^{b-c}	۷/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۶/۱۰ ^a	۲۱/۲۱ ^{b-d}	مشهد ^۱			
-/۱۰ ^k	۱۱/۱۶ ^۰	۴۶/۰۴ ^e	۱-/۱۰ ^{a-f}	۲۱/۱۰ ^{a-f}	-/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^a	۸/۱۰ ^{b-c}	۰/۱۰ ^{d-f}	۹ ^{a-c}	-/۱۰ ^{a-c}	-/۱۰ ^{a-c}	۳ ^{ab}	۱/۱۰ ^{a-c}	۵ ^{a-d}	۴/۱۰ ^{a-c}	۴/۱۰ ^{a-c}	۱/۱۰ ^{a-f}	۶/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۸/۱۰ ^a	۲۱/۰۵ ^{b-d}	امشیش	
-/۱۸ ^j	۱-۰/۰۵ ^۰	۵۷/۰۳ ^m	۱-۰/۰۵ ^{a-c}	۲۱/۱۰ ^{a-c}	-/۱۰ ^c	۸/۱۰ ^a	۶/۱۰ ^{b-e}	۴/۱۰ ^{b-e}	۸/۱۰ ^{a-e}	-/۱۰ ^{a-d}	-/۱۰ ^{a-d}	۱/۱۰ ^a	۳/۱۰ ⁱ	۴/۱۰ ^{a-c}	۴/۱۰ ^{a-h}	۳/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۲۱/۱۰ ^{b-d}	تریت		
-/۱۷ ^{lm}	۴۷/۰۵ ^d	۲۱/۱۰ ^{ab}	۸/۱۰ ^{b-c}	۱۹/۱۰ ^{c-d}	-/۱۰ ^c	۷/۱۰ ^a	۷/۱۰ ^{a-c}	۶/۱۰ ^{b-a}	-/۱۰ ^{a-c}	-/۱۰ ^{a-c}	-/۱۰ ^{a-d}	۰/۱۰ ^{ab}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۷/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۸/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{b-d}	۱۴/۰۸ ^a	اصفهان ^۲		
-/۱۷ ^k	۹۳/۲۳ ^m	۴۰/۰۵ ^g	۱۱/۱۰ ^{a-f}	۲۱/۱۰ ^{a-f}	-/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^a	۸/۱۰ ^{b-c}	۰/۱۰ ^{d-f}	۹ ^{a-c}	-/۱۰ ^{a-c}	-/۱۰ ^{a-c}	۳ ^{ab}	۱/۱۰ ^{a-c}	۵ ^{a-d}	۴/۱۰ ^{a-c}	۴/۱۰ ^{a-c}	۱/۱۰ ^{a-f}	۶/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۸/۱۰ ^a	۲۱/۰۵ ^{b-d}	نیشابور	
-/۱۰ ^j	۱۳۵/۲۳ ^s	۷۵/-۰ ^p	۱۱/۱۰ ^{a-f}	۲۵/۱۰ ^{b-g}	-/۱۰ ^{a-c}	۸/۱۰ ^a	۸/۱۰ ^{b-e}	۰/۱۰ ^{a-e}	۸/۱۰ ^{a-e}	-/۱۰ ^{a-d}	-/۱۰ ^{a-d}	۱/۱۰ ^a	۳/۱۰ ⁱ	۴/۱۰ ^{a-c}	۴/۱۰ ^{a-h}	۳/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^{g-h}	۱/۱۰ ^{a-c}	۹/۱۰ ^{d-h}	۲۲/۰۴ ^{cd}	اخواز	
-/۱۷ ^k	۵۸/۰۲ ^g	۴۳/۰۴ ^{hi}	۱۱ ^{a-f}	۲۲/۰۴ ^{a-f}	-/۱۰ ^{b-c}	۸/۱۰ ^a	۸/۱۰ ^{b-c}	۰/۱۰ ^{d-f}	۸/۱۰ ^{a-f}	-/۱۰ ^{a-d}	-/۱۰ ^{a-d}	۰/۱۰ ^{ab}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-d}	۵/۱۰ ^{a-c}	۴/۱۰ ^{a-f}	۱/۱۰ ^a	۶/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۸/۱۰ ^a	۲۲/۰۴ ^{cd}	کاشمر	
-/۱۰ ^{fg}	۸۱/۰۴ ^l	۵۶/۰۴ ^m	۹/۱۰ ^{ab}	۲۲/۱۰ ^{a-f}	-/۱۰ ^c	۷/۱۰ ^a	۷/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^{b-g}	۷/۱۰ ^a	-/۱۰ ^{a-d}	-/۱۰ ^{a-d}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^a	۶/۱۰ ^{ab}	۶/۱۰ ^a	۲/۱۰ ^{a-c}	۸/۱۰ ^a	۲۲/۰۸ ^{cd}	بروجن	
-/۱۷ ^{lm}	۱۷۷/-۰ ^۰	۴۵/۰۴ ^{ij}	۹/۱۰ ^{ab}	۲۰-/۱۰ ^{a-c}	-/۱۰ ^b	۷/۱۰ ^{ab}	۷/۱۰ ^a	۷/۱۰ ^{b-c}	۷/۱۰ ^{a-c}	-/۱۰ ^{a-d}	-/۱۰ ^{a-d}	۰/۱۰ ^{ab}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۱/۱۰ ^{a-c}	۱/۱۰ ^{a-f}	۷/۱۰ ^{ab}	۲/۱۰ ^{a-c}	۹/۱۰ ^{cd}	۲۴/۰۴ ^{cd}	سمیرم		
-/۱۰ ^a	۶۳/۰۲ ^h	۵۰-/۰۹ ^۱	۱۱ ^{b-f}	۲۲/۰۱ ^{a-f}	-/۱۰ ^c	۸/۱۰ ^a	۸/۱۰ ^{b-c}	۰/۱۰ ^{d-f}	۸/۱۰ ^{a-e}	-/۱۰ ^{a-d}	-/۱۰ ^{a-d}	۰/۱۰ ^{ab}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-d}	۰/۱۰ ^{a-c}	۱/۱۰ ^{a-f}	۱/۱۰ ^a	۶/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۲۵/۰۴ ^{cd}	سرپوشیده		
-/۱۰ ^j	۹۴/۰۴ ^m	۳۵ ^f	۱۱/۱۰ ^{a-f}	۲۲/۱۰ ^{a-f}	-/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^a	۷/۱۰ ^a	۷/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^{b-e}	-/۱۰ ^{a-d}	-/۱۰ ^{a-d}	۰/۱۰ ^{ab}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^a	۶/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۲۵/۰۵ ^{d-g}	مشهد ^۲		
-/۱۰ ^{gh}	۳۶/۰۹ ^b	۶۲/۰۲ ⁿ	۱۱/۰۹ ^{a-f}	۲۲/۰۹ ^{a-f}	-/۱۰ ^{a-c}	۸/۱۰ ^a	۸/۱۰ ^{b-d}	۰/۱۰ ^{c-e}	۹/۱۰ ^{a-e}	-/۱۰ ^{a-d}	-/۱۰ ^{a-d}	۰/۱۰ ^{ab}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۲۵/۰۵ ^{d-g}	مریوان		
-/۱۰ ^a	۷۶/۰۸ ^k	۳۹/۰۲ ^g	۹/۱۰ ^{ab}	۲۲/۰۸ ^{a-g}	-/۱۰ ^c	۸/۱۰ ^a	۹/۱۰ ^{c-e}	۴/۱۰ ^{e-c}	۱-۰ ^{b-e}	-/۱۰ ^{b-g}	-/۱۰ ^{a-d}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۰/۱۰ ^{a-c}	۰/۱۰ ^{a-d}	۰/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۱/۱۰ ^a	۲۶/۰۴ ^{d-h}	سیزار		
-/۱۰ ^b	۴۸/۰۲ ^c	۶۷/۰۱ ^o	۱۱/۰۹ ^{a-f}	۱۹/۰۱ ^{c-d}	-/۱۰ ^{a-c}	۸/۱۰ ^a	۸/۱۰ ^{a-c}	۰/۱۰ ^{b-e}	۷/۱۰ ^a	-/۱۰ ^{a-f}	-/۱۰ ^{a-f}	۰/۱۰ ^{ab}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۲۹/۰۳ ^{c-g}	میاندواب		
-/۱۰ ^{fg}	۱۳۱/۰۹ ^r	۳۳/۰۵ ^{cf}	۱-۰/۱۰ ^{a-c}	۲۰/۰۱ ^{b-g}	-/۱۰ ^{a-b}	۸/۱۰ ^a	۸/۱۰ ^{a-c}	۰/۱۰ ^{b-f}	۹/۱۰ ^{a-f}	-/۱۰ ^{a-d}	-/۱۰ ^{a-d}	۰/۱۰ ^{ab}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۷/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۲۹/۰۱ ^{f-g}	قوین		
-/۱۰ ^{cd}	۱۳۱/۰۹ ^r	۱۰/۰۵ ^s	۱۰/۰۵ ^{c-g}	۰/۱۰ ^{b-c}	۱۱/۰۵ ^b	۱۰/۰۴ ^f	۰/۱۰ ^{a-c}	۱۱/۰۴ ^b	۱۰/۰۴ ^f	۱/۱۰ ^{a-c}	۱/۱۰ ^{a-d}	۰/۱۰ ^{f-h}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۰/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۲۹/۰۷ ^{g-i}	تاقستان		
-/۱۰ ⁱ	۱۶۹/۰۷ ^u	۱۰/۰۴ ^r	۱۵/۰۵ ^g	۲۱/۰۳ ^{fg}	-/۱۰ ^a	۹/۱۰ ^a	۱۲/۰۴ ^f	۰/۱۰ ^{a-f}	۱۲/۰۴ ^f	-/۱۰ ^{a-d}	-/۱۰ ^{a-d}	۰/۱۰ ^{f-h}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۰/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۲۱/۰۵ ^{hi}	همدان		
-/۱۰ ^{fg}	۷۷/-۰ ^j	۱۰/۰۳ ^s	۱۴/۰۲ ^{fg}	۲۲/۰۲ ^g	-/۱۰ ^{a-b}	۱۲/۰۱ ^b	۱۰/۰۹ ^{cf}	۰/۱۰ ^{a-f}	۱۱/۰۴ ^{cg}	-/۱۰ ^{a-c}	-/۱۰ ^{a-c}	۰/۱۰ ^{f-h}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۰/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۲۲/۰۳ ^j	لدگان		
-/۱۰ ^{gh}	۱۵۱/-۰ ^t	۹۵/۰۴ ^q	۱۳/۰۲ ^{c-g}	۳ ^{c-f}	-/۱۰ ^a	۹-/۰ ^a	۱۲/-۰ ^f	۰/۱۰ ^{a-b}	۱۲/۰۲ ^c	-/۱۰ ^{a-c}	-/۱۰ ^{a-c}	۰/۱۰ ^{f-h}	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۰/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^a	۱/۱۰ ^{a-c}	۲۰/۰۵ ^{g-i}	کرج		

جدول ۵- تجزیه همبستگی برای صفات موروفولوژیک اکوتیپ‌های سیاهدانه اردبیل (زیر قطر) و خلخال (بالای قطر)

Table 5. Correlation coefficients of morphological traits of Iranian *Nigella sativa* L accessions in Ardabil (above diameter) and Khalkhal (under diameter)

	HS	NL	NSB	NNF	NF	LS	LB	LLB	LL	LW	NCB	NSC	NCF	DLF	DWF	WS	WW	WD	WC	GY	BY	HI	
HS	۱	-/۸۰**	-/۵۲**	-/۶۵**	-/۴۲*	-/۸۰**	-/۶۲**	-/۶۲**	-/۷۹**	-/۷۸**	-/۵۲**	-/۷۸**	-/۷۲**	-/۷۷**	-/۶۴**	-/۲۸**	-/۶**	-/۷**	-/۷۲**	-/۷۴**	-/۰۲ns	-/۶۲**	
NL	-/۹۳**	۱	-/۵۷**	-/۷۲**	-/۴۹**	-/۸۴**	-/۸۰**	-/۸۰**	-/۸۰**	-/۷۹**	-/۵۸**	-/۷۸**	-/۷۲**	-/۷۰**	-/۵۰**	-/۲۰**	-/۱۱**	-/۸۰**	-/۱۱**	-/۷۵**	-/۳۲ns	-/۰۶**	
NSB	-/۸۵**	-/۸۵**	۱	-/۵۷**	-/۶۸**	-/۶۱**	-/۴۷*	-/۵۲**	-/۷۴**	-/۷۹**	-/۹۹**	-/۶۴**	-/۷۷**	-/۵۵**	-/۶۵**	-/۴۳*	-/۰۸**	-/۷۰**	-/۷۰**	-/۵۹**	-/۹۱**	-/۰۴**	-/۳۸*
NNF	-/۹۱**	-/۸۱**	-/۸۴**	۱	-/۴۵*	-/۶۵**	-/۶۰**	-/۶۴**	-/۶۹**	-/۷۲**	-/۵۷**	-/۵۷**	-/۵۸**	-/۵۹**	-/۶۰**	-/۵۷**	-/۶۸**	-/۷۱**	-/۷۰**	-/۶۳**	-/۷۰**	-/۴۰*	-/۱۷*
NF	-/۹۵**	-/۹۰**	-/۸۹**	-/۹۱**	۱	-/۴۳*	-/۲۱ns	-/۲۵ns	-/۵۴**	-/۵۱**	-/۵۷**	-/۵۳**	-/۴۴*	-/۳۶ns	-/۵۹**	-/۲۸**	-/۲۵ns	-/۲۷ns	-/۲۷ns	-/۴۹**	-/۵۷**	-/۱۴ns	-/۵۱**
LS	-/۴۲*	-/۵۷**	-/۵۳**	-/۴۱*	-/۴۴*	۱	-/۷۵**	-/۷۵**	-/۷۰**	-/۷۱**	-/۵۲**	-/۷۳**	-/۷۳**	-/۷۵**	-/۷۷**	-/۷۴ns	-/۷۵**	-/۷۵**	-/۷۰ns	-/۷۴**	-/۷۱**	-/۷۲ns	-/۰۷**
LB	-/۹۱**	-/۹۲**	-/۸۲**	-/۷۹**	-/۹۲**	-/۴۱*	۱	-/۹۵**	-/۶۲**	-/۶۲**	-/۴۸*	-/۶۰**	-/۵۹**	-/۵۹**	-/۵۸**	-/۴۷*	-/۴۷*	-/۷۲**	-/۷۲**	-/۰۹**	-/۲۵ns	-/۰۲ns	-/۰۲ns
LLB	-/۹۱**	-/۹۲**	-/۸۳**	-/۷۹**	-/۹۲**	-/۴۳*	-/۴۳*	۱	-/۷۳**	-/۶۵**	-/۵۵**	-/۶۴**	-/۶۴**	-/۶۹**	-/۶۹**	-/۶۳**	-/۲۸*	-/۷۷**	-/۷۷**	-/۶۳**	-/۶۳**	-/۰۱ns	-/۰۱ns
LL	-/۴۴*	-/۴۰*	-/۴۹*	-/۴۷*	-/۴۷*	-/۳۷*	-/۳۷ns	-/۲۵ns	-/۲۹ns	-/۲۹ns	-/۴۱*	-/۷۸**	-/۷۴**	-/۷۴**	-/۵۷**	-/۵۶**	-/۴۳*	-/۵۹**	-/۵۹**	-/۹۲**	-/۰۴**	-/۰۴**	-/۰۴**
LW	-/۵۷**	-/۶**	-/۴۸*	-/۵۱**	-/۵۱**	-/۳۰ns	-/۰۳ns	-/۰۴**	-/۰۴**	-/۷۵**	۱	-/۷۹**	-/۷۵**	-/۷۵**	-/۷۵**	-/۷۰**	-/۷۰**	-/۷۰**	-/۷۰**	-/۷۰**	-/۷۰**	-/۰۳ns	-/۰۳ns
NCB	-/۹۶**	-/۹۲**	-/۸۹**	-/۹۱**	-/۹۲**	-/۴۳*	-/۴۳*	-/۹۲**	-/۹۲**	-/۴۰*	-/۵۵**	۱	-/۷۵**	-/۵۹**	-/۸۱**	-/۷۴**	-/۷۱*	-/۵۹**	-/۵۹**	-/۰۹**	-/۰۹**	-/۰۹**	-/۰۴ns
NSC	-/۰۰**	-/۶۳**	-/۵۹*	-/۴۸*	-/۶۳**	-/۲۱ns	-/۶۱**	-/۶۳**	-/۶۳**	-/۱۳ns	-/۴۳*	-/۵۲**	۱	-/۶۱**	-/۶۳**	-/۱۱ns	-/۷۵**	-/۷۵**	-/۷۳**	-/۰۴**	-/۰۴**	-/۰۴**	-/۰۴**
NCF	-/۵۵**	-/۶۳**	-/۶۱*	-/۵۸**	-/۵۸**	-/۳۷ns	-/۵۴**	-/۵۴**	-/۵۰**	-/۱۵ns	-/۴۰*	-/۵۹**	-/۵۹**	-/۵۹**	-/۵۸**	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns
DLF	-/۰۴**	-/۶**	-/۵۸**	-/۵۲**	-/۷۵**	-/۲۷ns	-/۷۱**	-/۷۱**	-/۷۱**	-/۱۱ns	-/۴۳*	-/۷۲**	-/۷۲**	-/۷۲**	-/۷۰**	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns
DWF	-/۰۰**	-/۵۷**	-/۵۳**	-/۵۳**	-/۵۳**	-/۷۱**	-/۷۱**	-/۷۴**	-/۷۴**	-/۱۹ns	-/۷۸**	-/۷۸**	-/۷۸**	-/۷۸**	-/۷۸**	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns
WS	-/۰۵**	-/-۰۱**	-/-۰۲**	-/-۰۱**	-/-۰۱**	-/-۰۵ns	-/-۰۳ns	-/-۰۴**	-/-۰۴**	-/-۰۳ns	-/-۰۹**	-/-۰۸**	-/-۰۸**	-/-۰۸**	-/-۰۷**	-/-۰۷ns	-/-۰۳ns	۱	-/-۰۳ns	-/-۰۳ns	-/-۰۳ns	-/-۰۳ns	-/-۰۳ns
WW	-/۹۱**	-/۱۸**	-/۷۹**	-/۸۱**	-/۹۱**	-/۴۵*	-/۴۲*	-/۸۳**	-/۸۳**	-/۵۰**	-/۹۰**	-/۷۵**	-/۷۵**	-/۷۵**	-/۷۵**	-/۷۰**	-/۷۰**	-/۷۰**	-/۷۰**	-/۷۰**	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns
WD	-/۱۸**	-/۱۹**	-/۷۵**	-/۸۰**	-/۸۰**	-/۵۲**	-/۵۲**	-/۵۴**	-/۵۴**	-/۱۹ns	-/۷۸**	-/۷۸**	-/۷۸**	-/۷۸**	-/۷۸**	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns
WC	-/۰۵**	-/۴۷**	-/۴۳**	-/۵۱*	-/۵۱*	-/۰۵**	-/۰۳ns	-/۰۴**	-/۰۴**	-/۰۴**	-/۴۹*	-/۴۷*	-/۴۷*	-/۴۷*	-/۴۷*	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns	-/۰۳ns
GY	-/۱۶**	-/۹۲**	-/۹۲**	-/۹۰**	-/۹۱**	-/۶۰**	-/۸۳**	-/۸۳**	-/۸۳**	-/۸۰**	-/۸۱**	-/۵۷**	-/۵۷**	-/۵۷**	-/۵۷**	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns
BY	-/۱۶**	-/۸۱**	-/۷۸**	-/۷۲**	-/۷۸**	-/۵۷**	-/۵۷**	-/۵۷**	-/۵۷**	-/۰۷**	-/۲۸*	-/۲۸*	-/۲۸*	-/۲۸*	-/۲۸*	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns
HI	-/۰۰ns	-/-۰۴ns	-/-۰۵ns	-/-۰۶ns	-/-۰۶ns	-/۰۱ns	-/۰۴ns	-/۰۴ns	-/۰۴ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns	-/۰۱ns								

ارتفاع ساقه (HS)، تعداد برگ (NL)، تعداد میانگین اشتها (NSB)، تعداد گل در بوته (NNF)، طول ساقه گلدهنده (LS)، طول برگ (LB)، طول شاخه فرعی (LLB)، طول بلندترین شاخه فرعی (LW)، عرض برگ (NCF)، تعداد فولیکول در بوته (NCB)، تعداد بذر در هر برچه (DLF)، عرض فولیکول (DWF)، وزن دانه (WD)، وزن تر (WW)، وزن هر فولیکول (DW)، عملکرد بیولوژیک (GY) و شاخص برداشت (BY)، تعداد بذر در هر فولیکول (NSC).

منابع

1. Ahmad, Z., S. Hussain, M.S. Iqbal, M. Irfan, N. Rehman, A. Jamal, A. Qayyum and A. Ghafoor. 2009. Collection and characterization of germplasm of some underutilized plant species in Pakistan, New Crops and Uses: 219-233 pp.
2. Amini, M., H. Fallah Hosseini, R. Mohtashami, Z. Sadeghi and M.A. Ghamar Chehre. 2011. Effect of seed oil (*Nigella sativa* L.) on the blood lipid level of healthy volunteers – a double acting clinical trial. Article of Medicinal Plants, 10(4): 133-138 (In Persian).
3. Asadi, B., SH. Vaeazi and A. Fathi Haftshjani. 2015. Genetic diversity and classification of Chitti Bean genotypes using multivariate analysis methods. Seed and Plant Improvement Journal, 4(1): 641-652 (In Persian).
4. Bahrami Najad, S. and A. Papzan. 2006. Effect of row spacing on different characteristics of black cumin (*Nigella sativa* L.) under Kermanshah conditions. Iranian Journal of Crop Sciences, 8(3): 241-249 (In Persian).
5. Antuono, L.F., A. Moretti and A.F.S. Lovato .2002. Seed yield, yield components, oil content and essential oil content and composition of *Nigella sativa* L. and *Nigella damascena*. Industrial Crops and Products, 15: 59-69.
6. Fanaei, H.R., H. Akbari Moghadam, G.A. Keigha, M. Ghaffarie and A. Alli. 2005. Evaluation of agronomy and essential oil components of *Cuminum cyminum* L., *Foeniculum vulgar* Mill. And *Nigella sativa* L. in the condition of Sistan region. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 22(1): 34-41 (In Persian).
7. Faravani, M., A.R. Razavi and M. Farsi. 2006. Study of variation in some agronomic and anatomic characters of *Nigella sativa* landraces in Khorasan. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 22(3): 193-197 (In Persian).
8. Hoseinpanahi, S., M. Majdi and Gh. Mirzaghameri. 2016. Effects of growth regulators on in vitro calllogenesis and regeneration of black cumin (*Nigella sativa* L.). Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 24(2): 233-242 (In Persian).
9. Ilcim, A., G. Kokdil, G. Ozbilgin and C. Uygun. 2006. Morphology and stem anatomy of some species of *Nigella sativa* L. in Turkey. Journal of Faculty of Pharmacy, Ankara, 35(1): 19-41.
10. Kheirodin, H. and KH. GHazvinian. 2011. Medicinal and aromatic plants, attributes and applications 1, Semnan, Iran, Samangan, 250 pp.
11. Norozpoor, G. and P. Rezvani Moghaddam. 2006. Effect of different irrigation intervals and plant density on oil yield and essences percentage of black cumin (*Nigella sativa* L.). Pajouhesh & Sazandegi, 73: 133-138 (In Persian).
12. Salamat, M.S. and H. Zeinali. 2011. Evaluation of genetic diversity of some *Nigella sativa* L. genotypes using agro-morphological characteristics. Iranian Journal of medicinal and Aromatic Plants, 29(1): 201-204 (In Persian).
13. Salehi, M. and Gh. Saeidi. 2011. Genetic variation of some agronomic traits and yield component in breeding lines of sesame. Journal of Crop Breeding, 4(9): 77-92 (In Persian).
14. Sharifi, P., H. Astereki and M.R. Safari Motlagh. 2014. Evaluation of genotype, environment and genotype × environment interaction effects on some of important quantitative traits of Faba Bean (*Vicia faba* L.), Journal of Crop Breeding, 6(13): 73-88 (In Persian).
15. Smith, D. 1970. Influence of temperature on the yield and chemical composition of five forage legume species. Agronomy Journal, 62: 520-525.
16. William, R.O. 2002. Introduced forage for south and south central Texas. Texas Agricultural Extension Service. <http://www.stephenville.tamu.edu/butter/forage/soft establishment/introduced forage>.
17. Yousefi Azarkhanian, M., A. Asghari, J. Ahmadi and A.A. Jafari. 2016. Investigation of morphological variation among some *Salvia* L. species and ecotypes by multivariate statistical analysis, Journal of Crop Breeding, 8(20): 133-141 (In Persian).

Evaluation of Genotype and Environment Effects on Agro-Morphological Traits in Black Cumin (*Nigella Sativa L.*) Ecotypes

Mehdi Mohebodini¹, Narges Mehri² and Roghayeh Fathi²

1- Associate Professor, Department of Horticultural science, University of Mohaghegh Ardabili,
(Coressponding Author: Mohebodini@uma.ac.ir)

2- M.Sc. Student department of horticultural science, University of Mohaghegh Ardabili
Received: January 8, 2018 Accepted: November 10, 2018

Abstract

Black cumin (*Nigella sativa L.*) is one of the medicinal plants of Ranunculaceae family. Its seeds are containing oils, proteins, alkaloids (such as nigellicine and nigellidine), quinines (such as thymoquinone), sapiens and essential oil. Genetic diversity is important in breeding programs, so that selection depends on the existence of genetic diversity in traits. Therefore, an investigation was carried out to select the most successful Black cumin ecotype (s) and to assess the genetic diversity according to the morphological and agronomical traits in some of black cumin ecotypes at two locations based on randomized complete block design with 4 replications (in the research filed of Mohaghegh Ardabili University and Khalkhal city). The results of analysis of variance showed significant differences among studied traits in both locations, which indicates the existance of genetic variation between ecotypes and the difference in location effect on yield and morphological traits of black cumin ecotypes. According to the results of correlation analysis, it can be concluded that the biological yield, leaf number, number of stem branches and number of flowers and follicle were the most important and effective traits affecting yield and considering that among genotypes, the biggest diversity were observed for these traits, therefore, selecting and breeding for these traits can ideally improve the grain yield. Comparison of means of grain yield showed that Karaj, Ardabil 1, Takestan, Hamadan, Lordegan ecotypes were superior to other ecotypes in both locations.

Keywords: *Nigella sativa L.*, Genetic Diversity, Seed Yield, Correlation Analysis