

## "Research Paper"

### Evaluation of Some Durum Wheat Genotypes Using Phenomorphological and Agronomic Traits

Musa Ghassemzadeh<sup>1</sup>, Alireza Pourmohammad<sup>2</sup>, Asghar Aliloo<sup>3</sup> and Kamal Shahbazi<sup>4</sup>

1- Former MSc Student of Plant Breeding, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran

2- Assistant Professor of Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran, (Corresponding author: pourmohammad@ymail.com)

3- Associate Professor of Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran

4- Instructor, Field and Horticultural Crops Sciences Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Moghan, Iran

Received: 26 December, 2021 Accepted: 13 November, 2022

#### Extended Abstract

**Introduction and Objective:** The main usage of durum wheat is the production of semolina (pasta flour) for pasta products due to its high protein and strong glutamine. The development of the pasta industry, along with the increase in its demand and the favorable weather conditions in many parts of Iran, requires more research, especially in the field of durum wheat breeding with knowledge of the genetic diversity of the studied genotypes.

**Material and methods:** The plant material used in this experiment included 18 winter durum wheat genotypes that were evaluated in dryland conditions in a randomized complete block design with four replications at Moghan Dryland Agricultural Research Station located in Pars-Abad of Ardabil province. The 32 phenomorphological and agronomic traits were measured in laboratory and field.

**Results:** The difference between the studied genotypes was significant for most of the traits. Mean comparison of traits for durum wheat genotypes in important traits such as total grain yield, total biomass, yield of fertile tillers, weight of main spike, number of leaves, length of spike and length of peduncle, introduced two genotypes as prior genotypes. Total grain yield had a significant positive correlation with some traits such as main spike weight, number of spikelets, number of grains per spike, number of grains in fertile tillers, yield of fertile tillers and awn weight. Cluster analysis classified 18 durum wheat genotypes to three groups. The first cluster included seven genotypes, the second cluster contained three genotypes, and finally the third cluster included eight genotypes. The third cluster in terms of plant height, spike length, peduncle length, number of leaves, stem diameter, number of fertile tillers, weight of single plant, weight of main spike, number of spikelets, number of grains per spike, number of grains per fertile tiller, fertile tiller yield, awn length, awn weight, straw yield, flag leaf length, flag leaf width, total grain yield, total biomass and total straw yield were higher than average. Therefore, the genotypes of this group can be used to improve grain yield. In principal component analysis, the first three components explained for 68.28% of the total variation. For the first component, single plant weight, spike weight, fertile tiller yield, straw yield, total grain yield and total biomass had high positive coefficients. According to the analysis of the main components, the first component, grain yield component, the second component, maturity-related traits and the third component, leaf-related traits were named. These components can be used in the selection of durum wheat genotypes in breeding programs.

**Conclusion:** Among durum wheat genotypes in terms of studied traits, considerable diversity was found, and this diversity can be used in breeding programs for resistance to biotic and abiotic stresses and other breeding purposes.

**Keywords:** Cluster Analysis, Genetiv Diversity, Grain Yield, Principal Components Analysis



## "مقاله پژوهشی"

## ارزیابی برخی ژنوتیپ‌های گندم دوروم براساس صفات فنومورفولوژیکی و زراعی

موسی قاسم‌زاده<sup>۱</sup>، علیرضا پورمحمد<sup>۲</sup>، علی اصغر علیلو<sup>۳</sup> و کمال شهبازی<sup>۴</sup><sup>۱</sup>- کارشناسی ارشد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه<sup>۲</sup>- استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، (نویسنده مسوول: pourmohammad@yahoo.com)<sup>۳</sup>- دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه<sup>۴</sup>- مربی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، مغان، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۵ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۸/۲۲

صفحه: ۵۰ تا ۶۱

## چکیده مبسوط

**مقدمه و هدف:** کاربرد اصلی گندم دوروم در تولید سمولینا (آرد ماکارونی) به واسطه پروتئین زیاد و گلوآمین قوی، برای تولیدات ماکارونی می‌باشد. توسعه صنعت ماکارونی به همراه افزایش تقاضا برای آن و مساعد بودن شرایط آب و هوایی در بسیاری از نقاط ایران، مستلزم پژوهش‌های بیشتر، به‌ویژه در زمینه به‌نژادی گندم دوروم با آگاهی از تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مورد بررسی است.

**مواد و روش‌ها:** مواد گیاهی مورد استفاده در این آزمایش شامل ۱۸ ژنوتیپ پاییزه گندم دوروم بود که در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مغان واقع در شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل در شرایط دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد ۳۲ صفت فنومورفولوژیکی و زراعی در آزمایشگاه و مزرعه اندازه‌گیری شدند.

**یافته‌ها:** اختلاف بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه برای اکثر صفات معنی‌دار بود. مقایسه میانگین صفات برای ژنوتیپ‌های گندم دوروم در صفات مهم نظیر عملکرد کل دانه، بیوماس کل، عملکرد پنجه‌های بارور، وزن سنبله اصلی، تعداد برگ، طول سنبله و طول پدانکل، دو ژنوتیپ را به‌عنوان ژنوتیپ‌های برتر معرفی نمود. عملکرد کل دانه با برخی صفات نظیر وزن سنبله اصلی، تعداد سنبلچه، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در پنجه بارور، عملکرد پنجه‌های بارور و وزن ریشک همبستگی مثبت معنی‌داری داشت. تجزیه خوشه‌ای، ۱۸ ژنوتیپ گندم دوروم را به سه گروه منتسب کرد. خوشه اول شامل هفت ژنوتیپ، خوشه دوم دارای سه ژنوتیپ و در نهایت خوشه سوم نیز در برگیرنده هشت ژنوتیپ بود. خوشه سوم از لحاظ صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، طول پدانکل، تعداد برگ، قطر ساقه، تعداد پنجه بارور، وزن تک بوته، وزن سنبله اصلی، تعداد سنبلچه، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در پنجه بارور، عملکرد پنجه‌های بارور، طول ریشک، وزن ریشک، عملکرد کاه، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، عملکرد کل دانه، بیوماس کل و عملکرد کاه کل، ارزش بالاتر از میانگین داشت. بنابراین ژنوتیپ‌های این گروه را می‌توان برای بهبود عملکرد دانه مورد استفاده قرار داد. در تجزیه به مولفه‌های اصلی، سه مولفه اول ۶۸/۲۸ درصد از تنوع کل را توجیه کردند. برای مولفه اول وزن تک بوته، وزن سنبله، عملکرد پنجه‌های بارور، عملکرد کاه، عملکرد کل دانه و بیوماس کل کرت دارای ضرایب مثبت بالا بودند. با توجه به تجزیه به مولفه‌های اصلی، مولفه اول، مولفه عملکرد دانه، مولفه دوم، صفات مربوط به رسیدگی و مولفه سوم، صفات مربوط به پر برگی نام‌گذاری شد. از این مولفه‌ها می‌توان در امر گزینش برای ژنوتیپ‌های گندم دوروم در برنامه‌های به‌نژادی استفاده کرد.

**نتیجه‌گیری:** بین ژنوتیپ‌های گندم دوروم از لحاظ صفات مورد بررسی، تنوع قابل ملاحظه‌ای یافت شد که از این تنوع می‌توان در برنامه‌های به‌نژادی برای مقاومت به تنش‌های زیستی و غیرزیستی و سایر اهداف اصلاحی استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: تجزیه خوشه‌ای، تجزیه به مولفه‌های اصلی، تنوع ژنتیکی، عملکرد دانه

## مقدمه

گندم می‌باشد. مهمترین محصول گندم دوروم، سمولینا است که معمولا برای ساختن ماکارونی، بلغور و نان مصرف می‌شود. گندم دوروم با داشتن درصد بالای پروتئین (۱۲ تا ۱۴٪) در مقایسه با برنج (۷٪) و گندم نان (۱۰ تا ۱۲٪) از جمله مهمترین موادغذایی است. هر قدر دانه گندم دوروم درشت‌تر و شیشه‌ای‌تر باشد میزان سمولینای حاصل از آن، بیشتر از ارقام دانه‌ریز و شیشه‌ای خواهد بود. رنگ زرد در ماکارونی مطلوبتر است که آن هم به رنگ سمولینا بستگی دارد. کیفیت ماکارونی بهترین صفت آن بوده که در زمان بعد از پخت ارزیابی می‌شود (۳). توسعه صنعت ماکارونی به‌همراه افزایش تقاضا برای مصرف آن و مساعد بودن شرایط آب و هوایی در بیشتر مناطق کشور، پژوهش‌های بیشتری را به‌ویژه در زمینه به‌نژادی گندم دوروم طلب می‌نماید. نتایج بررسی انجام شده در مزارع زارعین استان کرمانشاه نشان داده است که به‌طور کلی عملکرد رقم سرداری (توده بومی گندم نان) در مقایسه با لاین‌های اصلاحی و پیشرفته گندم دوروم بسیار پایین است (۱۸).

جارادات (۱۰) تنوع ۱۸ صفت مورفولوژیک وابسته به عملکرد را در بین ژنوتیپ‌های بومی گندم دوروم عمان مورد بررسی قرار داد. وی با استفاده از تجزیه خوشه‌ای نشان داد

گندم دوروم (*Triticum durum*) پس از گندم نان، مهمترین گونه جنس تریتیوکوم است. از آنجایی که آرد گندم دوروم دارای مقادیر پایینی از گلوآمین است، برای مصارف نانوائی مناسب نمی‌باشد. اما در عوض دانه‌های سخت و شفاف این گندم در تهیه ماکارونی، اسپاگتی و سایر مصارف کاربرد دارد (۱۲). در برخی از منابع، مبداء و پیدایش گندم دوروم، نواحی غربی ایران معرفی شده است (۲). دمای زیاد بهاره یا تابستانه و رطوبت کم، موجب بهبود کیفیت دانه گندم دوروم می‌شود که منطقه مرکزی ایران از این ویژگی برخوردار است (۱۴). هر گونه اقدام اصلاحی گندم دوروم، بستگی به موجودیت و دستیابی به ذخایر توارثی آن، به‌ویژه در مرکز تنوع یا منشاء آن در هلال حاصلخیز دارد، که ایران بخش قابل توجهی از این هلال حاصل خیز را تشکیل می‌دهد. از این رو بررسی تنوع ژنتیکی موجود در ژرم پلاسما گندم دوروم از نظر ویژگی‌های زراعی، به‌ویژه عملکرد دانه و اجزای آن برای شناسایی ژنوتیپ‌های با پتانسیل مطلوب، که به‌عنوان والد در طرح‌های به‌نژادی به کار می‌روند، حائز اهمیت می‌باشد (۵). در گندم دوروم، مقدار پروتئین و گلوآمین و همچنین کربوهیدرات‌های ساده آن بیشتر از سایر واریته‌های

بود که حاکی از وجود پتانسیل مناسب در توده‌های بومی گندم دوروم برای کشت در مناطق سرد سیر دیم است (۲۴). جیبیهو و همکاران (۷) همبستگی مثبت بین وزن هزار دانه با عملکرد دانه را در گندم دوروم گزارش کردند. همچنین گریگناک و همکاران (۸) و جیبیهو و همکاران (۷) همبستگی مثبت بالایی را بین تعداد دانه با عملکرد دانه در گندم دوروم گزارش نمودند. بین صفات طول پدانکل، ارتفاع گیاه، طول سنبله و طول ریشک با صفت میانگین عملکرد بوته هیچ‌گونه همبستگی مشاهده نشد. میرآخوری (۱۶) با انجام رگرسیون گام به گام گزارش نمود که به ترتیب صفات عملکرد سنبله، تعداد سنبله در بوته تعداد برگ در بوته، تعداد پنجه، تعداد سنبلچه عقیم و طول پدانکل به‌ترتیب بیشترین رابطه را با عملکرد کل دارند.

هدف این بررسی، ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم دوروم، خوشه‌بندی ژنوتیپ‌های گندم دوروم و تعیین بهترین خوشه، کاهش تعدد صفات اندازه‌گیری شده با تعیین چند مولفه محدود با استفاده از تجزیه به مولفه‌های اصلی بود.

### مواد و روش‌ها

مواد گیاهی مورد استفاده در این آزمایش شامل ۱۸ ژنوتیپ پاییزه گندم دوروم بود که از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان اردبیل (پارس‌آباد مغان) تهیه گردید. ژنوتیپ‌های مورد استفاده (جدول ۱)، لاین‌های خالص به‌همراه رقم دهدشت بودند که در اکثر مناطق کشور، قابلیت کشت دارند. ژنوتیپ‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مغان واقع در شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل در شرایط دیم به‌مدت یک سال زراعی (۹۵-۹۶) مورد ارزیابی قرار گرفت. ابعاد واحدهای آزمایشی شامل ۶ خط به طول ۶ متر و با فاصله ۱۵ سانتی‌متر بود. میزان بذر مصرفی بر اساس تراکم ۳۰۰ دانه در متر مربع بود. قطعه زمین محل اجرای آزمایش در سال قبل به‌صورت آیش بوده و عملیات تهیه بستر مطابق دستورالعمل فنی موسسه دیم بود و هیچ گونه کودی مصرف نشد. به‌منظور جلوگیری از خسارت بیماری‌های بذرزاد، بذور قبل از کشت با استفاده از قارچ‌کش ویتاواکس ضدعفونی شدند.

مقدار تنوع فنوتیپی در بین توده‌های مورد مطالعه در مقایسه با تنوع موجود در کلکسیون گندم دوروم زیاد است. مطالعه تنوع ژنتیکی در راستای مدیریت منابع ژنتیکی به‌عنوان اجزاء مهم پروژه‌های اصلاح نباتات و استفاده در برنامه‌های به‌نژادی گندم از اهمیت زیادی برخوردار است، به‌ویژه در شرایط کنونی که برای بسیاری از صفات مهم و اقتصادی مانند عملکرد و مقاومت به تنش‌های زیستی و غیرزیستی تنوع ژنتیکی بسیار محدود شده است. برای بهره‌گیری از این تنوع، معمولاً کار با بررسی میزان تنوع ژنتیکی برای صفت یا صفات مورد اصلاح درون یا بین ارقام بومی و ژرم پلاسِم موجود آغاز می‌شود (۱۹). بهبود محصول از طریق استفاده از تنوع ژنتیکی، کلید موفقیت برنامه‌های اصلاحی است (۲۱). دلایل زیادی برای نیاز به ارزیابی صحیح تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌های گیاهی وجود دارد. از این دلایل می‌توان به تجزیه تغییرپذیری ژنتیکی در ژنوتیپ‌ها، توزیع و نگهداری ژرم پلاسِم (۲۷) و انتخاب صحیح والد‌های برتر برای تلاقی‌ها (۲۵) اشاره کرد. ژیاو و پی (۲۶)، در آزمایشی روی ۳۹ رقم گندم زمستانه، ۱۰ صفت کمی را مطالعه و با استفاده از تجزیه به عامل‌ها توانستند تنوع داده‌ها را به پنج عامل اصلی کاهش دهند. آنها عامل اول را ارتفاع بوته و عامل دوم را تعداد دانه در سنبله اصلی نامیدند. فانگ و همکاران (۴) بر اساس تعدادی از صفات مورفولوژیک شامل تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه‌ای یک سنبله، ۱۲۰ واریته گندم دوروم را توسط تجزیه خوشه‌ای به ۵ گروه تقسیم کردند که خوشه اول با ۲۰ واریته از لحاظ صفات مورد بررسی به‌عنوان بهترین خوشه انتخاب گردید. فراهانی و ارزانی (۵) در مطالعه تنوع ژنتیکی هیبریدهای گندم دوروم، ژنوتیپ‌ها را بر مبنای خصوصیات زراعی و مورفولوژیک، به هشت گروه تفکیک نمودند که گروه چهارم با شش رقم از لحاظ عملکرد دانه به‌عنوان بهترین گروه انتخاب شد.

نتایج یک بررسی بر روی سه توده بومی گندم دوروم کشور (گردیش، زردک و چهل‌دانه) در منطقه سردسیر دیم مراغه نشان داد که از نظر صفات زراعی و عملکرد دانه تنوع قابل ملاحظه‌ای بین لاین‌های مشتق شده از هر توده وجود داشته و این امر خصوصاً در زمینه تحمل به سرما نیز مشهود

## جدول ۱- شجره ژنوتیپ‌های گندم دوروم مورد استفاده در آزمایش

Table 1. The pedigree of durum wheat genotypes used in experiment

| شماره ژنوتیپ    | شجره ژنوتیپ                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotype number | Genotype pedigree                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1               | Dehdash                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2               | ALTAR84/STINT//SILVER_45/3/LLARETAINIACDSS99 Y00376S-0M-0Y-13Y-0M-0Y-2M-0Y                                                                                                                                                                         |
| 3               | SIMETO/3/SORA/2*PLATA_12//SRN_3/NIGRIS_4/5/TOSKA_26/RASCON_37//SNITAN/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANEL O_9.1CDSS06B00488T-099Y-099M-11Y-0M-04Y-0B                                                                                                  |
| 4               | BCRIS/BICUM//LLARETA INIA/3/DUKEM_12/2*RASCON_21/5/1A. 1D 5+1-06/3*MOJO//RCOL/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/ CANELO_9.1CDSS07Y00068S-099Y-099M-4Y-3M-04Y-0B                                                                                           |
| 5               | Icarasha2-ICD99-0091-T-3AP-AP-10AP-AP                                                                                                                                                                                                              |
| 6               | BELLAROI/5/1A.1D 5+1-06/3*MOJO//RCOL/4/ARMENT//SRN_3/ NIGRIS_4/3/CANELO_9.1CDSS07Y00444S-099Y-099M-8Y-2M-04Y-0B                                                                                                                                    |
| 7               | E90040/MFOWL_13//LOTAIL_6/3/PROZANA/ARLIN//MUSK_6/9/USDA595/3/D67.3/RABI//CRA/4/ALO/5/HUI/YAV_1/6/ARDEN TE/7/HUI/YAV79/8/POD_9/10/TOSKA_26/RASCON_37//SNITAN/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1CDSS06Y00497S -11Y-0M-1Y-2M-0Y                   |
| 8               | 1A.1D 5+1-06/3*MOJO//RCOL/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/ CANELO_9.1/8/ SHAG_21/DIPPER_2//PATA_2/6/ARAM_7 //CREX/ ALLA/5/ENTE/ MEXI_2//HUI/4/YAV_1/3/LD357E/2*TC60//JO69/7/ ARMENT// SRN_3/ NIGRIS_4/3/CANELO_9.1CDSS07Y00151S-099Y-099M-19Y-2M-04Y-0B |
| 9               | YAV79/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1/10/INRAM_1805/9/USDA595/3/D67.3/RABI//CRA/4/ALO/5/HUI/YAV_1/6/ ARDENTE/7/HUI/YAV79/8/POD_9CDSS05B00936D-7Y-0M-3Y-4M-0Y                                                                                 |
| 10              | JUPARE C 2001*2/IM/6/ADAMAR_15//ALBIA_1/ALTAR 84/3/ SNITAN/4/SOMAT_4/INTER_8/5/SOOTY_9/RASCON_37/7/ GUAYACAN INIA/ KUCUK/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/ CANELO_9.1CDSS07Y00533T-099Y-099M-2Y-2M-04Y-0B                                                |
| 11              | ICAMOR-TA04-1/Quabrach-1//Adnan-1ICD06-0877-0AP-4AP-0AP-5AP-0THTD -0TR                                                                                                                                                                             |
| 12              | CandocrossH25/Ysf1//CM829/CandocrossH25ICD07-497-BLMSD-0AP-0Tr-2AP-0Tr-1AP-0THT-0AP -0TR                                                                                                                                                           |
| 13              | Ossl1/Stj5/5/Bicredera1/4/BezazSHF//SD19539/Waha/3/Stj/Mrb3/6/Icajihan12 ICD07-094-BLMSD-0AP-6AP-0Tr-1AP-0THT-0AP -0TR                                                                                                                             |
| 14              | Sebatel-2//Wdz6/Gil4-ICD02-0992-C-12AP-0AP-7AP-0AP-7AP-0AP-1AP-0AP                                                                                                                                                                                 |
| 15              | Mgnl3/Ainzen-1/4/Aghrass-1/3/Mrf1/Mrb16/Ru-ICD06-1620-0AP-3AP-0AP-2AP-0THTD                                                                                                                                                                        |
| 16              | JUPARE C 2001*2/IM/6/ADAMAR_15//ALBIA_1/ALTAR 84/3/ SNITAN/4/ SOMAT_4/INTER_8/5/SOOTY_9/RASCON_37 /7/GUAYACAN INIA/ KUCUK/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/ CANELO_9.1CDSS07Y00533T-099Y-099M-2Y-2M-04Y-0B                                               |
| 17              | Icarasha2*Stj3//Bcr/Lks4/3/Ter3                                                                                                                                                                                                                    |
| 18              | Icaverve*Azeghar1/4/IcamorTA0462/3/Maamouri3//Vitron/Bidra1/5/Mgnl3/Ainzen1                                                                                                                                                                        |

## اندازه‌گیری صفات مورد مطالعه

در این آزمایش برخی از صفات در مزرعه و برخی دیگر در آزمایشگاه و در مجموع تعداد ۳۲ صفت مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. برای صفات موفولوژیکی ۱۰ بوته در هر ژنوتیپ و هر تکرار به‌طور تصادفی انتخاب و از میانگین صفات اندازه‌گیری شده در تجزیه‌های آماری استفاده شد (۱۰ و ۱۱).

طولیل شدن ساقه (تعداد روز از تاریخ کاشت تا شروع ساقه‌روی در ۵۰ درصد بوته‌ها)، تاریخ ظهور خوشه (خروج سنبله به اندازه یک سوم از غلاف برگ انتهایی در ۵۰ درصد بوته‌ها)، گل‌دهی (به گل رفتن بیش از ۵۰ درصد بوته‌های هر کرت)، مرحله‌ی شیری شدن دانه (از آغاز شیری شدن ۵۰ درصد دانه‌ها تا شروع مرحله خمیری شدن)، مرحله‌ی خمیری شدن دانه (از شروع خمیری شدن ۵۰ درصد دانه‌ها تا شروع مرحله سفت شدن)، رسیدگی (بیش از ۵۰ درصد بوته‌های هر کرت در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک)، ارتفاع بوته (در اوایل مرحله خمیری، ارتفاع بوته‌ها از سطح خاک تا انتهای سنبله اصلی بدون در نظر گرفتن ریشک‌ها با دقت یک میلی‌متر اندازه‌گیری شدند)، طول پدانکل (فاصله گره برگ پرچم تا قاعده سنبله بر حسب سانتی‌متر)، طول سنبله (از یقه سنبله تا نوک آن بدون در نظر گرفتن ریشک‌ها)، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم (عریض‌ترین بخش برگ پرچم)، تعداد دانه در سنبله اصلی، وزن سنبله اصلی، عملکرد سنبله اصلی (توزین دانه‌های موجود در سنبله اصلی)، تعداد پنجه (شمارش تعداد پنجه در ۱۰ بوته و میانگین‌گیری برای تک بوته)، تعداد پنجه بارور (شمارش تعداد پنجه بارور در ۱۰ بوته و میانگین‌گیری برای تک بوته)، تعداد دانه در تمامی پنجه‌های بارور و میانگین‌گیری برای تک بوته)، عملکرد پنجه‌های بارور (محاسبه عملکرد پنجه‌های بارور برای تک بوته)، وزن تک‌بوته (وزن کل بخش هوایی تک بوته‌های برداشت شده)، عملکرد کاه تک بوته (بخش هوایی تک بوته، پس از جدا شدن دانه‌ها)، شاخص برداشت تک بوته، عملکرد

کل دانه (اندازه‌گیری وزن کل دانه ردیف‌های برداشت شده بر اساس گرم در متر مربع)، بیوماس کل کرت (وزن بخش هوایی هر واحد آزمایشی پس از حذف حاشیه‌ها بر حسب گرم در متر مربع)، شاخص برداشت کل، عملکرد کاه کل (بیوماس کل کرت بر حسب گرم در متر مربع)، طول ریشک (اندازه‌گیری در ۵ خوشه بارور و میانگین‌گیری برای تک بوته)، وزن ریشک (اندازه‌گیری در ۵ خوشه بارور و میانگین‌گیری برای تک بوته)، تعداد برگ هر بوته، تعداد سنبلچه در هر سنبله، قطر ساقه (اندازه‌گیری قطر ساقه مابین گره اول و دوم با دستگاه کولیس).

قبل از تجزیه واریانس، نرمال بودن داده‌ها و نیز خطاها و افزایشی بودن اثر تکرار و تیمار مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده‌ها، مقایسه میانگین با روش دانکن و مطالعه همبستگی انجام شد. به‌منظور گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها از تجزیه خوشه‌ای به روش وارد و معیار فاصله اقلیدسی با استفاده از تغییرهای استاندارد شده انجام شد. نقطه برش دندروگرام با استفاده از تجزیه تابع تشخیص تعیین گردید. برای تعیین خصوصیات هر گروه حاصل از تجزیه خوشه‌ای از نظر صفات مورد مطالعه، میانگین هر خوشه برای هر صفت و درصد انحراف آن از میانگین کل محاسبه شد. به‌منظور تعیین سهم هر صفت در تنوع کل، کاهش حجم داده‌ها و تفسیر بهتر روابط، از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA) استفاده شد. برای انجام تجزیه‌های آماری از نرم افزارهای MSTATC، SPSS و GenStat استفاده شد.

## نتایج و بحث

جدول ۲ تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی را برای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه گندم دوروم نشان می‌دهد. با توجه به این جدول، اختلاف بین ژنوتیپ‌های گندم دوروم از لحاظ صفات تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، طول ریشک، عملکرد کاه، عملکرد کاه کل، طولیل شدن ساقه، ظهور خوشه، مرحله شیری دانه، مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی معنی دار بود. این

معنی‌داری بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی در صفت ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه وجود داشت. بابایی زارج و همکاران (۱) تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های گندم را مورد بررسی قرار دادند و اختلاف معنی‌داری بین ژنوتیپ‌های گندم در صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه گزارش کردند. فراهانی و ارزانی (۵) با بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم دوروم با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره، اختلاف معنی‌داری بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی در صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه را گزارش کردند.

امر حاکی از آن است که تنوع ژنتیکی برای صفات مورد بررسی وجود دارد. جرادات (۱۱)، در بررسی ۱۳۲ ژنوتیپ بومی گندم دوروم و اندازه‌گیری صفات مرتبط با مراحل رشدی گیاه، شامل شمار روز تا ظهور خوشه، گرده افشانی، دوره پر شدن دانه، رسیدگی و عملکرد دانه، تنوع بسیار زیادی مشاهده نمود. صادق‌زاده و همکاران (۲۳) ژرم‌پلاسم گندم دوروم و ارتباط آن با برخی از صفات زراعی و عملکرد دانه در مناطق سردسیر را مورد بررسی قرار دادند و اختلاف بسیار معنی‌داری بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی در صفات ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، و عملکرد دانه را گزارش کردند. صادق‌زاده و همکاران (۲۴) با مطالعه تنوع مورفوفیزیولوژیک توده‌های بومی گندم دوروم در شرایط سردسیر مراغه به این نتیجه رسیدند که اختلاف

جدول ۲- تجزیه واریانس صفات اندازه‌گیری شده برای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه گندم دوروم

Table 2. ANOVA of measured traits for under studied durum wheat genotypes

| ارتفاع بوته<br>Plant height | طول سنبله<br>Length of spike | طول پدانکل<br>Length of peduncle | تعداد برگ<br>Number of leaf | قطر ساقه<br>Stem diameter | تعداد پنجه<br>Number of tiller | تعداد پنجه بارور<br>Number of fertile tiller | تعداد پنجه غیر بارور<br>Number of non-fertile tiller | درجه آزادی<br>df | منبع تغییرات<br>Source of variation |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 60.38*                      | 0.9671**                     | 13.79                            | 0.0812**                    | 0.1683**                  | 0.8312**                       | 0.5849**                                     | 0.2185**                                             | 3                | تکرار<br>Replication                |
| 27.81                       | 0.0747                       | 4.525                            | 0.0108                      | 0.0341                    | 0.1556**                       | 0.1445*                                      | 0.0032                                               | 17               | ژنوتیپ<br>Genotype                  |
| 20.91                       | 0.1157                       | 7.977                            | 0.0103                      | 0.0263                    | 0.0721                         | 0.0659                                       | 0.0032                                               | 51               | خطا<br>Error                        |
| 7.2                         | 6.1                          | 9.9                              | 4.7                         | 4.9                       | 13.5                           | 26.8                                         | 5.5                                                  | -                | CV (%)                              |

\*\* و \* به ترتیب معنی‌دار در سطح آماری یک و پنج درصد

\*\* , \* Probability level of significantly in 0.05 and 0.01, respectively

ادامه جدول ۲- تجزیه واریانس صفات اندازه‌گیری شده برای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه گندم دوروم

Continued Table 2. ANOVA of measured traits for under studied durum wheat genotypes

| وزن تک بوته<br>Weight of single plant | وزن سنبله اصلی<br>Weight of main spike | تعداد سنبلچه<br>Number of spikelet | تعداد دانه در سنبله<br>Number of grain per spike | تعداد دانه در پنجه بارور<br>Number of grain per fertile tiller | عملکرد سنبله<br>Yield of spike | عملکرد پنجه بارور<br>Yield of fertile tiller | وزن هزار دانه<br>1000 grains weight | درجه آزادی<br>df | منبع تغییرات<br>Source of variation |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 11.641**                              | 10.35**                                | 3.24**                             | 86.37*                                           | 161.11**                                                       | 26.98*                         | 0.3276**                                     | 10.86                               | 3                | تکرار<br>Replication                |
| 0.1495                                | 0.0451                                 | 0.7484                             | 19.20                                            | 23.22                                                          | 0.0244                         | 0.0229                                       | 15.79                               | 17               | ژنوتیپ<br>Genotype                  |
| 0.1169                                | 0.0368                                 | 0.5275                             | 22.07                                            | 25.64                                                          | 0.0269                         | 0.0238                                       | 24.22                               | 51               | خطا<br>Error                        |
| 11                                    | 10.9                                   | 5.2                                | 15                                               | 16                                                             | 12.7                           | 11.9                                         | 11.9                                | -                | CV (%)                              |

\*\* و \* به ترتیب معنی‌دار در سطح آماری یک و پنج درصد

\*\* , \* Probability level of significantly in 0.05 and 0.01, respectively

ادامه جدول ۲- تجزیه واریانس صفات اندازه‌گیری شده برای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه گندم دوروم

Continued Table 2. ANOVA of measured traits for under studied durum wheat genotypes

| طول ریشک<br>Length of awn | وزن ریشک<br>Weight of awn | عملکرد کاه<br>Straw yield | طول برگ<br>Length of flag leaf | عرض برگ<br>Width of flag leaf | شاخص برداشت<br>تک بوته<br>Harvest index per plant | عملکرد کل دانه<br>Total grain yield | بیوماس کل<br>Total biomass | درجه آزادی<br>df | منبع تغییرات<br>Source of variation |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 0.0539**                  | 0.0013                    | 0.5641**                  | 4.408*                         | 0.0172*                       | 3.323                                             | 29108**                             | 154257**                   | 3                | تکرار<br>Replication                |
| 0.7727**                  | 0.0006                    | 0.0681*                   | 1.187                          | 0.0018                        | 2.886                                             | 1628                                | 13514                      | 17               | ژنوتیپ<br>Genotype                  |
| 0.3607                    | 0.0005                    | 0.037                     | 1.455                          | 0.0032                        | 3.029                                             | 2048                                | 9985                       | 51               | خطا<br>Error                        |
| 11.9                      | 14.5                      | 10.8                      | 8.1                            | 4.4                           | 4.2                                               | 11.6                                | 10.7                       | -                | CV (%)                              |

\*\* و \* به ترتیب معنی‌دار در سطح آماری یک و پنج درصد

\*\* , \* Probability level of significantly in 0.05 and 0.01, respectively

ادامه جدول ۲- تجزیه واریانس صفات اندازه‌گیری شده برای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه گندم دوروم  
Continued Table 2. ANOVA of measured traits for under studied durum wheat genoty

| منبع تغییرات<br>Source of variation | درجه<br>آزادی<br>df | رسیدگی<br>فیزیولوژیکی<br>Physiologic<br>maturity | مرحله<br>خمیری دانه<br>Dough<br>stage | مرحله<br>شیری دانه<br>Milk<br>stage | گل‌دهی<br>Flowering<br>date | ظهور خوشه<br>Heading<br>stage | طول‌شدن<br>ساقه<br>Stem<br>elongation | عملکرد کاه<br>کل<br>Straw yield<br>per plot | شاخص<br>برداشت کل<br>Total<br>harvest<br>index |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| تکرار<br>Replication                | 3                   | 0.829                                            | 16.27                                 | 2.704                               | 0.648                       | ۰/۶۱۱*                        | 0.352                                 | 47.348**                                    | 0.0002                                         |
| ژنوتیپ<br>Genotype                  | 17                  | 9.33**                                           | 17.07                                 | 2.735*                              | 1.059                       | ۳/۲۳۲*                        | 3.458*                                | 7.269*                                      | 0.0004                                         |
| خطا<br>Error                        | 51                  | 3.505                                            | 14.27                                 | 1.4                                 | 1.638                       | ۱/۶۳۱                         | 1.950                                 | 3.940                                       | 0.0003                                         |
| CV (%)                              | —                   | 0.9                                              | 1.9                                   | 0.6                                 | 0.7                         | 0.7                           | 0.9                                   | 11                                          | 4.2                                            |

\*\* و \* به ترتیب معنی دار در سطح آماری یک درصد و پنج درصد

\*\* , \* Probability level of significantly in 0.05 and 0.01, respectively

اجزاء آن توسط جعفری حقیقی (۹) همبستگی ساده اجزاء به غیر از وزن هزار دانه با عملکرد دانه مثبت بود که در این میان تعداد سنبله در متر مربع بالاترین میزان همبستگی ساده را با عملکرد داشت.

### تجزیه به مولفه‌های اصلی بر اساس صفات زراعی

تجزیه به مولفه‌های اصلی بر اساس میانگین ۳۲ صفت در ۱۸ ژنوتیپ گندم دوروم انجام شد (جدول ۴). سه مولفه اصلی اول در مجموع ۶۸/۲۸ درصد از تنوع کل را توجیه کردند. مولفه اول ۳۳/۸۷۲ درصد و مولفه‌های دوم و سوم به ترتیب ۲۲/۴۷۹ و ۱۱/۹۲۹ درصد از تنوع کل را توجیه کردند. برای مولفه اول، وزن تک بوته، وزن سنبله، عملکرد پنجه‌های بارور، عملکرد کاه، عملکرد کل دانه و بیوماس کل کرت دارای ضرایب مثبت بالا بودند. با توجه به صفات فوق، به‌طور کلی می‌توان مولفه اول را به‌عنوان مولفه عملکرد دانه نامگذاری کرد. در مولفه دوم، صفات طول‌شدن ساقه، ظهور خوشه، گل‌دهی و پرشدن دانه دارای ضرایب مثبت بالا بودند. مولفه دوم را می‌توان صفات مربوط به رسیدگی نامگذاری کرد. در مولفه سوم، طول پدانکل، طول ریشک، طول برگ پرچم و عرض برگ پرچم ضرایب مثبت بالایی داشتند. این مولفه را می‌توان به‌عنوان شاخص پر برگی نامگذاری کرد. از این مولفه‌ها می‌توان برای انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب گندم دوروم استفاده کرد. پستی و آنیچاریکو (۲۰) با ارزیابی هفت صفت زراعی و فیزیولوژیک در چهار گروه از گندم‌های دوروم، دو مولفه اصلی را شناسایی کردند که جمعاً ۶۴ درصد از تغییرات را توجیه کرد. فراهانی و ارزانی (۶) در بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم دوروم، از تجزیه به مولفه‌های اصلی استفاده کردند. دو مولفه اول بیشترین میزان تغییرات را توجیه نمود. صفات روز تا ۵۰ درصد خوشه دهی، روز تا ۵۰ درصد گرده افشانی، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و طول سنبله در جهت مثبت و وزن هزار دانه در جهت منفی بیشترین سهم را در توجیه تنوع داشتند. در مولفه دوم بالاترین سهم در توجیه تنوع متعلق به صفات عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن دانه در خوشه، و تعداد دانه بود.

جدول ۳ مقایسه میانگین صفات اندازه‌گیری شده برای ژنوتیپ‌های گندم دوروم را نشان می‌دهد. بررسی این جدول حاکی از آن است که در صفات مهم نظیر عملکرد کل دانه، بیوماس کل، عملکرد پنجه‌های بارور، وزن سنبله اصلی، تعداد برگ، طول سنبله و طول پدانکل، ژنوتیپ‌های ۱۵ و ۱۶ به‌عنوان ژنوتیپ‌های برتر انتخاب شدند.

### همبستگی صفات مورد مطالعه

به‌منظور بررسی رابطه بین صفات مربوط به عملکرد و خصوصیات کیفی گندم دوروم در این آزمایش، همبستگی ساده بین این صفات محاسبه گردید (جدول درج نشده است). همبستگی مثبت و معنی‌داری بین ارتفاع بوته با صفات طول سنبله، طول پدانکل، قطر ساقه، وزن هزار دانه و طول برگ پرچم وجود داشت و همچنین همبستگی منفی معنی‌داری بین ارتفاع بوته با صفات طول‌شدن ساقه، ظهور خوشه، گل‌دهی و مرحله شیری شدن دانه وجود داشت. عملکرد سنبله با صفات وزن تک بوته، وزن سنبله اصلی، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در پنجه بارور، عملکرد پنجه بارور، عملکرد کل دانه، بیوماس کل کرت و عملکرد کاه کل دارای همبستگی مثبت معنی دار بود. عملکرد کل دانه با صفات وزن تک بوته، وزن سنبله اصلی، تعداد سنبله‌چه، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در پنجه بارور، عملکرد پنجه‌های بارور، عملکرد کاه، وزن ریشک، بیوماس کل کرت، عملکرد کاه کل و گل‌دهی همبستگی مثبت معنی‌داری داشت. مقدم و همکاران (۱۷) در مطالعه ژنوتیپ‌های گندم، بین صفات عملکرد دانه با تعداد دانه در سنبله اصلی، طول سنبله اصلی و شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی‌داری گزارش کردند. در مطالعه بابایی زارچ و همکاران (۱) روی ارقام گندم، ارتباط مثبتی بین صفات تعداد سنبله‌چه در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و تعداد سنبله‌چه در سنبله با عملکرد دانه وجود داشت. صادق قول مقدم و همکاران (۲۲) در مطالعه‌ای بر روی گندم گزارش کردند که بین عملکرد و صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و تعداد روز تا رسیدگی همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت. در بررسی رابطه بین عملکرد دانه و

جدول ۳- میانگین صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ‌های گندم دوروم

Table 3. The mean of studied traits in durum wheat genotypes

| صفات            | ژنوتیپ   | ارتفاع بوته (سانتی متر) | طول سنبله اصلی (سانتی متر) | طول پاناکل (سانتی متر) | تعداد برگ        | قطر ساقه (میلی متر) | تعداد پنجه         | تعداد پنجه غبر بارور     | وزن تک بوته (گرم)       | وزن سنبله اصلی (گرم)  | تعداد سنبله      | تعداد دانه در سنبله       | تعداد دانه در پنجه‌های بارور      | عملکرد سنبله (گرم)  | عملکرد پنجه‌های بارور (گرم) |
|-----------------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Characteristics | Genotype | Plant height (cm)       | Main spike length (cm)     | Panicle length (cm)    | Number of leaves | Stem diameter (mm)  | Number of spikes   | Number of fertile spikes | Single plant weight (g) | Spike weight Main (g) | Number of spikes | Number of seeds per spike | Number of seeds in fertile spikes | Yield of spikes (g) | Yield of fertile spikes (g) |
| 1               | 1.28     | 60.67                   | 5.37                       | 29.31                  | 2.15             | 3.26                | 1.95 <sup>ac</sup> | 1.02                     | 0.92 <sup>ad</sup>      | 1.74                  | 13.60            | 32.92                     | 33.27                             | 1.27                | 1.28                        |
| 2               | 1.25     | 58.42                   | 5.40                       | 28.71                  | 2.17             | 3.25                | 1.90 <sup>c</sup>  | 1.05                     | 0.82 <sup>ad</sup>      | 1.72                  | 13.62            | 31.75                     | 32.40                             | 1.23                | 1.25                        |
| 3               | 1.20     | 62.68                   | 5.33                       | 29.23                  | 2.05             | 3.26                | 1.67 <sup>c</sup>  | 1.00                     | 0.67 <sup>cd</sup>      | 1.62                  | 13.42            | 27.92                     | 27.92                             | 1.20                | 1.20                        |
| 4               | 1.36     | 59.71                   | 5.52                       | 26.39                  | 2.10             | 3.27                | 1.67 <sup>c</sup>  | 1.00                     | 0.67 <sup>cd</sup>      | 1.86                  | 14.00            | 32.40                     | 32.40                             | 1.36                | 1.36                        |
| 5               | 1.34     | 61.92                   | 5.49                       | 28.35                  | 2.20             | 3.25                | 1.67 <sup>c</sup>  | 1.02                     | 0.65 <sup>d</sup>       | 1.79                  | 13.80            | 31.45                     | 32.17                             | 1.47                | 1.34                        |
| 6               | 1.19     | 62.54                   | 5.64                       | 27.80                  | 2.07             | 3.24                | 2.07 <sup>cd</sup> | 1.00                     | 1.07 <sup>ab</sup>      | 1.59                  | 13.62            | 28.60                     | 28.10                             | 1.19                | 1.19                        |
| 7               | 1.21     | 62.06                   | 5.46                       | 26.34                  | 2.12             | 3.35                | 2.25 <sup>a</sup>  | 1.02                     | 1.22 <sup>a</sup>       | 1.61                  | 13.55            | 29.00                     | 29.40                             | 1.19                | 1.21                        |
| 8               | 1.30     | 63.14                   | 5.74                       | 27.97                  | 2.20             | 3.50                | 2.25 <sup>a</sup>  | 1.00                     | 1.25 <sup>a</sup>       | 1.78                  | 14.95            | 32.35                     | 32.52                             | 1.30                | 1.30                        |
| 9               | 1.35     | 67.56                   | 5.55                       | 29.15                  | 2.15             | 3.29                | 2.22 <sup>a</sup>  | 1.07                     | 1.15 <sup>ab</sup>      | 1.77                  | 13.80            | 29.52                     | 31.45                             | 1.29                | 1.35                        |
| 10              | 1.38     | 65.72                   | 5.66                       | 28.67                  | 2.17             | 3.34                | 2.17 <sup>ab</sup> | 1.10                     | 1.10 <sup>ac</sup>      | 1.84                  | 14.40            | 34.55                     | 34.55                             | 1.32                | 1.38                        |
| 11              | 1.29     | 62.88                   | 5.75                       | 28.73                  | 2.10             | 3.44                | 2.00 <sup>ac</sup> | 1.00                     | 1.00 <sup>ad</sup>      | 1.88                  | 14.20            | 32.90                     | 32.90                             | 1.29                | 1.29                        |
| 12              | 1.20     | 66.37                   | 5.70                       | 29.88                  | 2.17             | 3.27                | 2.17 <sup>ab</sup> | 1.02                     | 1.17 <sup>ab</sup>      | 1.64                  | 13.55            | 27.10                     | 27.55                             | 1.21                | 1.20                        |
| 13              | 1.32     | 63.88                   | 5.46                       | ۲۸۳۰                   | 2.17             | 3.36                | 1.75 <sup>ab</sup> | 1.00                     | 0.95 <sup>bd</sup>      | 1.81                  | 14.32            | 33.82                     | 33.82                             | 1.32                | 1.32                        |
| 14              | 1.20     | 64.52                   | 5.56                       | 29.20                  | 2.15             | 3.35                | 1.97 <sup>ac</sup> | 1.02                     | 0.95 <sup>bd</sup>      | 1.69                  | 13.85            | 29.85                     | 29.85                             | 1.20                | 1.20                        |
| 15              | 1.33     | 67.49                   | 5.68                       | 29.97                  | 2.15             | 3.53                | 1.92 <sup>ac</sup> | 1.02                     | 0.90 <sup>bd</sup>      | 1.81                  | 14.42            | 30.87                     | 31.45                             | 1.32                | 1.33                        |
| 16              | 1.46     | 65.79                   | 5.80                       | 28.89                  | 2.25             | 3.46                | 2.12 <sup>ac</sup> | 1.05                     | 1.07 <sup>ad</sup>      | 1.97                  | 14.00            | 32.35                     | 33.25                             | 1.42                | 1.46                        |
| 17              | 1.32     | 60.39                   | 5.60                       | 26.82                  | 2.20             | 3.30                | 2.05 <sup>ac</sup> | 1.05                     | 0.97 <sup>ad</sup>      | 1.75                  | 14.15            | 30.95                     | 31.45                             | 1.30                | 1.32                        |
| 18              | 1.33     | 61.64                   | 5.63                       | 28.47                  | 2.22             | 3.29                | 1.92 <sup>ac</sup> | 1.02                     | 0.90 <sup>ad</sup>      | 1.83                  | 14.70            | 34.25                     | 34.75                             | 1.31                | 1.33                        |
| میانگین         | 1.30     | 63.19                   | 5.35                       | 28.84                  | 2.15             | 3.73                | 1.98               | 1.02                     | 0.95                    | 1.76                  | 13.99            | 31.25                     | 31.73                             | 1.82                | 1.30                        |

در هر ستون، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، اختلاف آماری ندارند و مقادیر حداقل و حداکثر، به ترتیب با یک و دو زیرخط مشخص شده‌اند.

In each column, the means with at least one common letter have not statistical difference, and the minimum and maximum values are marked with one and two underscores, respectively.

ادامه جدول ۳- میانگین صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ‌های گندم دوروم

Continued Table 3. The mean of studied traits in durum wheat genotypes

| ژنوتیپ   | وزن دانه (گرم) | وزن ریشت (گرم)     | طول ریشت (سانتی متر) | وزن هزار دانه (گرم)    | شاخص برداشت تک بوته (درصد)  | عملکرد کل دانه (گرم در متر مربع)      | تولش کل کرت (گرم در متر مربع)     | شاخص برداشت کل (درصد)   | عملکرد کل (گرم در متر مربع)             | طول شدن ساقه (روز)     | طول خوشه (روز)      | گل‌دهی (روز)         | مرحله شیر (روز)  | مرحله خمیری (روز) | زیستگی (روز)   |
|----------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Genotype | Weight of awn  | Length of awn (cm) | Weight of awn (g)    | 1000 grains weight (g) | Harvest index per plant (%) | Total grain yield (g/m <sup>2</sup> ) | Total biomass (g/m <sup>2</sup> ) | Total harvest index (%) | Staw yield per plot (g/m <sup>2</sup> ) | Straw elongation (day) | Heading stage (day) | Flowering date (day) | Milk stage (day) | Dough stage (day) | Maturity (day) |
| 215bf    | 198.5          | 195.2a             | 185                  | 179.8ad                | 160ad                       | 17.07bd                               | 0.429                             | 898.2                   | 386.1                                   | 42.85                  | 1.33                | 15.07                | 1.66bd           | 0.171             | 9.10ab         |
| 216af    | 195.5          | 196.5a             | 184.8                | 180.8ab                | 161.2ab                     | 17.42ad                               | 0.417                             | 898.7                   | 375.9                                   | 41.81                  | 1.33                | 14.66                | 1.69bd           | 0.162             | 8.95ac         |
| 217.8ab  | 198.5          | 195ab              | 184.5                | 180.2ad                | 160.8ac                     | 15.89bd                               | 0.436                             | 839.4                   | 362.6                                   | 24.93                  | 1.35                | 14.78                | 1.51d            | 0.159             | 9.01ac         |
| 218.5a   | 199.2          | 196.5d             | 185.5                | 181.2a                 | 160.8ac                     | ۱۸/۳۱ad                               | 0.428                             | 955.5                   | 409.1                                   | 42.61                  | 1.29                | 14.03                | 1.77ad           | 0.168             | 7.89d          |
| 216.2af  | 198.8          | 195.8ab            | 184.5                | 179.8ad                | 160.2ad                     | 17.17bd                               | 0.420                             | 957.4                   | 404.55                                  | 41.85                  | 1.29                | 14.81                | 1.81ad           | 0.161             | 8.29bd         |
| 214df    | 198.2          | 194.8ac            | 184                  | 178.8bd                | 159bd                       | 16.13cd                               | 0.424                             | 841.8                   | 357.75                                  | 42.41                  | 1.31                | 15.55                | 1.59cd           | 0.150             | 8.31bd         |
| 214.2cf  | 199            | 195ab              | 184                  | 179.2ad                | 158.8cd                     | 16.99bd                               | 0.415                             | 873.7                   | 363.82                                  | 41.41                  | 1.29                | 13.43                | 1.67bd           | 0.136             | 8.01cd         |
| 213.5af  | 198.8          | 194.8ac            | 184.8                | 179.2ad                | 159bd                       | 18.96ad                               | 0.460                             | 961.6                   | 392.70                                  | 40.38                  | 1.31                | 14.28                | 1.85ac           | 0.156             | 8.26bd         |
| 215.2af  | 197.8          | 194.2bc            | 184                  | 178.5cd                | 158.5cd                     | 20.02ab                               | 0.440                             | 1009.5                  | 408.67                                  | 39.98                  | 1.33                | 14.73                | 1.95ab           | 0.170             | 8.66bd         |
| 216.8ad  | 198.2          | 196ab              | 184.5                | 180.2ab                | 160.2ad                     | 19.42ac                               | 0.415                             | 997.5                   | 408.95                                  | 41.62                  | 1.32                | 14.90                | 1.91ac           | 0.169             | 8.35bd         |
| 214df    | 197.5          | 194.8ac            | 184.2                | 178.5cd                | 159.5ad                     | 19.77ab                               | 0.406                             | 960.0                   | 389.32                                  | 40.38                  | 1.33                | 15.01                | 1.86ac           | 0.181             | 8.54bd         |
| 214df    | 197            | 194.5ac            | 183.2                | 178.2d                 | 158.2d                      | 16.80bd                               | 0.421                             | 872.4                   | 368.17                                  | 42.10                  | 1.30                | 15.56                | 1.66bd           | 0.144             | 8.66bd         |
| 214.5cf  | 198.2          | 195ab              | 184.5                | 179.5ad                | 159.2ad                     | 17.66ad                               | 0.430                             | 928.2                   | 401.10                                  | 42.86                  | 1.30                | 15.11                | 1.73ad           | 0.163             | 8.48bd         |
| 215bf    | 198            | 193c               | 183.8                | 178.2d                 | 159.5ad                     | 18.52ad                               | 0.396                             | 918.4                   | 362.77                                  | 39.09                  | 1.30                | 14.89                | 1.81ad           | 0.164             | 8.52bd         |
| 217.2ac  | 190            | 195.5ab            | 184.2                | 178.8bd                | 159.5ad                     | 18.18ad                               | 0.424                             | 945.6                   | 401.77                                  | 42.41                  | 1.33                | 15.41                | 1.78ad           | 0.160             | 9.25a          |
| 216.5ac  | 198.2          | 195.8ab            | 184.5                | 180.5ac                | 160.2ad                     | 20.75a                                | 0.412                             | 1062.9                  | 425.17                                  | 41.13                  | 1.32                | 15.39                | 2.04a            | 0.191             | 8.79bd         |
| 216af    | 197.5          | 195ab              | 184.5                | 180ad                  | 160.2ad                     | 17.91ad                               | 0.427                             | 936.1                   | 398.62                                  | 42.59                  | 1.27                | 14.37                | 1.75ad           | 0.150             | 8.69bd         |
| 213.2f   | 198.8          | 195.5ab            | 185                  | 180ad                  | 161.5d                      | 18.73ad                               | 0.416                             | 962.6                   | 400.57                                  | 41.45                  | 1.33                | 14.96                | 1.83ad           | 0.172             | 8.99ac         |
| 215.4    | 197.7          | 195.2              | 184.41               | 179.5                  | 159.8                       | 18.30                                 | 0.418                             | 934.6                   | 389.29                                  | 41.56                  | 1.31                | 14.98                | 1.57             | 0.163             | 8.26           |

در هر ستون، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، اختلاف آماری ندارند و مقادیر حداقل و حداکثر، به ترتیب با یک و دو زیرخط مشخص شده‌اند.

In each column, the means with at least one common letter have not statistical difference, and the minimum and maximum values are marked with one and two underscores, respectively.

جدول ۴- مولفه‌های اصلی و مقادیر ویژه آنها برای صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ‌های گندم دوروم

Table 4. Principal components and their eigenvalues for studied traits in durum wheat genotypes

| مولفه<br>Component | کل<br>Total | مقادیر ویژه اولیه<br>Initial eigenvalue | درصد تجمعی<br>% Cumulative |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1                  | 10.84       | 33.87                                   | 33.87                      |
| 2                  | 7.19        | 22.48                                   | 56.35                      |
| 3                  | 3.82        | 11.93                                   | 68.28                      |
| 4                  | 2.34        | 7.33                                    | 75.61                      |
| 5                  | 1.89        | 5.91                                    | 81.51                      |
| 6                  | 1.51        | 4.73                                    | 86.24                      |
| 7                  | 1.19        | 3.73                                    | 89.97                      |

جدول ۵- ضرایب صفات مورد مطالعه در مولفه‌های حاصل از تجزیه به مولفه‌های اصلی

Table 5. Coefficients of the studied traits in obtained components from PCA


| صفت<br>Trait                                                | مولفه<br>Component | 7      | 6      | 5      | 4      | 3      | 2      | 1      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ارتفاع بوته<br>Plant height                                 |                    | -0.004 | 0.033  | -0.023 | 0.217  | 0.433  | -0.739 | 0.243  |
| طول سنبله<br>Length of spike                                |                    | -0.007 | -0.011 | -0.325 | 0.056  | -0.026 | -0.600 | 0.515  |
| طول پدانکل<br>Length of peduncle                            |                    | -0.151 | 0.053  | 0.237  | -0.301 | 0.781  | -0.372 | 0.062  |
| تعداد برگ<br>No. of leaf                                    |                    | -0.390 | 0.397  | -0.063 | 0.031  | -0.125 | -0.112 | 0.649  |
| قطر ساقه<br>Stem diameter                                   |                    | 0.397  | -0.159 | -0.479 | -0.073 | 0.130  | -0.448 | 0.498  |
| تعداد پنجه<br>No. of tiller                                 |                    | 0.218  | 0.447  | 0.060  | 0.025  | -0.343 | -0.755 | 0.098  |
| تعداد پنجه بارور<br>No. of fertile tiller                   |                    | 0.037  | 0.612  | 0.518  | 0.208  | -0.006 | -0.165 | 0.433  |
| تعداد پنجه غیربارور<br>No. of non-fertile tiller            |                    | 0.211  | 0.374  | -0.016 | -0.002 | -0.347 | -0.782 | 0.041  |
| وزن تک بوته<br>Weight of single plant                       |                    | -0.034 | -0.032 | 0.130  | 0.176  | -0.010 | -0.135 | 0.961  |
| وزن سنبله<br>Weight of spike                                |                    | -0.033 | -0.160 | -0.097 | 0.001  | 0.077  | 0.140  | 0.951  |
| تعداد سنبلچه<br>No. of spikelet                             |                    | 0.129  | 0.019  | -0.527 | -0.325 | -0.136 | -0.085 | 0.657  |
| تعداد دانه در سنبله<br>No. of grain per spike               |                    | -0.043 | 0.065  | -0.149 | -0.427 | -0.155 | 0.381  | 0.755  |
| تعداد دانه در پنجه بارور<br>No. of grain per fertile tiller |                    | -0.022 | 0.190  | -0.017 | -0.328 | -0.125 | 0.302  | 0.827  |
| عملکرد سنبله<br>Spike yield                                 |                    | -0.298 | -0.140 | -0.168 | 0.289  | 0.056  | 0.288  | 0.784  |
| عملکرد پنجه‌های بارور<br>Yield of fertile tiller            |                    | -0.032 | 0.057  | -0.036 | 0.247  | 0.080  | 0.161  | 0.938  |
| وزن هزار دانه<br>1000 grains weight                         |                    | 0.042  | -0.175 | 0.060  | 0.746  | 0.356  | -0.385 | -0.075 |
| طول ریشک<br>Length of awn                                   |                    | 0.128  | 0.267  | -0.019 | -0.293 | 0.813  | -0.036 | 0.064  |
| وزن ریشک<br>Weight of awn                                   |                    | -0.038 | -0.304 | 0.312  | -0.229 | 0.284  | 0.115  | 0.758  |
| عملکرد کاه<br>Straw yield                                   |                    | -0.030 | -0.090 | 0.143  | -0.087 | -0.122 | -0.328 | 0.913  |
| طول برگ پرچم<br>Length of flag leaf                         |                    | -0.443 | 0.056  | -0.021 | -0.200 | 0.725  | -0.271 | 0.075  |
| عرض برگ پرچم<br>Width of flag leaf                          |                    | 0.362  | -0.046 | 0.354  | -0.457 | 0.620  | -0.052 | 0.059  |
| شاخص برداشت تک بوته<br>Harvest index per plant              |                    | -0.090 | 0.342  | -0.359 | 0.196  | 0.325  | 0.665  | -0.299 |
| عملکرد کل دانه<br>Total grain yield                         |                    | -0.076 | 0.056  | -0.094 | 0.240  | 0.080  | 0.173  | 0.919  |
| بیوماس کل<br>Total biomass                                  |                    | -0.014 | -0.047 | 0.104  | 0.155  | -0.035 | -0.140 | 0.968  |
| شاخص برداشت کل<br>Total harvest index                       |                    | -0.068 | 0.247  | -0.317 | 0.196  | 0.355  | 0.684  | -0.347 |
| عملکرد کاه کل<br>Total straw yield                          |                    | 0.146  | -0.123 | 0.157  | -0.022 | -0.096 | -0.349 | 0.883  |
| طولیل شدن ساقه<br>Stem elongation                           |                    | 0.081  | 0.027  | 0.225  | -0.218 | 0.106  | 0.776  | 0.282  |
| ظهور خوشه<br>Heading stage                                  |                    | 0.167  | 0.145  | 0.151  | 0.162  | 0.094  | 0.845  | 0.299  |
| گلدهی<br>Flowering                                          |                    | 0.217  | -0.068 | -0.077 | -0.165 | -0.120 | 0.803  | 0.410  |
| مرحله شیرینی<br>Milk stage                                  |                    | 0.210  | 0.273  | -0.044 | 0.148  | 0.111  | 0.776  | 0.253  |
| مرحله خمیری<br>Dough stage                                  |                    | -0.220 | -0.094 | 0.470  | -0.108 | -0.656 | 0.333  | -0.081 |
| رسیدگی<br>Maturity                                          |                    | 0.307  | -0.109 | 0.207  | 0.582  | -0.394 | 0.482  | 0.170  |

خوشه‌ها از یکدیگر، محل برش توسط تجزیه تابع تشخیص انتخاب شد که ژنوتیپ‌ها را به سه دسته تقسیم‌بندی کرد. خوشه اول شامل ژنوتیپ‌های شماره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۳ و ۱۷ بود. خوشه دوم ژنوتیپ‌های شماره ۶، ۷ و ۱۲ را در بر داشت و

**تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌های گندم دوروم**  
به‌منظور گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها از تجزیه خوشه‌ای به روش وارد و معیار فاصله اقلیدسی استفاده شد (شکل ۱). با توجه به ساختار مناسب گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها و فاصله جدا شدن

ارقام و برخی صفات مورد بررسی شباهت بیشتری داشتند. در گروه‌بندی لاین‌های پیشرفته گندم بر اساس عملکرد و اجزای آن توسط مظلومی و همکاران (۱۵)، تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه را به سه گروه مجزا از هم تفکیک نمود.

در نهایت خوشه سوم نیز در برگیرنده ژنوتیپ‌های شماره ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ بود. در مطالعه انجام یافته توسط مسعودی و همکاران (۱۳) روی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسماهای گندم با استفاده از صفات مورفولوژیک، تجزیه خوشه‌ای، دو گروه براساس دندروگرام مشخص کرد که از لحاظ شجره



شکل ۱- تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌های گندم دوروم بر اساس روش وارد  
Fig 1. Cluster analysis of durum wheat genotypes based on Ward method

شاخص برداشت کل، دارای ارزش بالاتر از میانگین کل و برای بیشتر صفات مورد مطالعه ارزش پایین‌تر از میانگین کل نشان داد. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود ژنوتیپ‌های خوشه سوم (۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸) از لحاظ صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، طول پدانکل، تعداد برگ، قطر ساقه، تعداد پنجه بارور، وزن تک بوته، وزن سنبله اصلی، تعداد سنبلچه، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در پنجه بارور، عملکرد پنجه‌های بارور، طول ریشک، وزن ریشک، عملکرد کاه، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، عملکرد کل دانه، بیوماس کل کرت و عملکرد کاه کل، ارزش بالاتر از میانگین کل و از لحاظ صفات شاخص برداشت تک بوته، شاخص برداشت کل، طولیل شدن ساقه، ظهور خوشه، تاریخ گل‌دهی، پرشدن دانه مرحله شیر، پرشدن دانه مرحله خمیری و رسیدگی ارزش پایین‌تر از میانگین کل داشتند. بنابراین ژنوتیپ‌های خوشه سوم را می‌توان برای اصلاح ژنوتیپ‌های گندم دوروم از لحاظ صفات فنومورفولوژیکی به‌منظور بهره‌گیری در اهداف اصلاحی مورد استفاده قرار داد.

از نظر انتخاب والدین، خوشه‌ای ارزشمند است که میانگین بالاتری نسبت به میانگین کل نشان بدهد. بنابراین، برای تعیین خصوصیات هر گروه، از نظر صفات مورد مطالعه، میانگین خوشه برای هر صفت و انحراف آن از میانگین کل محاسبه و در جدول ۶ نشان داده شده است. خوشه اول (شامل ژنوتیپ‌های شماره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۳ و ۱۷) برای صفات شاخص برداشت تک بوته، طولیل شدن ساقه، ظهور خوشه، تاریخ گل‌دهی، مرحله شیر شدن دانه، مرحله خمیری شدن و رسیدگی فیزیولوژیکی ارزش بالاتر از میانگین کل و برای صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، طول پدانکل، تعداد برگ، قطر ساقه، تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، تعداد پنجه غیر بارور، وزن تک بوته، وزن سنبله اصلی، تعداد سنبلچه، وزن هزار دانه، وزن ریشک، عملکرد کاه، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، بیوماس کل کرت و عملکرد کاه کل، طولیل شدن ساقه و رسیدگی فیزیولوژیکی ارزش پایین‌تر از میانگین کل داشت. خوشه دوم، شامل ژنوتیپ‌های شماره ۶، ۷ و ۱۲ برای صفات تعداد پنجه غیر بارور، وزن هزار دانه و

جدول ۶- میانگین و درصد انحراف سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه‌ای برای صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپ‌های گندم دوروم  
Table 6. Mean and deviation percent of three clusters obtained from cluster analysis for the studied traits in durum wheat genotypes

| خوشه<br>Cluster | ارتفاع بوته<br>Plant height | طول سنبله<br>Length of spike | طول پدانکل<br>Length of peduncle | تعداد برگ<br>No. of leaf | قطر ساقه<br>Stem diameter | تعداد پنجه<br>No. of tiller | تعداد پنجه بارور<br>No. of fertile tiller | تعداد پنجه غیربارور<br>No. of non-fertile tiller | وزن تک بوته<br>Weight of single plant |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1               | 61.10                       | 5.45                         | 28.16                            | 2.15                     | 3.28                      | 1.81                        | 1.02                                      | 0.78                                             | 3.05                                  |
|                 | -3.31                       | -2.17                        | -1.04                            | -0.32                    | -1.67                     | -8.89                       | -0.61                                     | -18.5                                            | -1.86                                 |
| 2               | 63.66                       | 5.60                         | 28.01                            | 2.12                     | 3.28                      | 2.16                        | 1.01                                      | 1.15                                             | 2.87                                  |
|                 | 0.74                        | 0.44                         | -1.56                            | -1.48                    | -1.46                     | 9.01                        | -1.08                                     | 20.69                                            | -7.56                                 |
| 3               | 64.84                       | 5.67                         | 28.88                            | 2.17                     | 3.40                      | 2.07                        | 1.03                                      | 1.04                                             | 3.24                                  |
|                 | 2.61                        | 1.73                         | 1.50                             | 0.83                     | 2.01                      | 4.40                        | 0.94                                      | 8.42                                             | 4.46                                  |

ادامه جدول ۶- میانگین و درصد انحراف سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه‌ای برای صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپ‌های گندم دوروم

Continued Table 6. Mean and deviation percent of three clusters obtained from cluster analysis for the studied traits in durum wheat genotypes

| خوشه<br>Cluster | وزن سنبله<br>Weight of spike | تعداد سنبله<br>No. of spikelet | تعداد دانه در سنبله<br>No. of grain per spike | تعداد دانه در پنجه<br>No. of grain per fertile tiller | عملکرد سنبله<br>Spike yield | عملکرد بارور<br>Yield of fertile tiller | وزن هزار دانه<br>1000 grains weight | طول ریشک<br>Length of awn | وزن ریشک<br>Weight of awn |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1               | 1.76                         | 13.84                          | 31.60                                         | 31.93                                                 | 1.31                        | 1.30                                    | 40.98                               | 8.63                      | 0.16                      |
|                 | -0.23                        | -1.08                          | 1.11                                          | 0.62                                                  | 1.46                        | 0.05                                    | -1.20                               | 0.06                      | -0.32                     |
| 2               | 1.61                         | 13.57                          | 28.23                                         | 28.35                                                 | 1.20                        | 1.20                                    | 42.52                               | 8.33                      | 0.14                      |
|                 | -8.34                        | -3.02                          | -9.66                                         | -10.67                                                | -7.22                       | -7.58                                   | 2.50                                | -3.46                     | -11.24                    |
| 3               | 1.82                         | 14.29                          | 32.08                                         | 32.83                                                 | 1.31                        | 1.33                                    | 41.53                               | 8.73                      | 0.17                      |
|                 | 3.33                         | 2.08                           | 2.64                                          | 3.45                                                  | 1.43                        | 2.79                                    | 0.11                                | 1.24                      | 4.76                      |

ادامه جدول ۶- میانگین و درصد انحراف سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه‌ای برای صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپ‌های گندم دوروم

Continued Table 6. Mean and deviation percent of three clusters obtained from cluster analysis for the studied traits in durum wheat genotypes

| خوشه<br>Cluster | عملکرد کاه<br>Straw yield | طول برگ پرچم<br>Length of flag leaf | عرض برگ پرچم<br>Width of flag leaf | شاخص برداشت<br>Harvest index | عملکرد کل دانه<br>Total grain yield | بیوماس کل<br>Total biomass | شاخص برداشت کل<br>Total harvest index | عملکرد کاه کل<br>Total straw yield | طول شدن ساقه<br>Stem elongation |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1               | 1.70                      | 14.69                               | 1.31                               | 42.50                        | 391.14                              | 916.25                     | 0.42                                  | 17.33                              | 160.35                          |
|                 | -3.79                     | -0.94                               | -0.35                              | 2.01                         | 0.31                                | -1.94                      | 2.06                                  | -4.17                              | 0.34                            |
| 2               | 1.64                      | 14.85                               | 1.30                               | 41.97                        | 363.25                              | 862.65                     | 0.42                                  | 16.64                              | 158.66                          |
|                 | -7.42                     | 0.11                                | -0.94                              | 0.75                         | -6.84                               | -7.68                      | 0.43                                  | -8.00                              | -0.71                           |
| 3               | 1.88                      | 14.95                               | 1.32                               | 40.80                        | 398.86                              | 977.28                     | 0.41                                  | 19.29                              | 159.75                          |
|                 | 6.10                      | 0.78                                | 0.66                               | -2.04                        | 2.29                                | 4.58                       | -1.96                                 | 6.65                               | -0.030                          |

ادامه جدول ۶- میانگین و درصد انحراف سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه‌ای برای صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپ‌های گندم دوروم  
Continued Table 6. Mean and deviation percent of three clusters obtained from cluster analysis for the studied traits in durum wheat genotypes

| رسیدگی<br>Maturity | مرحله خمیری<br>Dough stage | مرحله شیری<br>Milk stage | گلدهی<br>Flowering | ظهور خوشه<br>Heading stage | خوشه<br>Cluster            |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 216.28             | 198.60                     | 195.64                   | 184.75             | 180.17                     | 1 میانگین<br>Mean          |
| 0.38               | 0.37                       | 0.24                     | 0.18               | 0.36                       | درصد انحراف<br>% Deviation |
| 214.08             | 198.08                     | 194.75                   | 183.75             | 178.75                     | 2 میانگین<br>Mean          |
| -0.63              | 0.10                       | -0.21                    | -0.36              | -0.43                      | درصد انحراف<br>% Deviation |
| 215.25             | 197.15                     | 194.90                   | 184.37             | 179.25                     | 3 میانگین<br>Mean          |
| -0.09              | -0.36                      | -0.13                    | -0.02              | -0.15                      | درصد انحراف<br>% Deviation |

## نتیجه‌گیری کلی

سه مولفه اصلی اول مجموعاً ۶۸/۲۸ درصد از تنوع صفات را توجیه کردند که مولفه اول، مولفه عملکرد دانه، مولفه دوم صفات مربوط به رسیدگی و مولفه سوم صفات مربوط به برگ‌ی نام‌گذاری شد. از این مولفه می‌توان در امر گزینش برای ژنوتیپ‌های گندم دوروم استفاده کرد. در نهایت، بین ژنوتیپ‌های گندم دوروم از لحاظ صفات مورد بررسی، تنوع قابل ملاحظه‌ای یافت شد که از این تنوع می‌توان در برنامه‌های به‌نژادی برای مقاومت به تنش‌های زیستی و غیرزیستی و سایر اهداف اصلاحی استفاده کرد.

اختلاف بین ژنوتیپ‌های مورد مقایسه از لحاظ صفات تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، طول ریشک، عملکرد کاه، عملکرد کاه کل، طول شدن ساقه، ظهور خوشه، مرحله شیری شدن دانه و رسیدگی فیزیولوژیکی معنی‌دار بود. تجزیه خوشه‌ای، ۱۸ ژنوتیپ را در سه گروه جای داد. گروه اول شامل ژنوتیپ‌های شماره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۱۳ و ۱۷ بود. خوشه دوم ژنوتیپ‌های شماره ۶ و ۷ و ۱۲ را در بر داشت و در نهایت خوشه سوم نیز در برگرفته ژنوتیپ‌های شماره ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ بود. با توجه به تجزیه به مولفه‌های اصلی،

## منابع

- Babaei Zarch, M.J., M.H. Fotokian and S. Mahmoodi. 2014. Evaluation of genetic diversity of wheat (*Triticum aestivum* L.) genotypes traits using multivariate analysis methods for morphological. Journal of Crop Breeding, 6(14): 1-14 (In Persian).
- Damania, A., M. Selagern, M. Nikpor, N. Khaghani, A. Soltani and N. Lessani. 1993. Collecting genetic resource of wheat and barley in Iran. Plant Genetic Resource Newsletter, 98: 38-44.
- Dexter, J.E. and B.A. Marchylo. 2000. Recent trends in durum wheat milling and pasta processing: Impact on durum wheat quality requirements, Presented at the international workshop on durum wheat semolina and pasta quality, November 27, Montpellier, France.
- Fang X.W., E.H. Xiong and W. Zhu. 1996. Cluster analysis of elite wheat germplasm. Jiangsu Agriculture Science, 4: 14-16.
- Farahani, A. and A. Arzani. 2006. Genetic diversity of F<sub>1</sub> hybrid species and durum wheat genotypes using agronomic and morphological traits. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 10(4): 341-354 (In Persian).
- Farahani, Y. and A. Arzani. 2008. Investigation of genetic diversity of durum wheat genotypes using multivariate analysis. Electronic Journal of Crop Production, 1: 51-64 (In Persian).
- Gebeyhou, G., D.R. Knott and R.J. Baker. 1982. Relationships among duration of grain yield in durum wheat cultivars. Crop Science, 22: 287-290.
- Grignac, P. 1975. Relations between yield components of yield of durum wheat and certain morphological characters. In: G. T. Scarascia mugnozza (Ed.) Proceeding of the symposium on genetics and breeding of durum wheat. University of Barri, Bari. P. 285-296.
- Jafari Haghighi, B. 2009. Investigation of the relationship between grain yield and its components at the most appropriate density in wheat cultivars using path analysis. Journal of Plant Ecophysiology, 1(2): 14-25 (In Persian).
- Jaradat, A.A. 1991. a. Levels of phenotypic variation for developmental traits in landrace genotypes of durum wheat. (*Triticum turgidum* sp. *Turgidum* L.). con V. durum (Desf. Mk) from Jordan. Euphytica, 51: 265-271.
- Jaradat, A.A. 1991. b. Phenotypic divergence for morphologic and yield related traits among landrace genotypes of durum wheat from Jordan. Euphytica, 52: 155-164.
- Marshall, D.R., P. Langridge and R. Appels. 2001. Wheat breeding in new century-prefac. Australian. J. Agriculture Research, 52, 1-4.
- Masoudi, H., H. Sabouri, F. Taliey and J. Jaafarby. 2020. Genetic diversity of some wheat germplasm based on morpho-phenological traits. Journal of Crop Breeding, 12 (35): 54-68 (In Persian).

14. Matsuo, R.R. 1996. Durum wheat: its unique pasta-making properties. Pp. 169-178. W. Bushuk and V.F. Rasper (Eds.). Wheat production and Quality. Chapman and Hall, London.
15. Mazloumi, H., H. Pirdashti, A. Ahmadpour and S.J. Hosseini. 2020. Grouping of advanced wheat lines based on yield and its components. *Journal of Crop Breeding*, 12 (35): 41-53 (In Persian).
16. Mirakhori, N. 2001. Investigation of quantitative traits diversity and its relationship with yield in rainfed and irrigated conditions and determining the best drought resistance index in durum wheat. Master Thesis, Faculty of Agriculture, University of Tehran (In Persian).
17. Moghaddam, M., M. Basirat, F. Rahimzadeh Khoei and M. Shakiba. 2003. Path analysis of grain yield, its components and some morphological traits in winter wheat. *Journal of Agricultural Science*, 1, 2: 48-73 (In Persian).
18. Mohammadi, R., A. Abdollahi, M. Mohammadi, K. Elahi and H. Yari. 2016. Evaluation of yield gap of durum wheat lines and cultivars in research conditions and farmers' farms. *Scientific-Extensive Journal of Research Findings in Field and Horticulture Crops*, 5 (2): 133-141 (In Persian).
19. Mohammadi, S.A. and B.M. Prasanna. 2003. Analysis of genetic diversity in crop plants, salient statistical tools and considerations. *Crop Science*, 43: 1235-1248.
20. Pecetti, L. and P. Annicchiarico. 1988. Agronomic value and plant type of Italian durum wheat cultivars from different areas of breeding. *Euphytica*, 99: 9-15.
21. Renganayaki, K., J.C. Read and A.K. Fritz. 2001. Genetic diversity among Texas bluegrass genotypes (*Poa arachnifera* Torr.) revealed by AFLP and RAPD markers. *Theoretical and Applied Genetics*, 2: 1037-1045.
22. Sadegh Qol Moghadam, R., M. Khoda Rahmi and G. Ahmadi. 2011. Investigation of genetic diversity and factor analysis for grain yield and other morphological traits of bread wheat under drought stress. *Journal of Agronomy and Plant Breeding*, 7 (1): 133-147 (In Persian).
23. Sadeghzadeh Ahari, D. 2006. Growth type of durum wheat genotypes and its relationship with some agronomic traits and grain yield in Maragheh region. *Journal of Agricultural Science*, 16 (3): 125-134 (In Persian).
24. Sadeghzadeh Ahari, D. 2011. Investigation of genetic diversity of some agronomic traits in three local durum wheat cultivars in order to use them in breeding programs. *Journal of Research in Crop Sciences*, 3 (11): 123-143 (In Persian).
25. Tahir, N.A.R. and H.F.H. Karim. 2011. Determination of genetic relationship among some varieties of chickpea (*Cicer arietinum* L.) in Sulaimani by RAPD and ISSR markers. *Jordan Journal of Biological Sciences*, 4: 77-86.
26. Xiao, H. and X. Pei. 1991. Applying factor analysis method to study winter wheat quantity characters and varieties classification. *Acta Agriculturae Universitatis Pekinensis*, 17: 17-22.
27. Zheleva, D., E. Todorovska, N. Chirstov, P. Ivanov, I. Ivanov and I. Todorov. 2007. Assessing the genetic variation in Bulgarian bread wheat varieties by biochemical and molecular markers. *Biotechnology and Biotechnological Equipment*, 21(3): 311-321.