اثر علف كش تري فلورالين بر القاء پلي پلوئيدي و تغييرات كروموزومي سلول هاي مريستمي ريشه شنبليله (*Trigonella foenum- graecum*)

ا. افشاري[۱]، غ. ع. رنجبر[۲]، س. ک. كاظمي‌تبار[۳]، م. رياست[۴] و ح. كاظمي پشت مساري[۵]

چكيده

شنبليله (*Trigonella foenum-graecum* L.) گياهي يک ساله و علفي از خانواده بقولات مي‌باشد و به عنوان يک گياه دارويي، زراعي و مرتعي حائز اهميت فراوان است. به منظور مطالعه اثر تري فلورالين بر القاء پلي پلوئيدي و بررسي تأثير اين ماده بر خصوصيات سيتوژنتيكي سلول هاي مريستمي ريشه گياه دارويي شنبليله، تعدادي بذر در انكوباتور كشت و پس از جوانه زني بذرها، از مريستم انتهايي ريشه براي مطالعات كاريوتيپي استفاده شد. جهت تيمار كردن بذرها از محلول تري فلورالين ۴۸ درصد با غلظت‌هاي ۷/۵، ۱۵ و ۲۲/۵ ميكرومولار در دو مدت زمان ۱۲ و ۲۴ ساعت و براي بررسي خصوصيات سيتوژنتيكي از روش تحليل تصويري استفاده شد. تعداد كروموزوم پايه در گونه مورد بررسي X=۸ بود. نتايج نشان داد كه تفاوت معني داري در سطح احتمال يک درصد بين غلظت هاي تريفلورالين، مدت زمان القاء و اثر متقابل غلظت × زمان القاء در ايجاد پلي پلوئيدي وجود داشت. بيشترين درصد القاي پلي پلوئيدي، به دنبال غوطه‌وري گياهچه‌ها در غلظت ۲۲/۵ ميكرومولار در مدت زمان ۲۴ ساعت به دست آمد. تجزيه واريانس داده هاي مربوط به مشخصات كروموزوم ها در قالب طرح كاملاً تصادفي نشان دهنده اختلاف معني‌دار بين كاريوتيپ‌ها در سطح احتمال يک درصد بود. تري‌فلورالين به شدت بر طول كروموزوم و در نتيجه بر كاريوتيپ گياه اثر گذاشت، به طوري كه بلندترين كروموزوم ها متعلق به كاريوتيپ نمونه شاهد و كوتاه ترين كروموزوم ها پس از تيمار با تري فلورالين مشاهده شدند. پس از اعمال تيمار از درصد كروموزوم هاي ساب متاسانتريک كاسته و به درصد كروموزوم هاي متاسانتريک اضافه شد.

واژه هاي كليدي: كروموزوم، تغييرات سيتوژنتيكي، القاء پلي پلوئيدي، تري فلورالين، شنبليله

۱- دانش آموخته كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
۲- استاديار، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
۳- دانشيار، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
۴- مربي پژوهشي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي، شيراز
۵- عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]

مقدمه

شنبليله (*Trigonella foenum-graecum* L.)، گياهي يک ساله و علفي از خانواده بقولات مي باشد که به عنوان يک گياه دارويي، زراعي، مرتعي، آرايشي و بهداشتي حائز اهميت فراوان است. ۳۳ گونه مختلèٰ از جنس *Trigonella* در ايران گزارش شده که مهمترين آن گونه *T. foenum-graecum* است (۱۴).

برگ شنبليله حاوي عناصر و ترکيبات مهمي ŝون کلسيم، آهن، کاروتن، اسيد آسĉوربيG، پروتاين، تيامين و ريبوفلاوين و جوانه‌هاي آن سرشار از ويتامين A و فسفر هستند. از مهمترين ترکيبات شيميايي موجود در دانه شنبليله، ساپوژنين‌هاي استروئيدي به ويژه ديوسژنين است که به عنوان هسته اوليه در سنتز استروئيدهاي دارويي از جمله هورمون پروژسترون، هيدروکورتيزون، تستسترون و در قالب قر ! هاي ضد بارداري کاربرد فراوان دارد (۱۳). محققين از طريق به نژادي و ايجاد موتان‌ها و دو رگ‌هاي مختلèٰ توانسته‌اند ميزان ديوسژنين موجود در دانه را از ۱ درصد به ۳/۱ درصد برسانند (۱۴).

شنبليله در درمان بسياري از بيماريها از جمله ديابت، آترواسکلروز يا تجمع ŝربي و سفت و سخت شدن جدار شريانها، هپاتومگالي (بزرگي کبد)، اسپلتومگالي (بزرگ شدن طحال)، زخم معده، التهاب گلو و يبوست مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ŝاي شنبليله به عنوان يک ماده خونساز و آرام بخش اعصاب، استفاده فراوان دارد. پودر دانه شنبليله به علت دارا بودن تريگونلين براي درمان بيماري پارکينسون مفيد است (۱۵). با توجه به اينĞه کروموزوم‌ها حامل ژنها بوده و خصوصيات گياهي تا حدود زيادي تحت کنترل مواد ژنتيĞي هسته‌اي مي‌باشند، لذا از جمله روش‌هاي ايجاد تنوع در ارقام و گونه‌هاي مختلèٰ گياهي، القاء تغييرات سيتوژنتيکي و کاريوتيپي و ايجاد پلي پلوئيدي مي باشد. در اغلب گونه هاي گياهي، القاء پلي پلوئيدي با افزايش در اندازه سلول ها، توانايي توليد اندام هاي رويشي قويتر را بوجود آورده است. اندام هاي رويشي، منبع بسياري از متابوليت هاي ثانويه با ارزش تجاري هستند (۱). بنابراين ممکن است که القاء پلي پلوئيدي، در افزايش کميت و کيفيت اين ترکيبات با ارزش دارويي نقش مهمي داشته باشد (Đ). در مقايسه تعداد زيادي از گياهان پلي پلوئيد با همتاي ديپلوئيد شان، افزايش در توليد ترکيبات شيميايي و متابوليت هاي ثانويه مشاهده شده است، مRلاً گزارش شده است که تتراپلوئيد هاي دو گياه دارويي بابونه (*Matricaria recutita* L.) و مريم گلي (*Salvia officinalis* L.) فلاونوئيدها و ترپنوئيدهاي بيشتري را نسبت به حالت ديپلوئيد توليد مي‌کنند يا ميزان آرتميزينين در درمنه (*Artemisia sieberi* L.) در حالت تتراپلوئيد، ċċ درصد بيشتر از ديپلوئيد آن گزارش شده است (۹).

تري‌فلورالين[1] با نام تجاري ترفلان و با فرمول مولکولي $C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$ و نام شيميايي 2,6-dinitro-N,-dipropyl-4-(trifluoromethyl)benzenamine)، شبيه به کلشي‌سين مي‌باشد و با جلوگيري از تشکيل

1- Trifluralin

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]

دوک به عنوان یک عامل ضد میتوزي منجر به القاء پلي‌پلوئیدي در گیاه مي‌شود. این ماده پرمصرف‌ترین علèکش از گروه دي نیتروآنیلین‌ها[1] و یکي از مهمترین علèکش‌هاي انتخابي در گیاهان زراعي است که از طریق هیپوکوتیل جذب مي‌شود. اثر علèکش تري‌فلورالین به خاطر جلوگیري از رشد ریشه علèهاي هرز مي‌باشد که علائم آن بصورت متورم شدن نوک ریشه‌ها و ممانعت از تشکیل ریشه‌هاي جانبي و اختلال در جذب عناصر غذایي است. این امر ناشي از اختلال در تقسیم سلولي از طریق دپلیمر کردن ریزلوله ها[2] است (ğ۱ و آ۱).

مطالعات کاریوتیپي انجام شده در گونه *T. foenum-graecum* نشان مي‌دهند که تعداد کروموزوم پایه ۸ مي‌باشد (۲، ۴، ۱۱، آ۱ و ۱۸). ریاست (۱۸) اظهار داشت که فرمول کاریوتیپي *T. foenum-graecum* ۱m + ۷sm مي‌باشد. راگووانشي و پانت (آ۱) طي مطالعاتي به این نتیجه دست یافتند که سلول‌هاي سوماتیکي و میوزي گونه مذکور، داراي ۲ کروموزوم B است و عدد کروموزومي آن ۲n=۱آ+۲B مي‌باشد. لادیزینسکي و وسا (۱۱) اظهار داشتند که این گونه با عدد کروموزومي ۲n=۱آ، داراي کاریوتیپ نامتقارن و کروموزوم‌هاي آکروسانتریک است.

حس و بایر (۸) از اثر تري‌فلورالین بر تقسیم غیر طبیعي میتوز در سلول‌هاي مریستمي ریشه پنبه گزارش دادند. هانسن و آندرسن (۷) توانایي سه علèکش دپلیمرکننده ریزلوله ها، شامل تري فلورالین، اریزالین[3] و آمي پروفازمتیل[4] را بر دو برابر کردن کروموزوم‌ها طي کشت درون شیشه‌اي میکروسپور کلزا مطالعه کردند. هر سه علèکش در طول ۱۲ ساعت تیمار، تقریباً ۲آ۵ درصد دیپلوئیدي تولید کردند. هانسن و همکاران (آ) تأثیر علèکش تري فلورالین را بر دو برابر شدن کروموزوم ها در کشت درون شیشه اي تخمک šغندرقند مطالعه و بیشترین میزان دوبل شدگي کروموزوم‌ها را در غلظت ğ۱ میکرومولار مشاهده کردند. ري و همکاران (۱۷) تأثیر تري‌فلورالین و اریزالین را بر تولید گیاهان تتراپلوئید حاصل از باززایي جنین‌هاي سوماتیکي گیاه *Ilex paraguariensis* مطالعه و در نتایج خود به عدم تأثیر دو ماده مذکور در دو برابر کردن کروموزوم‌ها اشاره کردند. کلیما و همکاران (ğ۱) اثر کلشي سین، تري فلورالین و اریزالین را بر تشکیل و رشد جنین، باززایي گیاه و میزان دیپلوئید شدن هیبریدهاي F_1 حاصل از کشت میکروسپور کلزا مقایسه کردند. نتایج نشان داد که هر سه ماده به طور معني دار، درصد هاپلوئیدهاي مضاعèè را افزایش دادند و تري‌فلورالین با تولید ۸۵/۷ درصد دیپلوئیدي، مناسب‌ترین و بهترین تیمار بود.

اگرšه به طورکلي اثرات پلي پلوئیدي قابل پیش بیني نیست و بایستي هر گونه گیاهي را به طور مجزا مورد تحقیق قرار داد، اما دو برابر شدن تعداد کروموزوم‌هاي یک گیاه دارویي، منجر به ایجاد تنوع در ترکیبات آللي و آنزیم‌هاي فعال مسیر بیوسنتز متابولیت‌هاي ثانویه مي‌شود و مي‌تواند روند متابولیسم ثانویه را تسهیل و میزان متابولیت هاي ثانویه را

1- Dinitroaniline 2- Microtube 3- Oryzalin 4- Ami Prophos-methyl (APM)

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]

افزايش دهد (Ð). با وجود مطالعه و تحقيقات قابل توجه در توليد گياهان پلي پلوئيد، موارد بسيار محدودي از گياهان دارويي پلي پلوئيد گزارش شده اند (Ð). با توجه به اينكه تا كنون تأثير تري فلورالين بر خصوصيات كاريوتيپي گياه دارويي شنبليله بررسي نشده است، اين پژوهش اجراء شد. هدف از اين پژوهش مطالعه اثر تري فلورالين بر القاء پلي پلوئيدي و بررسي تأثير اين ماده بر خصوصيات سيتوژنتيكي سلول هاي مريستمي اين گياه مي باشد.

مواد و روشها

مطالعات سيتوژنتيكي گياه شنبليله در سال ۱۳۸۷ در آزمايشگاه ژنتيک مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس در شيراز انجام شد. بذر گياه از شركت پاكان بذر اصفهان تهيه شد. جهت بدست آوردن مريستم انتهايي ريشه، بذرها به ظروف پتري حاوي كاغذ صافي مرطوب منتقل و پس از افزودن آب مقطر، در انكوباتور با فتوپريود ۱۶ ساعت روشنايي و درجه حرارت ۲۴-۲۳ درجه سانتي‌گراد و رطوبت ۵۰ تا ۷۰ درصد قرار داده شدند. بعد از گذشت سه روز، بذرهاي جوانه‌زده با طول ريشه‌چه ۱/۵ تا ۲ سانتي‌متر با محلول تري‌فلورالين ۴۸ درصد با غلظت‌هاي ۷/۵، ۱۵ و ۲۲/۵ ميكرومولار به مدت ۱۲ و ۲۴ ساعت تيمار شدند. پس از شستشوي بذرهاي تيمار شده، بذرها به مدت ۲۴ ساعت در شيشه‌هاي حاوي آب مقطر روي قالب‌هاي يخ قرار داده شدند.

در مرحله بعد، جهت مشاهده و شمارش كروموزوم‌ها، تهيه كاريوتيپ و تحليل ژنوم و همچنين بررسي تغييرات كروموزومي در سلول‌هاي در حال تقسيم، به ترتيب مراحل پيش تيمار (۰/۵ درصد محلول اشباع شده آلفا برومونفتالين) به مدت ۳ ساعت، تثبيت (محلول لويتسكي مركب از محلول كروميوم تري اكسيد و فرمالدئيد ۴۰ درصد به نسبت ۲:۳) به مدت ۲۰-۱۶ ساعت در دماي ۴ درجه سانتي‌گراد، هيدروليز (هيدروكسيد سديم يک نرمال) به مدت ۲۰-۱۷ دقيقه در دماي ۶۰ درجه سانتي‌گراد و رنگ‌آميزي (مخلوط هماتوكسيلين ۴ درصد و يک گرم سولفات آمونيوم فريک) به مدت ۱۲۰ دقيقه انجام شد. براي تهيه نمونه ميكروسكوپي ريشه‌هاي رنگ‌آميزي شده روي لام گذاشته و قسمت انتهايي نوك ريشه (منطقه مريستمي) كه به دليل وجود سلول‌هاي در حال تقسيم ميتوز، رنگ غليظ‌تري به خود گرفته بودند، با استفاده از تيغ مخصوص برش داده شدند، سپس يک قطره محلول حاوي اسيدلاكتيک و اسيد استيک ۴۵ درصد روي نمونه ريخته و لامل روي آن گذاشته شد به طوري كه لامل حركت نكند. سپس با انگشت شصت روي لامل فشار وارد آورده تا ضمن خروج رنگ‌هاي اضافي سلول‌هاي مريستمي نيز در يک سطح پخش گردند. به اين ترتيب نمونه ميكروسكوپي آماده شد. عكسبرداري از نمونه‌هاي تهيه شده با استفاده از روش تحليل تصويري با بزرگنمايي ۱۸۴۴ برابر (ميكروسكوپ BH-2 Digital Color Video Camera, Olympus مدل SSC, DC18P) انجام شد به طوري كه تصاوير كروموزومي از طريق Color Video Camera كه روي ميكروسكوپ

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]

نوري نصب شده بود به مانيتور منتقل شده و ضبطn گرديد. ابتدا تصاوير تهيه شده به برنامه فتوشاp منتقل شد و پس از مرتب كردن كروموزوم‌ها روي يGصفحه و تهيه كاريوتيپ در دو مرحله، قبل و بعد از اعمال تيمار، ويژگي‌هاي كروموزومي گياه با استفاده از نرم افزار (MICROMEASURE3.3) ارزيابي شد. در اين نرم‌افزار از طريق مشخDŽ كردن ابتدا، انتها و محل سانترومر كروموزوم‌ها، يĞسري از ويژگي‌هاي كروموزومي محاسبه و در محيطn EXCEL نمايش داده مي شود. از هر اسلايد مورد بررسي حداقل پنج سلول (تĞكرار) انتخاب و تعدادي از پارامترهاي سيتوژنتيكي نظير طول كروموزوم (TL)، طول بازوي بلند (LA)، طول بازوي كوتاه (SA)، نسبت بازوها (L/S) و شاخDŽ سانترومري (CI) كه بيانگر نسبت بازوي كوتاه به طول كل كروموزوم است، محاسبه گرديد. براي تعيين نوع كروموزوم‌ها از روش لوان و همكاران (۱Č) براساس جدول ۱ استفاده شد. پس از اندازه‌گيري كروموزوم‌ها، ايديوگرام مربوط به كاريوتيپ براساس طول بازوي كوتاه و بلند رسم شد.

جهت تجزيه آماري داده‌هاي بدست آمده از ميزان پلي‌پلوئيدي ناشي از كاربرد تري‌فلورالين از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملاً تصادفي در ۴ تكرار و براي داده‌هاي مربوط به پارامترهاي كاريوتيپي از طرح كاملاً تصادفي در ۵ تكرار استفاده شد. نرم‌افزار مورد استفاده SAS بود. براي مقايسه ميانگين‌ها نيز از آزمون Šند دامنه‌اي دانĞن و نرم افزار MSTATC استفاده گرديد.


جدول ۱- دسته‌بندي كروموزوم‌هاي هر كاريوتيپ براساس روش لوان و همكاران (۱Č)

نسبت بازوها	موقعيت سانترومر	نوع كروموزوم
۱	Median point	M
۱/۱Ċ-۱/٦۹	Median region	m
۱/Ē-Č/۹۹	Submedian region	sm
۳-٦/۹۹	Subterminal region	st
Ē-۳٦/۹۹	Terminal region	t
۳Ē	Terminal point	T

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]

نتايج و بحث

مطالعات كاريوتيپي انجام شده در اين تحقيق نشان داد كه تعداد كروموزوم پايه در گونه *T. foenum- graecum* ۸ (X=۸) و عدد كروموزومي آن ۲n=2x=۱۶ مي‌باشد (شكل ۱) كه مشابه نتايج تعداد زيادي از محققين بود (۲، ۴، ۱۱، ۱۲ و ۱۸).



شكل ۱- a، b: تصاوير كروموزومي از مرحله متافاز ميتوز نمونه‌هاي شاهد در گونه *T. foenum-graecum*. (خط ۱۰ میکرون)

تيمار با تري فلورالين


تجزيه واريانس داده‌ها نشان داد كه اثر غلظت، زمان و اثر متقابل غلظت × زمان در القاء پلي‌پلوئيدي، در سطح احتمال ۱ درصد معني‌دار بود (جدول ۲). در اين آزمايش افزايش غلظت و زمان تيمار با تري‌فلورالين منجر به افزايش درصد پلي‌پلوئيدي شد به طوري كه در غلظت ۲۰/۵ ميكرومولار و مدت زمان ۲۴ ساعت، بيشترين درصد پلي پلوئيدي القاء شد (شكل ۲).

جدول ۲- خلاصه تجزيه واريانس القاء پلي‌پلوئيدي پس از تيمار با تري فلورالين

منابع تغييرات	درجه آزادي	ميانگين مربعات
غلظت	۲	۰/۰۷۳**
زمان	۱	۰/۵۷**
غلظت × زمان	۲	۰/۰۸۶**
خطاي آزمايش	۱۸	۰/۰۰۱۶
ضريب تغييرات (درصد)		۶/۸۲

**: معني‌دار در سطح احتمال ۱ درصد.

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]



شكل č- مقايسه ميانگين اثر متقابل غلظت×زمان تيمار با تري‌فلورالين بر ميانگين درصد القاء پلي‌پلوئيدي
حروف متفاوت نشان‌دهنده وجود اختلاف معني‌دار بين ميانگين‌ها است.

با توجه به شكل č مشاهده مي‌شود كه در غلظت‌هاي يكسان، با افزايش مدت زمان القاء تري‌فلورالين، افزايش درصد پلي‌پلوئيدي بسيار بيشتر از حالتي است كه در زمان‌هاي يكسان، غلظت تري‌فلورالين افزوده شده است. در اين تحقيق با افزايش غلظت و زمان القاء تيمار، درصد سلول‌هاي پلي‌پلوئيد افزايش پيدا كرد كه با گزارشات هانسن و همكاران (٦) راجع به اثر تري‌فلورالين بر دو برابر شدن كروموزوم‌هاي تخمک در šغندرقند و مطالعات عاليشاه و باقريه نجار (۳) مربوط به القاء پلي‌پلوئيدي در پنبه توسnj كلشي‌سين مطابقت داشت. بهترين تيمار جهت القاء پلي‌پلوئيدي، ĐČ/čč ميكرومولار تري‌فلورالين در مدت زمان čď ساعت بود. اين در حاليست كه هانسن و آندرسن (Ē) با افزايش مدت زمان القاء تري‌فلورالين (čď ساعت) با كاهش ميزان ديپلوئيدي ميكروسپورها مواجه شدند كه علت آنرا سميت بالاي اين ماده در غلظت‌هاي بالا يا مدت زمان طولاني القاي تيمار بيان كردند.


تغييرات كمي و كيفي كروموزوم‌ها تحت تأثير تري‌فلورالين به صورت موزائيک:

۱- در بعضي از سلول‌ها، شكل، اندازه كروموزوم‌ها و فرمول كاريوتيپي تغيير كرد، اما سطح پلوئيدي بدون تغيير ماند (شكل ۳- a و b).

č- در تعداد ديگري از سلول‌ها، شكل، اندازه كروموزوم‌ها و فرمول كاريوتيپي تغيير كرد و كروموزوم‌ها نيز دو برابر شدند و سلول‌هاي تتراپلوئيد ايجاد شد (شكل ۳- c).

نتايج اين پژوهش نشان داد كه كروموزوم‌ها تحت تأثير اين ماده، šه درحالت ديپلوئيدي و šه در حالت تتراپلوئيدي به شدت كوšک شده و شكل، نوع كروموزوم و فرمول كاريوتيپي تغيير كرد (شكل ۳).

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]



شكل ٣ - تصاوير كروموزومي از مرحله متافاز ميتوز نمونه‌هاي تيمار شده با تري‌فلورالين در گونه *T. foenum- graecum*.

شكل a: غلظت ١٥ ميكرومولار در مدت ١٢ ساعت

شكل b: غلظت ١٥ ميكرومولار در مدت ٢٤ ساعت

شكل c: غلظت ٢٢/٥ ميكرومولار در مدت ٢٤ ساعت

تصاويركاريوتيپ گونه مورد مطالعه، قبل و بعد از تيمار با تري‌فلورالين در شكل d نشان داده شده است.

شاهد (قبل تيمار) **2n=16**	
پ 5 از تيمار **2 n=16**	
پ 5 از تيمار **2n=4x=32**	

شكل d- تصاوير كاريوتيپي قبل و پس از تيمار با تري‌فلورالين.

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]


تجزیه کاریوتیپ Ř الموله شاهد

تجزیه کاریوتیپ نمونه شاهد نشان داد که این گونه با Čn=Čx=۱٦ کروموزوم گونه‌اي دیپلوئید و تعداد کروموزوم پایه در آن X=۸ بود. طول کل کروموزوم‌هاي هاپلوئید ď/Ċ۸ میکرومتر، مجموع طول بازوهاي بلند ČĒ/Ċ٦ میکرومتر و مجموع طول بازوهاي کوتاه ۱۳/ČČ میکرومتر بود. همچنین بلندترین کروموزوم٦/ČĊ میکرومتر، کوتاه‌ترین کروموزوم ď/ĊĒ میکرومتر و متوسطnj طول هرکروموزوم نیز Đ/Ċ۳ میکرومتر بود. فرمول کاریوتیپي این ژنوتیپ ۱m+۷sm بود که ۸۷/۵ درصد از کروموزوم‌ها ساب‌متاسانتریک و ۱۲/۵ درصد از آنها متاسانتریک بودند که با نتیجه ریاست (۱۸) مطابقت داشت. نتایج این تحقیق با نتایج لادیزینسکي و وسا (۱۱) که اظهار داشتند کلیه کروموزوم‌هاي این گونه آکروسانتریک است و راگووانشي و پانت (۱۲) که از وجود ۲ کروموزوم B در کاریوتیپ این گونه گزارش دادند و عدد کروموزومي آنرا Čn=۱٦+۲B اعلام کردند، مغایرت داشت. سایر اطلاعات مربوط به کاریوتیپ این ژنوتیپ در جدول ۳ و ایدیوگرام مربوط به آن در شکل Đ نشان داده شده است.

جدول ۳- پارامترهاي سیتوژنتیکي محاسبه شده در کاریوتیپ شاهد

فرمول کاریوتیپي	شاخDŽ سانترومتري	نسبت بازوها	طول کل کروموزوم (µm)	بازوي کوتاه (µm)	بازوي بلند (µm)	کروموزوم
sm	Ċ/Č۹	Č/ď Ċ	٦/ČĊ	۱/۸Č	ď/۳Ē	۱
m	Ċ/۳Ē	۱/٦۹	Đ/Đ٦	Č/Ċ٦	۳/Đ	Č
sm	Ċ/۳Đ	۱/۸۸	Đ/۳ď	۱/۸٦	۳/ď۸	۳
sm	Ċ/۳Č	Č/۱Đ	Đ/۱ď	۱/٦۳	۳/Đ۱	ď
sm	Ċ/۳Č	Č/۱٦	ď/۹۱	۱/ĐĐ	۳/۳٦	Đ
sm	Ċ/۳Č	Č/۱Ċ	ď/ĒĊ	۱/ĐČ	۳/۱۸	٦
sm	Ċ/۳Č	Č/۱Ē	ď/۳٦	۱/۳۸	Č/۹۸	Ē
sm	Ċ/۳ď	۱/۹۱	ď/ĊĒ	۱/ď Ċ	Č/٦Ē	۸

sm و m: به ترتیب کروموزوم ساب‌متاسانتریک و متاسانتریک



شکل Đ- ایدیوگرام کاریوتیپ شاهد.

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]


تجزيه کاريوتيپ حاصل از ديپلوئيد (2n=2x=16) و تتراپلوئيد (2n=4x=32) حاصل از تيمار با تري فلورالين

مطالعه اين کاريوتيپ نشان داد که عدد کروموزومي همان 2n=2x=16 بود و تري فلورالين فقط شکل و اندازه کروموزوم ها را تغيير داده و تأثيري بر تعداد کروموزوم ها نداشت. فرمول کاريوتيپي اين ژنوتيپ 8m و کل کروموزوم ها متاسانتريک بودند. ساير اطلاعات مربوط به کاريوتيپ در جدول ď و ايديوگرام مربوط به آن در شکل ٦ نشان داده شده است.

جدول ď- پارامترهاي سيتوژنتيکي محاسبه شده در کاريوتيپ ديپلوئيد حاصل از تيمار با تري‌فلورالين

فرمول کاريوتيپي	شاخص سانترومتري	نسبت بازوها	طول‌کل کروموزوم (µm)	بازوي کوتاه (µm)	بازوي بلند (µm)	کروموزوم
m	ċ/ď١	١/ďď	٣/٨č	١/ĐĒ	č/č٦	١
m	ċ/ďď	١/٣ċ	٣/Đ١	١/Đ٣	١/٩٨	č
m	ċ/ď٣	١/٣Đ	٣/čď	١/٣٨	١/٨٦	٣
m	ċ/ďč	١/ďċ	٣/١٣	١/٣ċ	١/٨٣	ď
m	ċ/ďč	١/٣٨	٣/ċĒ	١/č٩	١/Ē٨	Đ
m	ċ/ďč	١/٣٨	č/٩٨	١/čĐ	١/Ē٣	٦
m	ċ/ď٣	١/٣č	č/٩١	١/čĐ	١/٦٦	Ē
m	ċ/ďď	١/č٨	č/٦٣	١/١Đ	١/ď٨	٨

m: کروموزوم متاسانتريک.



شکل ٦- ايديوگرام کاريوتيپ نمونه ديپلوئيد حاصل از تيمار با تري‌فلورالين.

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]


تجزیه کاریوتیپ Ř الموله تتراپلوئید (پ 5 از تیمار با تري‌فلورالین)

در این حالت نه تنها شکل و اندازه کروموزوم‌ها تغییر یافت بلکه تعداد کروموزوم‌ها نیز دو برابر شد و عدد کروموزومي به صورت ČnďxĎČ افزایش یافت. فرمول کاریوتیپي ۱۳m+۳sm و ۱۸/ĒĐ درصد از کروموزوم‌ها ساب‌متاسانتریک و ۸۱/ČĐ درصد از کروموزوم‌ها متاسانتریک بودند. سایر اطلاعات مربوط به کاریوتیپ در جدول Đ و ایدیوگرام مربوط به آن در شکل Ē نشان داده شده است.

جدول Đ- پارامترهاي سیتوژنتیکي محاسبه شده در کاریوتیپ تتراپلوئید حاصل از تیمار با تري‌فلورالین

فرمول کاریوتیپي	شاخDŽ سانترومتري	نسبت بازوها	طول‌کل کروموزوم (µm)	بازوي کوتاه (µm)	بازوي بلند (µm)	کروموزوم
sm	ċ/۳٦	۱/۸۱	Č/٦Đ	ċ/۹ď	۱/۷۱	۱
m	ċ/ď۱	۱/ď٦	Č/ď۱	ċ/۹۸	۱/ď۳	Č
sm	ċ/۳Ē	۱/ĒČ	Č/۳٦	ċ/۸Ē	۱/ď۹	۳
m	ċ/ď۱	۱/ďČ	Č/۳۱	ċ/۹Đ	۱/۳Đ	ď
m	ċ/۳۹	۱/Đ۹	Č/Čď	ċ/۸Ē	۱/۳۸	Đ
m	ċ/۳۹	۱/Đ۹	Č/Č۱	ċ/۸Đ	۱/۳Đ	٦
m	ċ/ď۳	۱/۳ď	Č/۱Ē	ċ/۹۳	۱/Čď	Ē
m	ċ/۳۸	۱/٦ď	Č/۱Č	ċ/۸ċ	۱/۳Č	۸
m	ċ/ď۳	۱/۳Đ	Č/ċ۹	ċ/۸۹	۱/Čċ	۹
m	ċ/ďċ	۱/Đċ	Č/ċĒ	ċ/۸۳	۱/Čď	۱ċ
m	ċ/ďċ	۱/Đ۳	Č/ċ۳	ċ/۸ċ	۱/Č۳	۱۱
m	ċ/ďċ	۱/Đ۱	۱/۹۸	ċ/Ē۹	۱/۱۹	۱Č
m	ċ/ď۱	۱/ďČ	۱/۹ď	ċ/۸ċ	۱/۱ď	۱۳
sm	ċ/۳Ē	۱/Ē۱	۱/۸Ē	ċ/٦۹	۱/۱۸	۱ď
m	ċ/۳۸	۱/٦ċ	۱/Ē۹	ċ/٦۹	۱/۱ċ	۱Đ
m	ċ/ď۳	۱/۳Đ	۱/٦۸	ċ/Ē۱	ċ/۹Ē	۱٦

sm و m: به ترتیب کروموزوم ساب‌متاسانتریک و متاسانتر.



شکل Ē- ایدیوگرام کاریوتیپ نمونه تتراپلوئید حاصل از تیمار با تري‌فلورالین.

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]

مقايسه پارامترهاي کاريوتيپي ۲ رقم تتراپلوئيد مورد مطالعه

براي هر کاريوتيپ سطح پلوئيدي، تعداد کل کروموزوم ها، تعداد کروموزوم پايه (X)، طول کل کروموزوم هاي هاپلوئيدي، بلندترين و کوتاه ترين کروموزوم ها، متوسط طول هر کروموزوم به همراه فرمول کاريوتيپي تعيين گرديد و نتايج حاصل در جدول ٦ ارائه شد.

جدول ٦- ويژگي هاي کاريوتيپي نمونه ها قبل و پس از تيمار با تري فلورالين

کاريوتيپ	سطح پلوئيدي	۲n	X	طول کل کروموزوم هاي هاپلوئيدي (µm)	بلندترين کروموزوم (µm)	کوتاه ترين کروموزوم (µm)	متوسط طول هر کروموزوم (µm)	فرمول کاريوتيپي
شاهد	ديپلوئيد	۲n=۲x=۱۶	۸	۴۶/۲۸	۶/۲۶	۴/۶۷	۵/۶۳	۱m+۷sm
تيمارشده	ديپلوئيد	۲n=۲x=۱۶	۸	۲۵/۳	۳/۸۲	۲/۶۳	۳/۱۶	۸m
تيمارشده	تتراپلوئيد	۲n=۴x=۳۲	۸	۳۳/۶۲	۲/۶۵	۱/۶۸	۲/۱۲	۱۳m+۳sm

sm و m: به ترتيب کروموزوم ساب‌متاسانتريک و متاسانتريک.

با توجه به جدول ٦ مشاهده مي‌شود که پس از انجام تيمار از درصد کروموزوم‌هاي ساب متاسانتريک کاسته و به درصد کروموزوم هاي متاسانتريک افزوده شد. تري فلورالين به شدت بر طول کروموزوم ها و بالطبع بر فرمول کاريوتيپي اثر گذاشته بود، به طوري که بلندترين کروموزوم ها متعلق به کاريوتيپ شاهد و کوتاه ترين کروموزوم ها پس از تيمار با تري فلورالين مشاهده شدند که با نتايج عاليشاه و باقريه نجار (۳) که اظهار داشتند کلشي سين باعث کوتاه تر و فشرده تر شدن کروموزوم ها در دو گونه پنبه مي شود مطابقت داشت.

تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين صفات کاريوتيپي نمونه‌ها

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که بين کاريوتيپ‌ها در تمام صفات کروموزومي، اختلاف معني‌داري در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت که اين امر بيانگر تأثير معني‌دار تري‌فلورالين در ايجاد تغييرات کروموزومي در گونه مورد نظر بود (جدول ٤).

پس از تأييد اختلاف بين کاريوتيپ ها، کاريوتيپ ها با استفاده از آزمون دانکن مورد مقايسه قرارگرفتند (جدول ۸).

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]

جدول ۷- خلاصه تجزيه واريانس صفات كروموزومي كاريوتيپ‌ها

منابع تغييرات	درجه آزادي	طول كل كروموزوم	بازوي بلند	بازوي كوتاه	نسبت بازوها	شاخDŽ سانترومري
كاريوتيپ	۲	۱۱۳/۳۲**	۵آ/۱آ**	آ/آآ**	آ/۲ġ**	ġ/ġآآ**
خطاي آزمايش	۱۲	آ/۳ġ	۳/ ۴۵	۱/ġ۵۸	ġ/۸۸	ġ/ġ۱
ضريب تغييرات (درصد)		۸/آآ	آ/۵۷	۸/۸	۸/۴۷	۴/۷۵

**: اختلاف معني‌دار در سطح احتمال ۱ درصد.

جدول ۸- مقايسه ميانگين ويژگي‌هاي كروموزومي در كاريوتيپ نمونه شاهد و نمونه‌هاي حاصل از تيمار با تري‌فلورالين

كاريوتيپ	متوسطnj طول كل كروموزوم	متوسطnj بازوي بلند	متوسطnj بازوي كوتاه	نسبت بازوها	شاخDŽ سانترومري
ديپلوئيد (شاهد)	۵/ġ۳a	۳/۳۸a	۱/آ۵a	۲/۱۱a	ġ/۳۳ġc
ديپلوئيد	۳/۱آb	۱/۸۲b	۱/۳۴b	۱/۳۷c	ġ/۴۲۵a
تتراپلوئيد	۲/۱۱c	۱/۲۸c	ġ/۸۳c	۱/۵آb	ġ/۳آآb

حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختلاف معني دار بين ميانگين ها است.

در اين تحقيق مشابه اغلب گزارشات قبلي ثابت شد كه تري فلورالين از جمله عوامل ضد سنتز ميكروتوبولها و يک پلي پلوئيد كننده قوي مي‌باشد (آ، ۷، ۸ و ۱ġ). همانطور كه كليما و همكاران (۱ġ) اظهار داشتند تهيه راحت، ارزان تر بودن، سميت كمتر و ايمن تر بودن تري فلورالين نسبت به كلشي سين اين ماده را به تيماري مناسب جهت القاء پلي پلوئيدي تبديل كرده است. تري فلورالين با ايجاد تغييرات كمي و كيفي كروموزومي و القاء پلي پلوئيدي، احتمالاً تيمار مناسبي جهت افزايش سطح پلوئيدي و اصلاح صفات مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و همچنين متابوليت هاي با ارزش اين گياه باشد. به دنبال القاء پلي پلوئيدي و ايجاد تغييرات سيتوژنتيكي در سلولهاي مريستمي اين گياه دارويي، مطالعات گسترده تر جهت ارزيابي ميزان تغييرات متابوليت هاي گياه پيشنهاد مي شود.

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]

منابٚ

1. Adaniya, S. and D. Shira. 2001. In vitro induction of tetraploid ginger (*Zingiber offìcinali* Roscoe) and its pollen fertility and germinability. Science Horticulture, 88: 277-287.
2. Ahmad, F., S. Acharya, Z. Mir and P. Mir. 1999. Localization and activity of rRNA genes of fenugreek *in situ* hybridization and silver staining. Theoretical and Applied Genetics. 98(2): 179-185.
3. Alishah, O. and M. Bagherieh-Najjar. 2008. Polyploidization effect in two diploid cotton (*Gossypium herbaceum* and *G. arboretum*) species by colchicine treatments. African Journal of Biotechnology. 7(2): 102-108.
4. Das, A.B., M. Pattnaik, T. thangaraj and P. Das. 1997. Cytophotometric estimation of nuclear DNA content and karyotype analysis of eight cultivars of *Trigonella foenum-graecum*. Cytobios. 91: 171-179.
5. Dhawan, O.P. and U.C. Lavania. 1996. Enhancing the productivity of secondary metabolites via induced polyploidy: A review. Euphytica. 87: 81-89.
6. Hansen, A.L., A. Gertz, M. Joersbo and S.B. Andersen. 1998. Antimicrotubule herbicides for *in vitro* chromosome doubling in *Beta vulgaris* L. ovule culture. Euphytica. 101: 231-237.
7. Hansen, N.J.P. and S.B. Andersen. 1996. In vitro chromosome doubling potential of colchicine, oryzalin, trifluralin, and APM in *Brassica napus* microspore culture. Euphytica. 88(2): 159-164.
8. Hess, D. and D. Bayer. 1974. The effect of trifluralin on the ultrastructure of dividing cells of the root meristem of cotton (*Gossypium hirsutum* L. Acala 4-42). Journal of cell science. 15: 429-441.
9. Jesus, L.D. 2003. Effect of artificial polyploidy in transformed roots of *Artemisia annua* L. Plant Cell Reports. 21: 809-813.
10. Klima, M., M. Vyvadilova and V. Kucera. 2008. Chromosome doubling effects of selected antimitotic agents in *Brassica napus* microspore culture. Plant Breed. 44(1): 30-36.
11. Ladizinsky, G. and C.G. Vosa. 1986. Karyotype and c-banding in *Trigonella foenum-graecum*. Plant Systematic and Evolution. 153(1): 1-5.
12. Levan, A.K., K. Fredga and A.A. Sandberg. 1964. Nomenclature for centromic position on chromosomes. Hereditas. 52: 201-220.
13. Mehrafarin, A., A. Qaderi, Sh. Rezazadeh, H. Naghdi Badi, Gh. Noormohammadi and E. Zand. 2010. Bioengineering of Important Secondary Metabolites and Metabolic Pathways in Fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* L.). Journal of Medicinal Plants. 9(35): 1-18.
14. Najaf Poor, M. 1994. About the medicinal plant of fenugreek. Research Institute of Forests and Range. 18 pp.
15. Niknam, V. and A. Kiyani. 2004. Effects of drought and salinity stress on some biochemical parameters of fenugreek *in vitro*. 2nd medicinal plants Conference, Shahed University, Tehran. 186 pp.
16. Raghuvanshi, S.S. and M. Pant. 1980. Studies on the distribution of b chromosome in different plant parts of *Trigonella foenum-graecum*. Caryologia. 33(2): 215-225.
17. Rey, H.Y., P.A. Sansberro, M.M. Collavino, J.R. Davina, A.M. Gonzalez and L.A. Mroginski. 2002. Colchicine, trifluralin and oryzalin promoted development of somatic embryos in *Ilex paraguariensis*. Euphytica. 123: 49-56.

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]

18. Riasat, M. 2001. Investigation of cytogenetic of genus fenugreek (*Trigonella*) in Fars province. M.Sc thesis, Faculty of Science Orumieh University. 121 pp.
19. Rudi, D. 1998. Trifluralin and iron influence on morphological characteristics and iron absorption of soybean varieties in greenhouse. M.Sc thesis, Faculty of Agriculture Shiraz University. 125 pp.

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]

Effect of Trifluralin Herbicide on Polyploidy Induction and Chromosome Changes in Root Meristem Cells of Fenugreek (*Trigonella foenum-graecum*)

E. Afshari[1], G.A. Ranjbar[2], S.K. Kazemitabar[3], M. Riasat[4] and H. Kazemi Poshtmasari[5]

Abstract

Fenugreek (*Trigonella foenum-graecum*) is an annual herbaceous plant belongs to Papilionaceae family and is important as a pharmaceutical, agronomic and pastural plant. In order to study the effect of trifluralin on ploidy induction and cytogenetic characteristics of cells in the root meristem of fenugreek some seeds of this species were planted in the incubator and after germination root tips were used for karyotypic studies. For treating the seeds trifluralin liquid 48% were applied at 7.5, 15 and 22.5 µM concentrations for 12 and 24 h. The Video Analysis System was used for karyotype analysis. The basic chromosome number was X=8. The results showed that concentration of trifluralin, treatment duration and interaction between them on the ploidy induction were statistically significant. The maximum ploidy induction was happened by immersion seedlings in 22.5 µM trifluralin at 24 h. The result of analysis of variance based on completely randomized design (CRD) showed a significant difference among the karyotypes for all chromosomal traits (P<%1). Trifluralin affected severity on the length of chromosomes and karyotypic formula so that the longest chromosomes belonged to the karyotype control sample and the shortest chromosomes were observed after treating with trifluralin. After applying treatment was reduced the percentage of submetacentric chromosomes and were added to the percentage of metacentric chromosomes.

Keywords: Chromosome, Cytogenetic changes, Ploy Ploidy induction, Trifluralin, Fenugreek

1- Former M.Sc. Student, Islamic Azad University, Shiraz beranch
2- Assistant Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3- Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
4- Researcher Instractur, Agricultural Sciences and Natural Research Institute,Shiraz
5- Member of Young Researchers Club, Islamic Azad University, Rasht Branch

[Downloaded from jcb.sanru.ac.ir on 2026-11-11]